

Anemia ferropriva na criança · profilaxia

Ferropenia é a causa nº 1 de anemia na infância. Profilaxia com ferro e alimentação adequada previnem; tratamento confirma-se pela resposta reticulocitária.

Profilaxia (MS — conceito)

Dica - Profilaxia (MS — conceito)

Suplementação preventiva de ferro em lactentes conforme idade gestacional e aleitamento — memorize o princípio: prematuros e termo em risco recebem ferro profilático.

Identifique risco (prematuridade, leite de vaca precoce, baixa ingestão) e trate com ferro oral.

Anemia ferropriva

Risco -> diagnostico -> ferro

Rastrear risco

prematuro / dieta

Lab

Hb, VCM, ferritina

Ferro oral

3-6 mg/kg/dia

Tratamento

- Ferro elemental ~3–6 mg/kg/dia; longe de leite/cálcio se possível
- Resposta: !reticulócitos em ~1–2 semanas; Hb sobe em ~1 mês
- Manter 2–3 meses após normalizar Hb para repor estoques
- Investigar perda/ sangramento se refratária ou idade atípica

Labs típicos

Exame | Achado

VCM/HCM | Baixos

RDW | Alto

Ferritina | Baixa

Saturação de transferrina | Baixa

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Leite de vaca integral precoce (<1 ano) é fator clássico de ferropenia/enteropatia. Não feche talassemia sem ferritina — e vice-versa.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1