

Puberdade · precoce, atrasada e Tanner

Puberdade precoce: <8 anos meninas / <9 meninos. Atrasada: ausência de caracteres aos 13 (&@) ou 14 (&B). Tanner + velocidade de crescimento guiam a propedêutica.

Primeiro sinal

Lembre - Primeiro sinal

Meninas: telarca. Meninos: volume testicular "e4 mL. Pelarca isolada pode ser prematura benigna — avalie contexto e progressão.

Central (GnRH-dependente) versus periférica muda exame e imagem.



Propedêutica

- Idade óssea, estradiol/testosterona, LH/FSH ($\pm$ estímulo GnRH)
- RM de SNC se precoce central, especialmente meninos ou progressão rápida
- USG pélvico em meninas; excluir tumores secretores se periférica
- Atraso: pensar constitucional, doenças crônicas, Turner, Kallmann

Marcos

Evento | Idade aproximada

Telarca | ~8–13 anos

Menarca | ~2–2,5 anos após telarca

Volume testicular 4 mL | Início masculino

Estirão | Tanner 3–4

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Puberdade precoce em meninos tem maior chance de patologia de SNC — não 'observe eternamente'. Telarca sob exposições estrogênicas exógenas também existe.