

Atraso diagnóstico · vieses e segurança

Atraso diagnóstico mistura vieses do profissional, falhas de sistema e barreiras de acesso. Segurança do paciente exige checklists, comunicação e follow-up de exames.

Vieses clássicos

Dica - Vieses clássicos

Ancoragem, fechamento prematuro, fadiga de alerta e viés de disponibilidade. Combata com diagnóstico diferencial explícito e 'e se eu estiver errado?'.

Cada elo pode falhar: percepção do paciente, acesso, hipótese, exame e retorno do resultado.



Práticas que reduzem atraso

- Sistema de alerta para resultados críticos
- Handoff estruturado (SBAR) na transferência de cuidado
- Rastreios organizados com busca ativa de faltosos
- Reavaliação quando a evolução não fecha com a hipótese

Exemplos de prova

Cenário | Falha típica

Ca colo sem Papanicolaou | Falha de rastreio/acesso

TEP rotulado como ansiedade | Fechamento prematuro

Rx alterado sem aviso | Falha de comunicação

IAM em mulher/idoso | Viés de representação

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Culpar só o paciente pelo atraso ignora determinantes e falhas do sistema. Resultado crítico sem comunicação é erro de processo — prevenível.