

IMC e estado nutricional · classificação

IMC classifica baixo peso, eutrofia, sobrepeso e obesidade. Combine com circunferência abdominal para risco CV e foque em metas realistas na APS.

Circunferência abdominal

Lembre - Circunferência abdominal

Risco aumentado: "e88 cm (&@) e "e102 cm (&B) em pontos clássicos de prova — marque risco cardiometabólico mesmo com IMC limítrofe.

Fórmula clássica; interprete por faixas OMS no adulto.

IMC

peso / altura²

$$\text{IMC} = \text{peso (kg)} / \text{altura (m)}^2$$

Adulto: <18,5 baixo; 18,5-24,9 eutrofia; 25-29,9 sobrepeso; >=30 obesidade

Conduta na APS

- Avaliar hábitos, depressão, medicamentos e endocrinopatias selecionadas
- Meta: perda de 5–10% já reduz comorbidades
- Atividade física + dieta; farmacoterapia/cirurgia em critérios
- Crianças: use curvas/z-score — não IMC adulto cru

Obesidade — classes (adulto)

Classe | IMC

I | 30–34,9

II | 35–39,9

III | "e40

Sobrepeso | 25–29,9

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

IMC elevado em atleta pode ser massa magra — use contexto e CA. Idoso com perda ponderal involuntária: investigar neoplasia/depressão, não celebrar 'emagrecimento'.