

Tabagismo · abordagem e cessação

Pergunte, aconselhe e ofereça tratamento a todo tabagista. Combinação de aconselhamento + farmacoterapia dobra chances de cessação.

Farmacoterapia


Dica - Farmacoterapia

TSN (adesivo/goma), bupropiona e vareniclina são pilares. Escolha conforme CI (convulsão × bupropiona; humor × vareniclina — individualize).

Fluxo breve da consulta: identificar !' aconselhar !' avaliar prontidão !' ajudar !' agendar retorno.

Abordagem 5As

Ask-Advise-Assess-Assist-Arrange



Pontos de prova

- Carga tabágica: maços-ano = (maços/dia) × anos
- Benefício CV começa cedo após parar; risco de Ca cai com o tempo
- Gestante: aconselhamento intensivo; TSN só se benefício > risco
- Exposição passiva também adoece — ambiente livre de fumo

5As (português)

A | Ação

Avaliar/Ask | Identificar uso

Aconselhar | Pare de forma clara

Apreciar prontidão | Estágio de mudança

Assistir / Agendar | Plano + follow-up

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não diga só 'pare de fumar' sem oferecer método. Narguilé/cigarro eletrônico também são exposição tóxica — não são 'estratégia segura' de cessação na prova.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1