

Tipos de estudo · epidemiológicos


Cada desenho responde a uma pergunta e gera uma medida típica. Decore a direção do tempo (exposição!desfecho) e se o investigador aloca a exposição.

Atalho de prova

Dica - Atalho de prova

Doença rara !' pense caso-controle. Exposição rara !' coorte. Causalidade/intervenção !' ensaio clínico randomizado.

Timeline didática de hierarquia de evidência observacional até o experimental (RCT).



Definições curtas

- Transversal: exposição e desfecho no mesmo tempo — prevalência e associação cruzada
- Caso-controle: parte do desfecho (casos/controles) e olha exposição passada — OR
- Coorte: parte da exposição e segue desfecho — incidência e RR
- Ensaio: investigador atribui intervenção — eficácia, NNT, riscos

Medida típica

Estudo | Medida

Transversal | Prevalência / RP

Caso-controle | Odds ratio (OR)

Coorte | Risco relativo (RR), IR

Ensaio clínico | RR/RAR/NNT

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Caso-controle não calcula incidência diretamente e OR só aproxima RR se a doença for rara. Não diga 'RR' automaticamente em caso-controle.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1