

Queimaduras · regra dos 9 e Parkland

Calcule a superfície corporal queimada (SCQ), proteja via aérea e inicie reposição volêmica precoce nas queimaduras maiores.

Regra dos 9 no adulto (Wallace) — valores aproximados para prova.



Regra dos 9 (adulto)

- Cabeça e pescoço: 9%
- Cada membro superior: 9%
- Face anterior do tronco: 18% · face posterior: 18%
- Cada membro inferior: 18%
- Períneo/genital: 1%
- Palma da mão do paciente "H 1% (útil em áreas irregulares)

Parkland (clássica de prova)

Dica - Parkland (clássica de prova)

Volume nas primeiras 24 h = 4 mL × peso (kg) × % SCQ. Metade nas primeiras 8 h a partir da queimadura; metade nas 16 h seguintes. Em geral com Ringer lactato.

Sinais de via aérea / inalação

- Queimadura em face, vibrissas chamuscadas, escarro carbonáceo
- Estridor, rouquidão, confusão, ambiente fechado com fumaça
- Antecipe via aérea definitiva precocemente — edema progride

Critérios frequentes de transferência / gravidade

- SCQ elevada (em adulto, atenção a partir de ~20% em 2º/3º grau — seguir protocolo local)
- Queimadura circunferencial de tórax ou membro
- Envolvimento de face, mãos, pés, genitália, grandes articulações
- Queimadura elétrica, química ou associada a trauma

Armadilha

Atencao - Armadilha

A regra dos 9 da criança é diferente (cabeça proporcionalmente maior). Em lactentes, não aplique a tabela do adulto sem ajuste.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.
www.medhubr1.com.br - MedHub R1