

FICHA TÉCNICA  
FENTRIUPH AGRO 88 OL  
Registro Nacional ICA No. 2990  
Titular del Registro: DEL MONTE AGROSCIENCES S.A.S.



## GENERALIDADES

**Producto:** FENTRIUPH AGRO 88 OL  
**Tipo de Producto:** Fungicida de Uso Agrícola  
**Formulación:** Líquido Miscible En Aceite - OL  
**Categoría Toxicológica:** III – Ligeramente Peligroso  
**Cultivo:** Banano.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

**FENTRIUPH AGRO 88 OL** es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa. Pertenece al grupo químico de las morfolinas. Actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol. Además, inhibe la formación de carbohidratos y proteínas. Por su mecanismo de acción multisitio, es una herramienta importante en programas de manejo antirresistencia de sigatoka negra.

## COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:

Fenpropimorph.....880 g/L  
cis-4-[(RS)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine de formulación  
a 20°C

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 L

## RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con un Agrónomo o Ingeniero Agrónomo”

Cultivo	Enfermedad	Dosis	L.M. R	P.C.	P.R.
Banano	Sigatoka negra ( <i>Pseudocercospora</i> <i>Fijiensis</i> )	0.7 L/ha	2.0 mg/Kg	0 días	4 horas*

**P.C.:** Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**P.R.:** Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

**LMR.:** Límite máximo de residuos

\*Se puede ingresar al cultivo dos (2) horas después de la última aplicación de producto solo con autorización el agrónomo o responsable técnico del cultivo, previa verificación por parte de este de que el follaje tratado este seco, se utilicen todos los elementos de protección personal y se registre el ingreso al área tratada en la bitácora del cultivo. NO INGRESAR AL CULTIVO DENTRO DE LAS DOS (2) PRIMERA HORAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN.

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad o con la aparición de los primeros síntomas, esto dentro de un programa de manejo integrado de enfermedades, rotando con otros fungicidas de diferente modo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de la resistencia.

## EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA

Revise y calibre bien los equipos. Se recomienda usar boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aprox. y a presión constante.

## COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

FICHA TÉCNICA  
FENTRIUPH AGRO 88 OL  
Registro Nacional ICA No. 2990  
Titular del Registro: DEL MONTE AGROSCIENCES S.A.S.



## INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



**EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS 24 HORAS**  
**CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.**  
**En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.**

**Importado y Distribuido por:**  
Del Monte Agrosiences S.A.S.