

# **PROFAST**

## Fungicida de uso agrícola

Fungicida que Inhibe la formación y liberación de zoosporas y afecta la formación de hifas. Con una rápida detección de la enfermedad y control oportuno



#### **INGREDIENTES ACTIVOS**

Cymoxanil 300 gr/kg y Famoxadone 225 gr/kg

#### **PROFAST**

Es un fungicida multisitio, que inhibe el transporte de electrones en la mitocondria (bc1) impidiendo la generación de energía (ATP), la síntesis de ADN y de ARN (Núcleo), la síntesis de aminoácidos y lípidos (citoplasma), la respiración celular (mitocondrias) y la permeabilidad de la pared celular.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda una sola aplicación y realizar como máximo 2 aplicaciones con un intervalo de 7 a 14 días por campaña, siendo una campaña al año. Aplicar dentro de un programa de manejo integrado de enfermedades, lo cual ayuda a disminuir la resistencia que algunos patógenos han desarrollado a los fungicidas de síntesis química. Aplicar de manera preventiva o curativa temprana cuando se presente los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de esta.

#### **RECOMENDACIONES DE USO**

Cultivo	Blanco Biológico	Dosis
Rosas	Mildeo Velloso ( <u>Peronospora sparsa</u> )	1g/L



# **ALTAMENTE EFECTIVO CONTRA**

Mildeo Velloso (Peronospora sparsa)



