

FICHA TÉCNICA  
DIMETOATO DEL MONTE 400 EC  
Registro Nacional ICA No. 2007  
Titular del Registro: DEL MONTE AGROSCIENCES S.A.S.



## GENERALIDADES

**Producto:** DIMETOATO DEL MONTE 400 EC  
**Tipo de Producto:** Insecticida Agrícola  
**Formulación:** Concentrado Emulsionable  
**Categoría Toxicológica:** III – Ligeramente Peligroso  
**Cultivo:** Maíz.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

**DIMETOATO DEL MONTE 400 EC** es un Insecticida organofosforado con efecto por contacto e ingestión, es absorbido por las plantas en forma sistémica a través del follaje y puesto a circular dentro de la misma, llegando a brotes nuevos, sitios preferidos por muchas plagas. Posee acción prolongada, especialmente sobre insectos-plaga chupadores, masticadores, minadores, raspadores y barrenadores. No aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

## COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:

Dimetoato,.....400 g/L  
2-dimethoxyphosphinothioylthio-N-methylacetamide de formulación 20 °C

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1Kg

## RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con un Agrónomo o Ingeniero Agrónomo”

Cultivo	Plaga	Dosis	P.C.	P.R.
Maíz	ÁFIDOS ( <i>Rhopalosiphum maidis</i> )	300 cc /ha Es decir 1.5 cc/litro agua	14 días	4 Horas

**P.C:** Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**P.R:** Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

FICHA TÉCNICA  
DIMETOATO DEL MONTE 400 EC  
Registro Nacional ICA No. 2007  
Titular del Registro: DEL MONTE AGROSCIENCES S.A.S.



## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar una sola vez por ciclo de cultivo o cosecha, en infestaciones tempranas, dentro de un programa de manejo integrado -MIP- (rotando con otros plaguicidas de diferente modo de acción o grupo químico) para evitar el desarrollo de la resistencia. Aplicar al aparecer presencia de los primeros individuos sobre el follaje. Se recomienda evaluar su eficacia a los 4 o 5 días después de su aplicación dado que su acción depende del estado de las larvas.

## EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA

Use un volumen de 200 L/ha. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aprox. Llenar el tanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua, agregar la cantidad requerida de DIMETOATO DEL MONTE 400 EC y completar con agua hasta el volumen deseado, manteniendo agitación constante.

## COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

## INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



**EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS 24 HORAS**  
**CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.**  
**En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.**

**Importado y Distribuido por:**  
**Del Monte Agrosiences S.A.S.**