

## GENERALIDADES

<b>Producto:</b>	CYHALOFOP BUTIL DEL MONTE 180 EC
<b>Tipo de Producto:</b>	Herbicida Agrícola
<b>Formulación:</b>	Concentrado Emulsionable - EC
<b>Categoría Toxicológica:</b>	III – Ligeramente Peligroso
<b>Cultivo:</b>	Arroz.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

**CYHALOFOP BUTIL DEL MONTE 180 EC** es un herbicida ariloxiácido, post - emergente y de acción sistémica y selectiva, para el control de gramíneas en arroz de riego y de secano.

## COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:

Cyhalofop Butyl .....180 g/L  
*butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]propionate* de formulación a 20°C

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1L

## RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con un Agrónomo o Ingeniero Agrónomo”

Cultivo	Maleza	Dosis	P.C.	P.R.
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )	Liendre puerco ( <i>Echinochloa colonum</i> )	1.5 L/ha	N.A	0 Horas

**P.C.:** Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**P.R.:** Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

**N.A.:** No aplica

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando las gramíneas están en activo crecimiento (malezas con 3 hojas verdaderas y hasta una macolla). Para un control más efectivo, se debe proceder a inundar definitivamente el cultivo a las 24 horas posteriores a la aplicación del producto.

FICHA TÉCNICA  
CYHALOFOP BUTIL DEL MONTE 180 EC  
Registro Nacional ICA No. 1528  
Titular del Registro: DEL MONTE AGROSCIENCES S.A.S.



## EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA

Calibre bien los equipos y asegure un tamaño y distribución de gotas uniforme. Se recomienda aplicar con boquillas de abanico plano a una presión de 40 a 50 psi. Al aire libre, diluir la dosis del producto en la mitad del volumen de agua, haciendo un triple lavado del envase. Completar el volumen con agua agitando constantemente hasta obtener una mezcla homogénea.

## COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Incompatible con herbicidas para el control de malezas de hoja ancha, tales como 2,4 D, ioxinil, bentazón, triclopyr, bispyribac-sodio o sulfonilúreas, con las cuales presenta antagonismo incluso si es aplicado en cultivos cercanos.

Para evitar efectos antagónicos con estos productos, se recomienda aplicar éstos 7 días antes o 15 días después de aplicar CYHALOFOP BUTIL DEL MONTE 180 EC. No se recomienda su mezcla con productos altamente alcalinos.

No se han observado efectos fitotóxicos bajo las recomendaciones de uso, sin embargo, se recomiendan pruebas previas en nuevas variedades de cultivo.

## INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



**EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS 24 HORAS**  
**CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.**  
**En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.**

**Importado y Distribuido por:**  
**Del Monte Agrosiences S.A.S.**