

FICHA TÉCNICA
BISPYRIBAC DEL MONTE 400 SC
Registro Nacional ICA No. 1696
Titular del Registro: DEL MONTE AGROSCIENCES S.A.S.



GENERALIDADES

Producto: BISPYRIBAC DEL MONTE 400 SC
Tipo de Producto: Herbicida Agrícola
Formulación: Suspensión Concentrada - SC
Categoría Toxicológica: III – Ligeramente Peligroso
Cultivo: Arroz.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

BISPYRIBAC DEL MONTE 400 SC inhibe la actividad enzimática de la ALS (acetolactato sintetasa) bloqueando la biosíntesis de varios aminoácidos esenciales para el crecimiento de las plantas.

COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:

Bispyribac sodium.....400 g/L
sodium 2,6-bis [(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]benzoate de formulación a 20 °C

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1L

RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con un Agrónomo o Ingeniero Agrónomo”

Cultivo	Maleza	Dosis	P.C.	P.R.
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Liendre puerco (<i>Echinochloa colona</i>)	0.125 L /ha Aplicar en post - emergencia al cultivo y a las malezas	N.A.	0 Horas

P.C: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

N.A: No Aplica

FICHA TÉCNICA
BISPYRIBAC DEL MONTE 400 SC
Registro Nacional ICA No. 1696
Titular del Registro: DEL MONTE AGROSCIENCES S.A.S.



FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar una (1) sola vez por ciclo de cultivo. Se recomienda usar cuando el cultivo y las malezas tengan entre 2 a 4 hojas. Se recomienda drenar el cultivo antes de la aplicación e inundar dos días después.

Debe ser aplicado dentro de un programa de rotación con otros herbicidas de diferente mecanismo de acción. Aplicar en post - emergencia al cultivo y a las malezas.

EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA

Calibre bien los equipos y asegure un tamaño y distribución de gotas uniforme. Se recomienda aplicar con boquillas de abanico plano a una presión de 40 a 50 psi.

Al aire libre, diluir la dosis del producto en la mitad del volumen de agua, haciendo un triple lavado del envase.

Completar el volumen con agua agitando constantemente hasta obtener una mezcla homogénea. Volumen de mezcla en agua de 200 a 300 L/Ha. Se debe mantener una presión y descarga constante.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

No se han observado efectos fitotóxicos bajo las recomendaciones de uso, sin embargo, se recomiendan pruebas previas en nuevas variedades de cultivo.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS 24 HORAS
CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

Importado y Distribuido por:
Del Monte Agrosiences S.A.S.