

## GENERALIDADES

<b>Producto:</b>	DIFENOCONAZOLE DEL MONTE 250 EC
<b>Tipo de Producto:</b>	Fungicida Agrícola
<b>Formulación:</b>	Concentrado Emulsionable - EC
<b>Categoría Toxicológica:</b>	II – Moderadamente Peligroso
<b>Cultivo:</b>	Tomate, Banano.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

**DIFENOCONAZOLE DEL MONTE 250 EC** es un fungicida sistémico a base de difenoconazol, recomendado para la prevención y el control de (*Alternaria solani*) en el cultivo de tomate. **DIFENOCONAZOLE DEL MONTE 250 EC** es rápidamente absorbido por la planta y actúa sobre el crecimiento subcuticular de las hifas en los tejidos afectados. El desarrollo de los conidios, así como su virulencia y habilidad también son claramente afectadas.

**DIFENOCONAZOLE DEL MONTE 250 EC** detiene el desarrollo de los hongos interfiriendo con la biosíntesis de los esteroides de las membranas celulares del patógeno.

## COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:

Difenoconazole .....250 g/L  
 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether de formulación a 20°C

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1L

## RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con un Agrónomo o Ingeniero Agrónomo”

Cultivo	Maleza	Dosis	P.C.	P.R.
Tomate ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	Gota temprana ( <i>Alternaria solani</i> )	250 cm <sup>3</sup> /ha En una (1) sola aplicación	7 días	12 Horas
Banano ( <i>Musa paradisiaca</i> L.)	Sigatoka Negra ( <i>Mycosphaerella fijiensis</i> )	0.4 L/ha	0 días	4 horas

**P.C.:** Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**P.R.:** Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

**N.A.:** No aplica.

FICHA TÉCNICA  
DIFENOCONAZOLE DEL MONTE 250 EC  
Registro Nacional ICA No. 1490  
Titular del Registro: DEL MONTE AGROSCIENCES S.A.S.



## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

DIFENOCONAZOLE DEL MONTE 250 EC es un fungicida preventivo curativo, que se debe aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad. Rotar con fungicidas de diferente mecanismo de acción para evitar la aparición de cepas resistentes. Debe evitarse dosis reducidas (subdosis) del producto.

## EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA

Se puede aplicar con los equipos terrestres y aéreos de uso común. Es importante asegurar buen cubrimiento de todo el follaje. Llenar el recipiente o tanque del equipo de aspersión hasta la mitad de su volumen, agregar la dosis de DIFENOCONAZOLE DEL MONTE 250 EC agitar vigorosamente, completar el volumen y mantener la agitación. Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250  $\mu$ m aprox. Volumen de aplicación 600 L/ha.

## COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

## INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



**EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS 24 HORAS**  
**CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.**  
**En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.**

**Importado y Distribuido por:**  
Del Monte Agrosiences S.A.S.