

GENERALIDADES

Producto:	CLOROTALONIL DEL MONTE 720 SC
Tipo de Producto:	Fungicida Agrícola
Formulación:	Suspensión Concentrada - SC
Categoría Toxicológica:	III – Ligeramente Peligroso
Cultivo:	Papa, Uva, Banano.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CLOROTALONIL DEL MONTE 720 SC es un fungicida foliar, no sistémico con acción preventiva, de amplio espectro. Inhibe la respiración (transformación de los carbohidratos en energía) de las células del hongo, debido a que las moléculas se unen a grupos sulfhidrilo de los aminoácidos. Las enzimas que afectan al ciclo de Krebs se desactivan y no se produce ATP. Al no poder completar este proceso esencial, la célula muere.

Se considera que **CLOROTALONIL DEL MONTE 720 SC** actúa como un fungí-tóxico general, no específico. Se caracteriza por ser de acción rápida, acumulándose grandes cantidades en las células del hongo y reaccionando indiscriminadamente con los componentes celulares. Los síntomas generales de la interacción entre el **CLOROTALONIL DEL MONTE 720 SC** y las células fúngicas son el retardo en el crecimiento del micelio y la inhibición de la germinación de las esporas. No aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:

Clorotalonil.....720 g/L
Tetrachloroisophthalonitrile de formulación a 20 °C

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1L

RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con un Agrónomo o Ingeniero Agrónomo”

Cultivo	Maleza	Dosis	P.C.	P.R.
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Gota (<i>Phytophthora infestans</i> Mont. De Bary)	1 L/ha	7 días	4 Horas
Uva (<i>Vitis vinifera</i>)	Oidio de la vid (<i>Uncinula necator</i>)	1 L/ha	30 días	
Banano (<i>Musa paradisiaca</i>)	Sigatoka Negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	1.5 L/ha	0 días	

P.C.: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Papa: Aplicar preventivamente y dentro de un programa de rotación. Realizar una sola aplicación por ciclo de cultivo.

Uva: Aplicar desde brotación hasta 50% de floración con intervalos de 7-10 días y un volumen mínimo de 1000 L/ha de agua. No aplicar después de este período para evitar posibles lesiones necrosadas (russet) en el fruto.

EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA

CLOROTALONIL DEL MONTE 720 SC puede emplearse en forma efectiva en aplicaciones diluidas o concentradas, pero necesita cobertura completa del follaje para garantizar control de la enfermedad. Para garantizar uniformidad en la mezcla, coloque la cantidad de CLOROTALONIL DEL MONTE 720 SC a aplicar en un recipiente con agua hasta la mitad y agite suficientemente, complete luego el volumen de agua requerido mientras continúa agitando la mezcla, mecánica, hidráulica o manualmente.

Utilice siempre equipos de aplicación calibrados correctamente y asegúrese de que la aplicación se realice uniformemente.

CLOROTALONIL DEL MONTE 720 SC debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas. Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación, así como el ritmo de aplicación del aplicador.

En papa aplicar como mínimo 150 L/ha de agua al inicio del cultivo e incrementar el volumen de acuerdo a la edad y desarrollo del mismo.

En uva aplicar un volumen mínimo de 1000 L/ha. Para volúmenes de agua mayores a 1.000 L/ha, respetar la dosis por concentración.

FICHA TÉCNICA
CLOROTALONIL DEL MONTE 720 SC
Registro Nacional ICA No. 1589
Titular del Registro: DEL MONTE AGROSCIENCES S.A.S.



COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos.
No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS 24 HORAS
CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

Importado y Distribuido por:
Del Monte Agrosiences S.A.S.