


SOLUTII PENTRU TEMA DE CASA #4

Problema

Considerați sistemul prezentat în figură.

- (a) Folosiți criteriul de stabilitate Routh pentru determinarea valorilor lui K care asigură stabilitatea.
- (b) Desenați locul rădăcinilor ecuației caracteristice în funcție de $K > 0$. Indicați pe figură toate punctele de interes.



Soluție

(a)

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K \cdot \frac{5}{s \cdot (s+2)}}{1 + K \cdot \frac{1}{s+1} \cdot \frac{5}{s \cdot (s+2)}} = \frac{5 \cdot K \cdot (s+1)}{s \cdot (s+1)(s+2) + 5K} = \frac{5 \cdot K \cdot (s+1)}{s^3 + 3s^2 + 2s + 5K}$$

Criteriul Routh:

$$\begin{array}{rcl} s^3 & 1 & 2 \\ s^2 & 3 & 5K \\ s & \frac{6-5K}{3} & \\ s^0 & 5K & \end{array}$$

$$K > 0, 6 > 5K \Rightarrow 0 < K < 1.2$$

(b)

Trebuie să desenăm locul rădăcinilor pentru:

$$1 + K \frac{5}{s(s+1)(s+2)} = 0$$

Regula 1: avem 3 ramuri, toate 3 terminându-se în asimptote.

Regula 2: locul conține axa reală între -1 și 0, cât și între -infinit și -2.

Regula 3: centrul asimptotelor este la:

$$\alpha = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m} = \frac{0 - 1 - 2}{3} = -1$$

și unghiurile sunt 180, 60, -60.

Regula 4: pentru $K=1.2$, avem mai sus criteriul Routh

$$s^3 + 3s^2 + 2s + 6 = 0 \Leftrightarrow (s^2 + 2)(s + 3) = 0 \Leftrightarrow s = -3, \pm i \cdot 1.414$$

Regula 5: Puncte de ramificație:

$$s^2 + 6s + 5 + s^2 + 5s + s^2 + s = 0 \Leftrightarrow 3s^2 + 12s + 5 = 0 \Leftrightarrow s_1 \approx -0.55 \quad s_2 = -3.5$$

