Leadville series							
TAXONOMIC CLASS: Loamy-skeletal, mixed, superactive Ustic Glossocryalfs							
TYPICAL PEDON: Leadville stony loam - forest.							
Hz	**D (in.)**	**Ro (%)**	**C**	**T**	**S**	**+/-**	**pH**
Oi	3	†	†	†	†	†	†
Oe	4	‡	‡	‡	‡	‡	‡
A	5	10	10YR 4/2 10YR 2/2	l	gr	-	5.6-6.0
E	12	10	7.5YR 7/3 7.5YR 5/3	l	gr platy	-	5.6-6.0
B/E	18	40	5YR 5/4 7.5YR 7/3 5YR 4/4 7.5YR 5/3	s c l	gr sbk	-	6.1-6.5
Bt1	34	70	5YR 5/4 5YR 4/4	s c l	sbk	-	6.1-6.5
Bt2	44	60	5YR 5/4 5YR 4/4	s c l	sbk	-	6.1-6.5
C	64	70	5YR 5/4 5YR 4/4	s l	ma	-	6.6-7.3

† Slightly decomposed needles, bark, twigs, and grass remains.
‡ Partially decomposed organic material derived from the materials overlying this horizon.
Source: California Soil Resource Lab. (n.d.). *Soil Data Explorer – Leadville*. University of California, Davis. Retrieved September 18, 2026, from https://soilmap2-1.lawr.ucdavis.edu/sde/?series=leadville