




Jan 9-11:17 AM




Jan 9-11:24 AM




Jan 9-11:26 AM




Jan 9-11:28 AM



Jan 9-11:31 AM



Jan 9-11:34 AM



Jan 9-11:35 AM

$$\overrightarrow{PQ} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1 \rangle$$

(ex)

$$P(2, 5, 6)$$

$$Q(-5, 2, 0)$$

$$\overrightarrow{PQ} = \langle -7, -3, -6 \rangle$$

Jan 9-11:38 AM

Defⁿ:

The magnitude (length) of $\vec{v} = \overrightarrow{PQ}$ is the nonnegative number given by

$$|\vec{v}| = |\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

Jan 9-11:40 AM

Vector operations

Defⁿ: Let $\vec{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ and $\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ be any vectors and k is

Jan 9-11:41 AM

any scalar.


Addition:

$$\vec{u} + \vec{v} = \langle u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3 \rangle$$

Scalar multiplication:


$$k\vec{u} = \langle ku_1, ku_2, ku_3 \rangle$$

Jan 9-11:44 AM



Jan 9-11:47 AM

If $k < 0$, then
 $k\vec{u}$ is in the
 opposite direction of \vec{u} .



Jan 9-11:48 AM

(Ex) Find the
 length of

(a) $\vec{v} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}} \right\rangle$

(b) $A(1, 3)$ and
 $B(2, -1)$
 $|\vec{AB}| = ?$

Jan 9-11:49 AM

(a) $|\vec{v}| = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2 + \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2}$
 $= \sqrt{\frac{1}{5} + \frac{4}{5}} = 1$

(b) $|\vec{AB}| = \sqrt{(2-1)^2 + (-1-3)^2}$
 $= \sqrt{1 + 16} = \sqrt{17}$

Jan 9-11:51 AM

(Ex) Given

$\vec{u} = \langle 4, 0, 3 \rangle$

$\vec{v} = \langle -2, 1, 5 \rangle$

(1) $\vec{u} + \vec{v}$

(2) $3\vec{v}$

(3) $\vec{u} - \vec{v}$

Jan 9-11:54 AM

(1) $\vec{u} + \vec{v} = \langle 2, 1, 8 \rangle$

(2) $3\vec{v} = \langle -6, 3, 15 \rangle$

(3) $\vec{u} - \vec{v}$
 $= \vec{u} + (-\vec{v})$
 $= \langle 6, -1, -2 \rangle$

Jan 9-11:55 AM

Properties of vector
operations:

Let \vec{u} , \vec{v} and \vec{w} be
 vectors and a and
 b are scalars.

(1) $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$

Jan 9-11:57 AM

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} \\
 &= \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) \\
 (3) \quad & \vec{u} + \vec{0} = \vec{u} \\
 (4) \quad & \vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0} \\
 (5) \quad & 0\vec{u} = \vec{0}
 \end{aligned}$$

Jan 9-11:59 AM

$$\begin{aligned}
 (6) \quad & 1\vec{u} = \vec{u} \\
 (7) \quad & a(b\vec{u}) \\
 &= (ab)\vec{u} \\
 (8) \quad & a(\vec{u} + \vec{v}) \\
 &= a\vec{u} + a\vec{v}
 \end{aligned}$$

Jan 9-12:01 PM


$$\begin{aligned}
 (9) \quad & (a+b)\vec{u} \\
 &= a\vec{u} + b\vec{u}
 \end{aligned}$$

Unit Vectors:

A vector \vec{v} of length 1 is called a unit vector.

Jan 9-12:02 PM

The standard unit vectors in 2-D are:

$$\begin{aligned}
 \vec{i} &= \langle 1, 0 \rangle \\
 \vec{j} &= \langle 0, 1 \rangle
 \end{aligned}$$


Jan 9-12:05 PM

$$\begin{aligned}
 \vec{i} &= \langle 1, 0, 0 \rangle \\
 \vec{j} &= \langle 0, 1, 0 \rangle \\
 \vec{k} &= \langle 0, 0, 1 \rangle \\
 \vec{v} &= \langle v_1, v_2, v_3 \rangle \\
 \vec{v} &= v_1\vec{i} + v_2\vec{j} + v_3\vec{k}
 \end{aligned}$$

Jan 9-12:06 PM

$$\begin{aligned}
 (ex) \quad & \vec{v} = \langle -1, 4 \rangle \\
 & \vec{v} = -\vec{i} + 4\vec{j} \\
 (ex) \quad & \vec{u} = -5\vec{i} - 5\vec{j} + 10\vec{k} \\
 & \vec{u} = \langle -5, -5, 10 \rangle \\
 (ex) \quad & \vec{v} = 2\vec{i} + 15\vec{k} \\
 & \vec{v} = \langle 2, 0, 15 \rangle
 \end{aligned}$$

Jan 9-12:07 PM

Let \vec{u} be a unit
vector and
define $\vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$

(ex) $\vec{v} = \langle 2, 3 \rangle$
 $|\vec{v}| = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}$

Jan 9-12:11 PM

$$\begin{aligned}\vec{u} &= \frac{\langle 2, 3 \rangle}{|\vec{v}|} \\ &= \frac{\langle 2, 3 \rangle}{\sqrt{13}} \\ &= \left\langle \frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}} \right\rangle\end{aligned}$$

unit vector

Jan 9-12:12 PM