

# Cinq rendez-vous par semaine

Dont deux de trente minutes à la maison. C'est la seule page à avoir sous les yeux au quotidien — tout le reste est en annexe.

Lundi

## Renfo A

Poussée et tronc, 30 min, sans matériel.

Mardi

## Natation

La séance qui ne coûte rien aux articulations.

Mercredi, jeudi ou vendredi

## Padel + Renfo B

Deux séances à placer librement sur ces trois jours, jamais le même jour. Le Renfo B — tirage et chaîne postérieure — est le plus important des deux : c'est lui qui protège le bas du dos. Une sortie vélo courte le troisième jour si l'envie est là, sinon repos.

Samedi

## Vélo

La sortie longue de la semaine.

Dimanche

## Bilan

Poids moyen, tour de taille tous les 15 jours, et tu cuisines pour la semaine.

## Les six choses qui font le résultat

Protéines

### Une protéine dans chaque repas

Environ 130 g sur la journée. Le seul point technique qui compte vraiment : ça rassasie, et ça protège le muscle pendant que tu perds du gras.

Assiette

### La moitié en légumes

Un quart de protéines, un quart de féculents. Rien à peser, rien à compter.

Boissons

### Rien de calorique dans le verre

Ni soda, ni jus, ni boisson énergétique. Sur le vélo en dessous de 90 minutes, l'eau suffit.

Alcool

### Quatre verres par semaine, maximum

Jamais en semaine. C'est le poste le plus directement lié au gras abdominal.

Marche

### 8 000 pas par jour hors sport

Sur une semaine, ça pèse plus lourd qu'une séance de plus — et ça ne coûte aucune récupération.

Sommeil

### Sept heures, heure de coucher fixe

À déficit égal, mal dormir veut dire perdre du muscle au lieu du gras, et avoir faim le lendemain.

Ce qu'on ne fait pas

**Des abdos pour le ventre.** Ils renforcent le muscle sous la couche de gras, ils ne la font pas fondre. Le ventre et le bas du dos sont les dernières zones à céder chez l'homme : elles suivront le total, avec plusieurs semaines de retard sur la balance. Sans course à pied ni boxe, ta semaine n'a plus d'impact — c'est bon pour tes douleurs, mais le renforcement devient le socle du plan, pas un complément.

# Garde le sandwich, change de sandwich

Le pain n'est pas le problème. C'est la combinaison habituelle : baguette blanche, garniture pauvre en protéines, sauce grasse, chips à côté, soda. Bien monté, un sandwich fait un excellent déjeuner.

## Le réflexe actuel

Baguette jambon-beurre ou club industriel, un paquet de chips, un soda.

**1 000** kcal

**25 g** de protéines

La moitié de ta journée dans un repas qui ne tient pas, et une fringale vers 16 h.

## Le sandwich qui marche

Pain complet, poulet ou thon en double dose, crudités, moutarde. Une salade à côté, de l'eau.

**550** kcal

**35 g** de protéines

Même temps, même prix, même praticité. Tu tiens jusqu'au dîner sans y penser.

## Les cinq réglages, du plus au moins rentable

| Le réglage                     | Pourquoi                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'accompagnement décide        | Salade ou crudités à la place des chips. À lui seul, ce changement retire plus de calories que tout le reste réuni.                                 |
| De l'eau, rien d'autre         | Un soda ajoute l'équivalent d'un tiers de sandwich sans rassasier une seconde.                                                                      |
| Une protéine franche, doublée  | Poulet, thon, œuf, rosbif. Fuis les sandwiches dont la garniture est surtout du fromage et de la sauce. Vise 30 g minimum.                          |
| Pain complet ou aux céréales   | Plus de fibres, satiété plus longue. Si seule la baguette blanche est disponible, ce n'est pas grave : les quatre autres points comptent davantage. |
| Moutarde plutôt que mayonnaise | Ou sauce à part. Une dose de mayo, c'est facilement 150 kcal invisibles.                                                                            |

## Le bon rythme sur la semaine

2 jours

### Sandwich acheté

Avec les cinq réglages ci-dessus. C'est la solution pratique, elle a le droit d'exister.

3 jours

### Boîte préparée

Tu cuisines en double le dimanche et un soir en semaine : le déjeuner du lendemain est réglé sans effort supplémentaire.

Le meilleur rapport

### Sandwich fait maison

Pain complet, 150 g de blanc de poulet, crudités, moutarde. Trois minutes le matin, deux fois moins cher, contrôle total.

Le repère pour n'importe quel déjeuner, acheté ou non : autour de 550 à 650 kcal, au moins 30 g de protéines, et des légumes présents.

# Une liste courte, à faire tourner

Le chiffre à droite, ce sont les protéines du repas.

|                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Petit-déjeuner</b> le repas le plus souvent raté côté protéines          |      |
| Cœufs brouillés (3), deux tranches de pain complet, un fruit                | 30 g |
| Skyr (200 g), flocons d'avoine (50 g), fruits rouges, une poignée d'amandes | 30 g |
| Omelette de 3 œufs au jambon et aux tomates, une tranche de pain complet    | 32 g |
| Fromage blanc (250 g), banane, miel, noix                                   | 28 g |
| Pain complet, deux œufs durs, avocat écrasé                                 | 20 g |

|                                                                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Déjeuner</b> deux jours de sandwich, trois jours de boîte                                                      |      |
| <b>Sandwich maison ou acheté</b> — pain complet, poulet ou thon en double dose, crudités, moutarde, salade à côté | 35 g |
| Lentilles, thon, tomates, oignon rouge, vinaigrette moutarde                                                      | 40 g |
| Poulet rôti, riz complet, légumes rôtis au four                                                                   | 40 g |
| Poke bowl maison : saumon ou thon, riz, edamame, concombre, avocat                                                | 35 g |
| Salade de pâtes complètes, deux œufs durs, mozzarella, tomates, basilic                                           | 30 g |
| Wrap de blé complet, poulet, crudités, fromage blanc citronné                                                     | 32 g |
| Les restes du dîner de la veille, en doublant les quantités à la cuisson                                          | —    |

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Dîner</b> c'est là que tu contrôles tout                       |      |
| Filet de poisson blanc, patate douce au four, brocolis            | 35 g |
| Poulet, ratatouille, quinoa                                       | 40 g |
| Steak haché 5 %, haricots verts, pommes de terre vapeur           | 38 g |
| Chili con carne (haché 5 % et haricots rouges), riz               | 40 g |
| Saumon, poêlée de légumes, boulgour                               | 35 g |
| Curry de pois chiches aux épinards, riz complet                   | 22 g |
| Soir léger : omelette, grande salade, une tranche de pain complet | 25 g |

|                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Si tu as faim entre les repas</b> une place prévue vaut mieux qu'une envie subie |      |
| Un skyr ou un fromage blanc                                                         | 20 g |
| Une poignée d'amandes (30 g)                                                        | 6 g  |
| Un œuf dur, ou deux carrés de chocolat noir prévus à l'avance                       | 6 g  |

# Les repas, oui. Le plan, non.

Les plats de la page précédente sont bons pour des enfants de 9 et 12 ans. Le cadre qui les entoure — déficit, cibles, portions contrôlées, pesée — ne leur est pas destiné et peut leur faire du mal.

## Ce qui se partage sans réserve

Les mêmes plats, à la même table. Un enfant n'a pas besoin d'un menu séparé.

Des légumes à chaque repas, un petit-déjeuner avec de vraies protéines, de l'eau comme boisson par défaut, et de la cuisine maison plutôt que de l'ultra-transformé.

Aucun aliment interdit. Le gâteau d'anniversaire reste un gâteau d'anniversaire.

## Ce qui ne se partage jamais

**Le déficit calorique.** Un enfant en croissance qui mange en restriction ralentit sa croissance. Ce n'est pas une précaution théorique.

**Les portions contrôlées.** Eux mangent à leur faim, se resservent, et s'arrêtent quand ils n'ont plus faim. C'est leur régulation qui décide, pas la tienne.

**Les cibles chiffrées, la balance, le tableau de bord.** Rien de tout ça n'entre dans leur champ de vision.

## Le point le plus important, et il n'est pas alimentaire

Ce qui installe durablement un rapport compliqué à la nourriture, ce n'est presque jamais le contenu de l'assiette. Ce sont les mots autour. « Je fais attention », « c'est trop gras », « tu as assez mangé », les commentaires sur son corps ou sur le tien devant eux. À 9 et 12 ans, ces phrases s'enregistrent. Le plus sûr est que ton propre plan reste invisible pour eux : tu manges la même chose qu'eux, tu te sers différemment, et ça ne fait l'objet d'aucun commentaire.

## Ce sur quoi il vaut la peine d'agir, à leur âge

### Bouger

Le vrai levier chez l'enfant, et de loin. Une heure d'activité par jour, sous n'importe quelle forme — club, vélo, jeu dehors. Ce n'est pas du sport, c'est du mouvement.

### Dormir

9 à 11 heures à cet âge. Le manque de sommeil pèse plus sur le poids d'un enfant que la plupart des ajustements alimentaires.

### Boire de l'eau

Sodas et jus de fruits à la maison, c'est le seul poste où la restriction est justifiée et sans risque. Le reste, non.

## Si tu t'inquiètes vraiment pour le poids de l'un des deux

C'est une conversation avec le pédiatre ou le médecin traitant, pas un ajustement à la maison. La corpulence d'un enfant se lit sur une courbe, en tenant compte de l'âge, du stade de croissance et de l'évolution dans le temps — pas à l'œil. Un enfant peut prendre du poids un an avant une poussée de taille, et ce n'est qu'une étape normale.

# Le calendrier

Deux périodes de perte séparées par une trêve volontaire. C'est plus tenable qu'un long tunnel de six mois, et ça évite de se battre contre décembre — un combat que presque personne ne gagne, et qui fait abandonner en janvier.

| Bloc                                  | Dates            | Ce qu'on fait                                                                                                                                                                               | Repère       |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Mise en place<br>semaines 1 à 4    | 7 sept → 4 oct   | Aucun déficit. Tu installes les deux séances de renforcement, les protéines à chaque repas, la pesée et le tour de taille. Le but est que les habitudes tiennent, pas que la balance bouge. | Poids stable |
| 2. Première perte<br>semaines 5 à 13  | 5 oct → 6 déc    | Déficit actif, neuf semaines. Le bloc qui fait le gros du travail, avec une semaine de décharge sur le renforcement à mi-parcours.                                                          | −3,5 kg      |
| 3. Trêve<br>semaines 14 à 17          | 7 déc → 3 janv   | Retour à l'équilibre, volontairement. L'objectif est de tenir le poids, pas d'en perdre. Le renforcement continue.                                                                          | ±1 kg        |
| 4. Deuxième perte<br>semaines 18 à 25 | 4 janv → 28 févr | Deuxième bloc, mêmes règles. C'est là que le ventre et le bas du dos commencent vraiment à changer visiblement.                                                                             | −3 kg        |
| 5. Sortie<br>semaines 26 à 29         | 1 mars → 28 mars | Remontée progressive vers l'équilibre, environ 100 kcal de plus par semaine. La phase qui décide si la perte tient dans le temps.                                                           | Poids stable |

## Ce que « déficit » veut dire concrètement

Pour toi, autour de 2 200 à 2 400 kcal par jour pendant les blocs 2 et 4. Tu n'es pas obligé de compter : appliquer les six règles de la première page y amène naturellement. Mais si tu stagnes, compter une seule semaine te dira exactement où ça fuit. Ne descends pas sous 2 000 kcal — en dessous, tu perds du muscle et tu craques.

### Le piège du mois 1

L'envie de faire plus, plus vite. Un plan tenu à 80 % pendant six mois bat un plan parfait tenu trois semaines. Le rythme de 0,4 kg par semaine n'est pas de la prudence excessive : au-delà, la part de muscle perdue augmente nettement.

# Les deux séances de renforcement

Version adaptée à un coude droit douloureux et à un dos sensible. Poids du corps, 30 minutes, à la maison. Trois à quatre séries, 90 secondes de récupération, on s'arrête deux répétitions avant l'échec.

Lundi

**Séance A**

Poussée et tronc

|                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Pompes inclinées</b>                                                                    | 4 × 8-15        |
| Mains sur un plan surélevé, sur les poings ou sur deux livres pour garder le poignet droit |                 |
| <b>Squat</b>                                                                               | 3 × 12-20       |
| Puis squat bulgare, pied arrière sur une chaise                                            |                 |
| <b>Planche sur avant-bras</b>                                                              | 3 × 30-60 s     |
| Fessiers serrés, dos plat, jamais sur les mains                                            |                 |
| <b>Dead bug</b>                                                                            | 3 × 8-10 / côté |
| Bas du dos plaqué au sol en permanence                                                     |                 |
| <b>Pont fessier</b>                                                                        | 3 × 12-15       |

Mercredi, jeudi ou vendredi

**Séance B**

Dos et chaîne postérieure, sans rien serrer dans la main

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Y – T – W au sol</b>                                      | 3 × 10 chacun |
| À plat ventre, bras tendus, pouces vers le haut, sans charge |               |
| <b>Reverse snow angel</b>                                    | 3 × 8         |
| À plat ventre, bras qui balaient lentement                   |               |
| <b>Hip thrust une jambe</b>                                  | 3 × 10-15     |
| Épaules posées sur le canapé                                 |               |
| <b>Fentes marchées</b>                                       | 3 × 10-12     |
| <b>Bird-dog</b>                                              | 3 × 8 / côté  |
| Lent, deux secondes de pause en haut                         |               |
| <b>Gainage latéral</b>                                       | 3 × 25-45 s   |
| Sur l'avant-bras, genoux fléchis si l'appui gêne             |               |

Ce qui a été retiré, et pourquoi

Les **dips sur chaise** et le **rowing australien** ne sont plus là. Le premier écrase le poignet en extension, le second demande de serrer fort : ce sont exactement les deux gestes qui entretiennent une douleur de coude. Les Y-T-W et le reverse snow angel les remplacent — ils travaillent le haut du dos sans que la main ait quoi que ce soit à tenir.

**Comment progresser**

Dès que tu atteins le haut de la fourchette sur toutes les séries, tu passes à la variante plus difficile ou tu ralentis la descente à trois secondes. Toutes les six à huit semaines, une semaine de décharge à moitié des séries. Le rowing pourra revenir, en prise neutre, quand le coude sera silencieux.

## Le coude, en dehors des séances

**Porter autrement**

Un sac à dos plutôt qu'un sac à la main. Quand tu dois porter, paume vers le haut : ça décharge les tendons qui font mal. Et pousse les portes avec le corps plutôt qu'en attrapant la poignée à bout de bras.

**Le poste de travail**

Souris et clavier sont les suspects les plus fréquents quand la douleur n'a rien à voir avec le sport. Avant-bras posé sur le bureau, coude à 90°, souris près du corps. Une souris verticale change souvent les choses en quelques semaines.

**Ce que ça vaut de faire**

Une douleur qui gêne les gestes du quotidien depuis un moment mérite un avis. Le repos seul ne règle presque jamais ce type de tendinopathie : c'est le renforcement progressif et guidé qui marche. Un kiné te donnera le protocole en une séance.

Si un exercice réveille une douleur, tu l'arrêtes et tu le remplaces — ça ne se négocie pas. Si tu dois sauter une séance entière, saute la A : la B est celle qui protège le dos.

# Le suivi

Trois mesures, deux règles de correction. Rien d'autre.

### Ce que tu mesures

- Le poids**, chaque matin à jeun. Tu notes, mais tu ne regardes que la moyenne des sept jours : le quotidien varie de plus ou moins 1,5 kg pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le gras.
- Le tour de taille**, au nombril, le matin, tous les quinze jours. C'est ta vraie mesure : il bougera avant la balance.
- Une photo** toutes les quatre semaines, même lumière, même endroit.

### Quand corriger

- Moyenne hebdomadaire **stable trois semaines de suite** : retire environ 150 kcal par jour, ou ajoute 2 000 pas. Un seul changement à la fois.
- Perte **supérieure à 0,7 kg par semaine** : tu vas trop vite et tu perds du muscle. Remonte les portions.
- Force en chute sur les deux séances pendant deux semaines : même signal, même correction.

## Tableau de bord

| Date    | Poids, moyenne 7 jours | Tour de taille | Remarques |
|---------|------------------------|----------------|-----------|
| 7 sept  |                        |                |           |
| 21 sept |                        |                |           |
| 5 oct   |                        |                |           |
| 19 oct  |                        |                |           |
| 2 nov   |                        |                |           |
| 16 nov  |                        |                |           |
| 30 nov  |                        |                |           |
| 14 déc  |                        |                |           |
| 4 janv  |                        |                |           |
| 18 janv |                        |                |           |
| 1 févr  |                        |                |           |
| 15 févr |                        |                |           |
| 1 mars  |                        |                |           |
| 15 mars |                        |                |           |
| 28 mars |                        |                |           |

## Quand ça dérape

| La situation                                     | La réponse                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un repas ou un week-end hors plan                | Rien. Un écart isolé ne pèse pas assez pour effacer une semaine. Tu reprends au repas suivant, pas en sautant le petit-déjeuner du lendemain ni en doublant le sport. |
| Une semaine sans aucune séance                   | Tu reprends à la charge de la semaine précédente, pas plus haut.                                                                                                      |
| Le ventre ne bouge pas alors que le poids baisse | Attendu. C'est la dernière zone, elle suit avec plusieurs semaines de retard. D'où le mètre ruban tous les quinze jours plutôt que le miroir tous les matins.         |
| Blessure ou fatigue persistante                  | Repasse en équilibre calorique le temps que ça passe. Un déficit prolongé ralentit la récupération.                                                                   |