

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE Corso di Studi in Ingegneria Informatica Ricerca Operativa 1 – Prima prova intermedia 7 maggio 2019

Nome:	Matricola:
Cognome:	

Esercizio 1

È dato il problema di PL in figura.

- 1. Risolvere il problema con il metodo grafico.
- 2. Risolvere il problema con il metodo di Fourier-Motzkin.
- 3. Le soluzioni ottenute al punto 1 e 2 sono coerenti?

$$\max x_{1} - x_{2} \\ \begin{cases} 3x_{1} - x_{2} \le 12 \\ x_{1} - x_{2} \ge -2 \\ x_{1} + 3x_{2} \ge -6 \\ x_{1} \ libera \\ x_{2} \ libera \end{cases}$$

Esercizio 2

A partire dal problema dell'Esercizio 1:

- 4. Ridurre il problema in forma standard.
- 5. Utilizzando l'algoritmo del simplesso rivisto (fase 1, se necessaria, e fase 2) trovare una soluzione ottima del problema in forma standard o dimostrare che il problema è inammissibile o illimitato inferiormente.
- 6. La soluzione ottenuta al punto 5 è coerente con quelle dell'esercizio precedente?

Domanda 3

Illustrare le definizioni di (1) base di una matrice, (2) rango di una matrice e (3) soluzione base ammissibile di un problema di PL in forma standard. Dimostrare (4) le condizioni algebriche di illimitatezza e (5) quelle di ottimalità per un problema di PL in forma standard. Fornire un'interpretazione geometrica del cambio di base nell'algoritmo del simplesso nel caso di (6) pivot non degenere e (7) pivot degenere.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE Corso di Studi in Ingegneria Informatica Ricerca Operativa 1 – Prima prova intermedia 21 aprile 2018

Nome:	Matricola:
Cognome:	

Esercizio 1

È dato il problema di PL in figura.

- 1. Risolvere il problema con il metodo grafico.
- 2. Risolvere il problema con il metodo di Fourier-Motzkin.
- 3. Le soluzioni ottenute al punto 1 e 2 sono coerenti?

$$\min -x_{1} + 3x_{2}$$

$$\begin{cases} x_{1} - x_{2} \ge -2\\ 3x_{1} - x_{2} \le 12\\ 5x_{1} + 3x_{2} \ge 6\\ x_{1} \ge 0\\ x_{2} \ libera \end{cases}$$

Esercizio 2

A partire dal problema dell'Esercizio 1:

- 4. Ridurre il problema in forma standard.
- 5. Utilizzando l'algoritmo del simplesso rivisto (fase 1, se necessaria, e fase 2) trovare una soluzione ottima del problema in forma standard o dimostrare che il problema è inammissibile o illimitato inferiormente.
- 6. La soluzione ottenuta al punto 5 è coerente con quelle dell'esercizio precedente?

Domanda 3

Illustrare le definizioni di (1) poliedro, (2) vertice, (3) direzione e (4) direzione estrema di un poliedro. Partendo dal teorema di Weyl-Minkowski, dimostrare (5) le condizioni geometriche di ottimalità e (6) quelle di illimitatezza per un problema di PL.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE Corso di Studi in Ingegneria Informatica **Ricerca Operativa 1 – Prima prova intermedia** 21 aprile 2018

Nome:	Matricola:
Cognome:	

Esercizio 1

È dato il problema di PL in figura.

- 1. Risolvere il problema con il metodo grafico.
- 2. Risolvere il problema con il metodo di Fourier-Motzkin.
- 3. Le soluzioni ottenute al punto 1 e 2 sono coerenti?

$$\min -x_1 + 2x_2 \\ \begin{cases} x_1 - x_2 \ge -2 \\ 3x_1 - x_2 \le 12 \\ x_1 + 3x_2 \ge -6 \\ x_1 \ libera \\ x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Esercizio 2

A partire dal problema dell'Esercizio 1:

- 4. Ridurre il problema in forma standard.
- 5. Utilizzando l'algoritmo del simplesso rivisto (fase 1, se necessaria, e fase 2) trovare una soluzione ottima del problema in forma standard o dimostrare che il problema è inammissibile o illimitato inferiormente.
- 6. La soluzione ottenuta al punto 5 è coerente con quelle dell'esercizio precedente?

Domanda 3

Illustrare le definizioni di (1) base di una matrice e (2) soluzione base ammissibile di un problema di PL in forma standard. Dimostrare che l'operazione di pivot dell'algoritmo del simplesso garantisce sempre il passaggio da una base ammissibile a: (3) una nuova base, (4) che quest'ultima è anche ammissibile, e (5) che la nuova base ha costo non superiore alla precedente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE Corso di Studi in Ingegneria Informatica **Ricerca Operativa 1 – Prima prova intermedia** 21 aprile 2018

Nome:	Matricola:
Cognome:	

Esercizio 1

È dato il problema di PL in figura.

- 1. Risolvere il problema con il metodo grafico.
- 2. Risolvere il problema con il metodo di Fourier-Motzkin.
- 3. Le soluzioni ottenute al punto 1 e 2 sono coerenti?

$$\max 2x_{1} - x_{2} \\ \begin{cases} 3x_{1} - x_{2} \leq 12 \\ x_{1} - x_{2} \geq -2 \\ 2x_{1} + x_{2} \geq 2 \\ x_{1} \ libera \\ x_{2} \ libera \end{cases}$$

Esercizio 2

A partire dal problema dell'Esercizio 1:

- 4. Ridurre il problema in forma standard.
- 5. Utilizzando l'algoritmo del simplesso rivisto (fase 1, se necessaria, e fase 2) trovare una soluzione ottima del problema in forma standard o dimostrare che il problema è inammissibile o illimitato inferiormente.
- 6. La soluzione ottenuta al punto 5 è coerente con quelle dell'esercizio precedente?

Domanda 3

Illustrare le definizioni di (1) base di una matrice, (2) soluzione base ammissibile di un sistema in forma standard, (3) vertice di un poliedro. Dimostrare che una soluzione ammissibile di un problema di PL in forma standard è un vertice del poliedro delle soluzioni ammissibili (4) se e (5) solo se è una soluzione di base ammissibile.