

## LIMITI E CONFRONTO LOCALE

Esercizi svolti

1. Calcolare i seguenti limiti:

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 - x^3 + 1}{\sqrt{x} + x^2 - x^3}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - x^2 + 4x}{x^5 - x}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x - 1}{\sqrt{2x^2 - 1}}$$

$$g) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$$

$$i) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}}{x}$$

$$m) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^4}{\sin^2 x^2}$$

$$o) \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{x - \pi}$$

$$q) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x + 1}{\sqrt[4]{x + 17} - 2}$$

$$s) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \cos x}{\sqrt{x} - 1}$$

$$u) \lim_{x \rightarrow -1^\pm} [x^3 + 1]^*$$

$$x) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[3x + 1]^*}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{x^3}{3x^2 - 4} - \frac{x^2}{3x + 2} \right)$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^4 - x^3 + 1}{1 - x^3}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^3 - 5x^2 - 4x + 12}{x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 4x + 4}$$

$$h) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})$$

$$l) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} (\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x-1})$$

$$n) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{\sin^2 3x}$$

$$p) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}}$$

$$r) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arccos x - \frac{\pi}{2}}{x}$$

$$t) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + M(x)^*}{x + \sqrt{x}}$$

$$v) \lim_{x \rightarrow 1^\pm} [x^4 - 2x^3 - x + 2]^*$$

$$y) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{5 + \cos x}}{x^2 + 1}.$$

\*  $[x]$  e  $M(x)$  denotano rispettivamente la parte intera e la mantissa di  $x$ .

2. Dire se esistono (ed eventualmente calcolare) i seguenti limiti:

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} + \cos x)$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \cos x$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \sin \frac{1}{x}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow +\infty} x M(x).$$

3. Determinare  $\lambda \in \mathbb{R}$  in modo che

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - 1} \left( \sqrt{x^2 + \lambda} + x \right) = 2.$$

4. Calcolare i seguenti limiti:

$$a) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 - \frac{\pi}{x}\right)^{2x}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 3 \sin 2x}{x - 2 \sin 3x}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-2x} - 1}{x}$$

$$g) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\pi^x - 3^x}{x}$$

$$i) \lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{\sin(2^x - 1)}{(2^x - 1)^2}$$

$$m) \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2^{2x} + 2^{-x}}{(2^x - 1)^2}$$

$$o) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \log^3 x + x \log^7 x}{1 + x^3}$$

$$q) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x^x + x^{-\frac{1}{x}}\right)$$

$$s) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\sqrt{1+x}\right)^{\frac{1}{\sin x}}$$

$$u) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi 3^x)}{x}$$

$$x) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\operatorname{tg}^3 x} - 1}{x(\cos x - e^{x^2})}$$

$$w) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi \cos x)}{x \sin x}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 + 3x)}{x^2 + 2x}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{x^2 - \operatorname{tg}(2x^3)}{2x^5 + 5 \sin^3 x}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{x^2}}{x^3 + \sqrt{x}}$$

$$h) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+4x} - 1}{5^x - 1}$$

$$l) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2x^3} - x^6}{4x^6 - \sqrt{x^4 + x^3}}$$

$$n) \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3(2^x - 2^{-x})}{3^x + 3^{-x}}$$

$$p) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \log^5 x + \sqrt[4]{x} \log x}{\sqrt{x}}$$

$$r) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\cos \frac{1}{x}\right)^{x^2}$$

$$t) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - \sqrt{1-x}}{\sin x}$$

$$v) \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \left(e + \frac{2}{x}\right)^x$$

$$y) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(e+x) - 1}{x}$$

$$z) \lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{4+x} - 1)^{\frac{1}{e^x - 1}}.$$

5. Verificare che  $f(x) = \sqrt{x+5} - \sqrt{5}$  e  $g(x) = \sqrt{x+7} - \sqrt{7}$  sono infinitesimi dello stesso ordine per  $x \rightarrow 0$  e determinare  $k \in \mathbb{R}$  tale che  $g(x) \sim k f(x)$  ( $x \rightarrow 0$ ).

6. Confrontare tra loro gli infinitesimi  $x - 2$ ,  $\sqrt[3]{\frac{1}{x} - \frac{1}{2}}$ ,  $(\sqrt{x} - \sqrt{2})^2$  per  $x \rightarrow 2$ .

7. Calcolare l'ordine di infinitesimo  $\alpha$  e la parte principale  $kx^\alpha$  rispetto a  $x$  per  $x \rightarrow 0$

delle seguenti funzioni:

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| a) $e^{3x^4} - 1$  | b) $e^{\sqrt{x^2+1}} - e$            |
| c) $\frac{1 - \cos x}{\sqrt{x} + x^2}$                       | d) $\log(\cos x)$                    |
| e) $\sqrt[3]{x + x^2} - \sqrt[3]{x} + x^2$                   | f) $e^{e^x} - e^{\cos x}$            |
| g) $\log(x + 3) - \log 3$                                    | h) $\sin(2x^2) (\sqrt{1 + 3x} - 1)$  |
| i) $\sqrt{1 - \cos(x^2)}$                                    | l) $\sqrt{1 + x} - \sqrt{1 - x}$     |
| m) $\frac{\sin x + 2\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x} + \sqrt[5]{x}}$ | n) $x^2 + \sin(2x^3) + 1 - e^{-x^2}$ |
| o) $\sin(\pi\sqrt{1+x})$                                     | p) $\frac{1 + \sin x}{1 - x} - 1$    |
| q) $\frac{\sqrt{1 + 3x^2}}{1 + 2x} - 1$                      | r) $\log(\sqrt{9 + x} - 2)$          |

8. Determinare l'ordine di infinitesimo  $\alpha$  e la parte principale  $\frac{k}{x^\alpha}$  rispetto a  $\frac{1}{x}$  per  $x \rightarrow +\infty$  delle seguenti funzioni:

|  |   |
|--|---|
| a) $\frac{2x^2 + \sqrt[3]{x}}{x^3}$      | b) $\operatorname{arctg} \frac{3}{x^2}$ |
| c) $\sqrt{x+1} - \sqrt{x} + \frac{1}{x}$ | d) $\sqrt{\frac{x-3}{x}} - 1$           |
| e) $e^{\frac{x+1}{x}} - e$               | f) $\log\left(\frac{x+3}{x+1}\right)$   |

9. Determinare l'ordine di infinitesimo  $\alpha$  e la parte principale  $k(x-x_0)^\alpha$  rispetto a  $x-x_0$  per  $x$  che tende al valore indicato  $x_0$  delle seguenti funzioni:

|  |   |
|--|---|
| a) $\log x - \log 2 \quad (x \rightarrow 2)$ | b) $e^x - e \quad (x \rightarrow 1)$                |
| c) $1 - \sin x \quad (x \rightarrow \pi/2)$  | d) $1 + \cos(x^2) \quad (x \rightarrow \sqrt{\pi})$ |

10. Determinare l'ordine di infinito  $\alpha$  e la parte principale  $kx^\alpha$  rispetto a  $x$  per  $x \rightarrow +\infty$  delle seguenti funzioni:

|  |  |
|--|--|
| a) $\frac{x^{3/2} + 5x^2}{1 + \sqrt{x} + \sqrt[4]{x}}$ | b) $\sqrt{x^4 + x^3} - x^2 + \sqrt{x}$ |
|--|--|

11. Determinare il dominio e gli eventuali asintoti delle seguenti funzioni:

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a) $f(x) = \frac{x^2 - (x+1) x-2 }{2x+3}$ | b) $f(x) =  x e^{\frac{x+1}{x}}$ |
|---|----------------------------------|

12. Determinare, per  $x \rightarrow +\infty$ , l'asintoto di

$$f(x) = \log(e^x + x).$$

Ha senso cercare l'asintoto per  $x \rightarrow -\infty$ ?

13. Confrontare fra loro i seguenti infiniti per  $x \rightarrow +\infty$  mettendoli in ordine crescente di infinito:

$$2^x, x^x, \frac{x^2}{\log^{100} x}, x \log^{10} x, 2^{5^x}, x^2, 2^x \log x, x^2 2^x.$$

## Svolgimento

1. a)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 - x^3 + 1}{\sqrt{x} + x^2 - x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4}{-x^3} = -\infty.$$

b)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{x^3}{3x^2 - 4} - \frac{x^2}{3x + 2} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 + 4x^2}{(3x^2 - 4)(3x + 2)} = \frac{2}{9}.$$

c)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - x^2 + 4x}{x^5 - x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x + o(x)}{-x + o(x)} = -4.$$

d)

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^4 - x^3 + 1}{1 - x^3} = \frac{1}{0^-} = -\infty.$$

e)

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x - 1}{\sqrt{2x^2 - 1}} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{\sqrt{2}|x|} \frac{1 - \frac{1}{x}}{\sqrt{1 - \frac{1}{2x^2}}} = \frac{\pm 1}{\sqrt{2}}.$$

f) Decomponendo in fattori numeratore e denominatore con la regola di Ruffini otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^3 - 5x^2 - 4x + 12}{x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 4x + 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)^2(2x + 3)}{(x - 2)^2(x^2 + 1)} = \frac{7}{5}.$$

g) Moltiplicando e dividendo per la somma delle radici si ottiene

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x - 1+x}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} = 1.$$

Si può anche procedere utilizzando lo sviluppo  $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x + o(x)$  per  $x \rightarrow 0$ .

h) Procedendo come nell'esercizio precedente otteniamo

$$\sqrt{x}(\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{x} + 1} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}.$$

i) Raccogliendo il termine  $\sqrt[3]{1-x}$  si ha

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{1-x} \frac{\sqrt[3]{\frac{1+x}{1-x}} - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1 + \frac{2x}{1-x}} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3} \frac{2x}{1-x} \frac{1}{x} = \frac{2}{3}, \end{aligned}$$

grazie allo sviluppo  $\sqrt[3]{1+t} = 1 + \frac{1}{3}t + o(t)$  per  $t \rightarrow 0$ .

l) Procedendo come nell'esercizio precedente si ha

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} (\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x-1}) &= \sqrt{x} \sqrt[3]{x-1} \left( \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} - 1 \right) = \\ &= -\sqrt{x} \left( \sqrt[3]{1 + \frac{2}{x-1}} - 1 \right) = -\sqrt{x} \frac{1}{3} \frac{2}{x-1} = 0.\end{aligned}$$

m) Utilizzando il limite fondamentale  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$ , il suo reciproco, e il teorema del cambiamento di variabile nei limiti, otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^4}{\sin^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^4}{x^4} \left( \frac{x^2}{\sin x^2} \right)^2 = 1 \cdot 1 = 1.$$

Alternativamente possiamo usare lo sviluppo  $\sin t = t + o(t)$  per  $t \rightarrow 0$ .

n) Ricordando il limite fondamentale  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t^2} = \frac{1}{2}$  otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{\sin^2 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{(2x)^2} \cdot \left( \frac{3x}{\sin 3x} \right)^2 \cdot \frac{4}{9} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{4}{9} = \frac{2}{9}.$$

Possiamo anche usare lo sviluppo  $\cos t = 1 - \frac{1}{2}t^2 + o(t^2)$  per  $t \rightarrow 0$ .

o) Facendo il cambio di variabili  $x - \pi = t$  otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{x - \pi} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi + t)}{t} = -\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = -1.$$

p) Ponendo  $x - \frac{\pi}{2} = t$  otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos(\frac{\pi}{2} + t)}{t} = -\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = -1.$$

q) Ponendo  $\sqrt[4]{x+17} = t$  abbiamo  $x = t^4 - 17$  e quando  $x$  tende a  $-1$ ,  $t$  tende a  $2$ :

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{\sqrt[4]{x+17}-2} = \lim_{t \rightarrow 2} \frac{t^4-16}{t-2} = \lim_{t \rightarrow 2} (t+2)(t^2+4) = 32.$$

r) Poniamo  $x = \cos t$  da cui  $t = \arccos x$ . Quando  $x$  tende a zero,  $t$  tende a  $\frac{\pi}{2}$ , e ci riconduciamo così al reciproco del limite p):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arccos x - \frac{\pi}{2}}{x} = \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{t - \frac{\pi}{2}}{\cos t} = -1.$$

s)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \cos x}{\sqrt{x} - 1} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left( 1 + \frac{\cos x}{x} \right)}{\sqrt{x} \left( 1 - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty.$$

Abbiamo usato il fatto che  $\cos x$  è limitata e  $\frac{1}{x}$  è infinitesima per  $x \rightarrow +\infty$ , e dunque

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x} = 0.$$

t) La funzione mantissa è limitata, essendo  $0 \leq M(x) < 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ . Da questo segue

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + M(x)}{x + \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(1 + \frac{M(x)}{x}\right)}{x \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)} = 1.$$

u) Disegnando il grafico di  $t = x^3 + 1$ , oppure studiandone il segno, vediamo che quando  $x$  tende a  $-1^\pm$  la variabile  $t$  tende rispettivamente a  $0^\pm$ . Cambiando variabile e ricordando il grafico della parte intera otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow -1^\pm} [x^3 + 1] = \lim_{t \rightarrow 0^\pm} [t] = \begin{cases} 0 & \text{se } t \rightarrow 0^+ \\ -1 & \text{se } t \rightarrow 0^- \end{cases}.$$

v) Studiando il segno di  $t = x^4 - 2x^3 - x + 2 = (x - 2)(x^3 - 1)$  vediamo che quando  $x$  tende a  $1^\pm$  la  $t$  tende rispettivamente a  $0^\mp$ , e dunque

$$\lim_{x \rightarrow 1^\pm} [x^4 - 2x^3 - x + 2] = \lim_{t \rightarrow 0^\mp} [t] = \begin{cases} -1 & \text{se } t \rightarrow 0^- \\ 0 & \text{se } t \rightarrow 0^+ \end{cases}.$$

x) Ricordando che  $t - 1 < [t] \leq t \quad \forall t \in \mathbb{R}$ , abbiamo

$$\frac{3x}{\sqrt{x^2 + 1}} < \frac{[3x + 1]^*}{\sqrt{x^2 + 1}} \leq \frac{3x + 1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

per ogni  $x \in \mathbb{R}$ . Passando al limite e utilizzando il teorema del doppio confronto si ottiene

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[3x + 1]^*}{\sqrt{x^2 + 1}} = 3.$$

y) Essendo  $\sqrt{5 + \cos x}$  limitata e  $\frac{1}{x^2 + 1}$  infinitesima per  $x \rightarrow +\infty$ , si ha

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{5 + \cos x}}{x^2 + 1} = 0.$$

2. a) Si ha

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} + \cos x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \left(1 + \frac{\cos x}{\sqrt{x}}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty.$$

b) Il limite non esiste. Infatti posto  $f(x) = \sqrt{x} \cos x$  e prese le due successioni  $x_n = 2n\pi$  e  $x'_n = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$  si ha  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x'_n = +\infty$ , ma  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = +\infty$ , mentre  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n) = 0$ .

c) Essendo  $\sin \frac{1}{x}$  limitata e  $\sqrt{x}$  infinitesima per  $x \rightarrow 0^+$ , si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \sin \frac{1}{x} = 0.$$

d) Il limite non esiste. Posto  $f(x) = x M(x)$  e  $x_n = n$ ,  $x'_n = n + \frac{1}{2}$ , si ha  $f(x_n) = 0$  e  $f(x'_n) = \frac{1}{2}$  per ogni  $n \in \mathbb{N}$ , e dunque  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$ , mentre  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n) = \frac{1}{2}$ .

3. Calcoliamo il limite in funzione del parametro  $\lambda$ . Poichè  $x$  tende a  $-\infty$  possiamo supporre  $x < 0$  e quindi  $|x| = -x$ . Moltiplicando e dividendo per  $\sqrt{x^2 + \lambda} - x$  otteniamo

$$\sqrt{x^2 - 1} \left( \sqrt{x^2 + \lambda} + x \right) = \frac{\sqrt{x^2 - 1} \cdot \lambda}{\sqrt{x^2 + \lambda} - x} = \frac{\lambda |x| \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}{|x| \left( \sqrt{1 + \frac{\lambda}{x^2}} + 1 \right)} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} \frac{\lambda}{2}.$$

Otteniamo così  $\lambda = 4$ .

4. a)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left( 1 - \frac{\pi}{x} \right)^{2x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[ \left( 1 - \frac{\pi}{x} \right)^x \right]^2 = (e^{-\pi})^2 = e^{-2\pi}.$$

b) Ricordando che  $\log(1+t) = t + o(t)$  per  $t \rightarrow 0$ , otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+3x)}{x^2 + 2x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x + o(x)}{2x + o(x)} = \frac{3}{2}.$$

c) Si ha  $\sin t = t + o(t)$  per  $t \rightarrow 0$ , quindi

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 3 \sin 2x}{x - 2 \sin 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x + o(x)}{-5x + o(x)} = -\frac{6}{5}.$$

d) Essendo  $\operatorname{tg} t = t + o(t)$  per  $t \rightarrow 0$ , si ha  $\operatorname{tg} (2x^3) = 2x^3 + o(x^3) = o(x^2)$  per  $x \rightarrow 0$ ; inoltre  $\sin^3 x = (x + o(x))^3 = x^3 + o(x^3)$  per  $x \rightarrow 0$ , quindi

$$\lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{x^2 - \operatorname{tg} (2x^3)}{2x^5 + 5 \sin^3 x} = \lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{x^2 + o(x^2)}{5x^3 + o(x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{1}{5x} = \pm\infty.$$

e) Posto  $-2x = t$  e ricordando il limite fondamentale  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$ , abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-2x} - 1}{x} = -2 \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = -2.$$

f) Utilizziamo lo sviluppo  $e^t = 1 + t + o(t)$  per  $t \rightarrow 0$ :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{x^2}}{x^3 + \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1 + x^2 + o(x^2))}{\sqrt{x} + o(\sqrt{x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2 + o(x^2)}{\sqrt{x} + o(\sqrt{x})} = 0.$$



g) Ricordando che  $a^x = 1 + x \log a + o(x)$  per  $x \rightarrow 0$ , si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\pi^x - 3^x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x \log \pi - 1 - x \log 3 + o(x)}{x} = \log \pi - \log 3 = \log \frac{\pi}{3}.$$

h) Si ha  $\sqrt{1+t} = 1 + \frac{t}{2} + o(t)$  per  $t \rightarrow 0$ , da cui

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+4x} - 1}{5^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + o(x)}{x \log 5 + o(x)} = \frac{2}{\log 5}.$$

i) Posto  $2^x - 1 = t$  è facile vedere che  $t \rightarrow 0^\pm$  quando  $x \rightarrow 0^\pm$ , dunque

$$\lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{\sin(2^x - 1)}{(2^x - 1)^2} = \lim_{t \rightarrow 0^\pm} \frac{\sin t}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0^\pm} \left( \frac{\sin t}{t} \right) \frac{1}{t} = \pm \infty.$$

l) Notiamo che  $\sqrt{x^4 + x^3} = x^{3/2} \sqrt{1+x} = x^{3/2} + o(x^{3/2})$  per  $x \rightarrow 0$ , dunque

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2x^3} - x^6}{4x^6 - \sqrt{x^4 + x^3}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2} x^{3/2} + o(x^{3/2})}{-x^{3/2} + o(x^{3/2})} = -\sqrt{2}.$$

m) Si ha

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^{2x} + 2^{-x}}{(2^x - 1)^2} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^{2x} (1 + 2^{-3x})}{2^{2x} (1 - 2^{-x})} = 1, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2^{2x} + 2^{-x}}{(2^x - 1)^2} &= \frac{+\infty}{1} = +\infty. \end{aligned}$$

n) Ricordiamo che per  $x \rightarrow +\infty$  la funzione  $a^x$  con  $a > 1$  è un infinito di ordine superiore a  $x^\alpha$ , qualunque sia  $\alpha > 0$ . Si ha allora

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 (2^x - 2^{-x})}{3^x + 3^{-x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 2^x}{3^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{\left(\frac{3}{2}\right)^x} = 0.$$

Analogamente per  $x \rightarrow -\infty$  si ha

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 (2^x - 2^{-x})}{3^x + 3^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^3 2^{-x}}{3^{-x}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^3}{\left(\frac{3}{2}\right)^t} = 0.$$

o) Per  $x \rightarrow +\infty$  la funzione  $(\log x)^\alpha$  è un infinito di ordine inferiore a  $x^\beta \forall \alpha, \beta > 0$ , quindi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \log^3 x + x \log^7 x}{1 + x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \log^3 x}{x^3} \frac{1 + \frac{\log^4 x}{x}}{1 + \frac{1}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log^3 x}{x} = 0.$$

p) Ricordando che  $\lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha |\log x|^\beta = 0 \quad \forall \alpha, \beta > 0$ , si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \log^5 x + \sqrt[4]{x} \log x}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \sqrt{x} \log^5 x + \frac{\log x}{x^{1/4}} \right) = 0 + (-\infty) \cdot (+\infty) = -\infty.$$

q) Ricordiamo che  $f(x)^{g(x)} \equiv e^{g(x) \log f(x)}$ , quindi

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left( x^x + x^{-\frac{1}{x}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( e^{x \log x} + e^{-\frac{1}{x} \log x} \right) = e^0 + e^{+\infty} = 1 + \infty = +\infty.$$

r) Si ha  $\cos \frac{1}{x} = 1 - \frac{1}{2x^2} + o(\frac{1}{x^2})$  per  $x \rightarrow +\infty$ , e  $\log(1+t) = t + o(t)$  per  $t \rightarrow 0$ , dunque

$$\left( \cos \frac{1}{x} \right)^{x^2} = e^{x^2 \log \cos \frac{1}{x}} = e^{x^2 \log(1 - \frac{1}{2x^2} + o(\frac{1}{x^2}))} = e^{x^2(-\frac{1}{2x^2} + o(\frac{1}{x^2}))} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} e^{-1/2}.$$

s)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1+x})^{\frac{1}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\log \sqrt{1+x}}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{2} \frac{\log(1+x)}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{x+o(x)}{2x+o(x)}} = e^{1/2}.$$

t)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - \sqrt{1-x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + 3x + o(x) - (1 - \frac{1}{2}x + o(x))}{x + o(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{7}{2}x + o(x)}{x + o(x)} = \frac{7}{2}.$$

u) Essendo  $3^x = 1 + x \log 3 + o(x)$  per  $x \rightarrow 0$  e  $\sin t = t + o(t)$  per  $t \rightarrow 0$ , si ha

$$\sin(\pi 3^x) = \sin(\pi + \pi x \log 3 + o(x)) = -\sin(\pi x \log 3 + o(x)) = -\pi x \log 3 + o(x),$$

e quindi

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi 3^x)}{x} = -\pi \log 3.$$

v)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \left( e + \frac{2}{x} \right)^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 1 + \frac{2}{ex} \right)^x = e^{2/e}.$$

x) Essendo  $\operatorname{tg}^3 x = (x + o(x))^3 = x^3 + o(x^3)$  per  $x \rightarrow 0$ , abbiamo

$$\frac{e^{\operatorname{tg}^3 x} - 1}{x(\cos x - e^{x^2})} = \frac{e^{x^3 + o(x^3)} - 1}{x(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) - (1 + x^2 + o(x^2)))} = \frac{x^3 + o(x^3)}{-\frac{3}{2}x^3 + o(x^3)} \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\frac{2}{3}.$$

y) Notiamo che  $\log(e+x) - 1 = \log(1 + \frac{x}{e})$ , da cui

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(e+x) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 + \frac{x}{e})}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{e} + o(x)}{x} = \frac{1}{e}.$$

w) Usiamo gli sviluppi  $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$  per  $x \rightarrow 0$  e  $\sin t = t + o(t)$  per  $t \rightarrow 0$ , e l'identità  $\sin(\pi - t) = \sin t$ :

$$\frac{\sin(\pi \cos x)}{x \sin x} = \frac{\sin\left(\pi - \pi \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)}{x(x + o(x))} = \frac{\sin\left(\pi \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)}{x^2 + o(x^2)} = \frac{\pi \frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2 + o(x^2)} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{\pi}{2}.$$

z) Essendo

$$\sqrt{4+x} - 1 = 2\sqrt{1 + \frac{x}{4}} - 1 = 2\left(1 + \frac{x}{8} + o(x)\right) - 1 = 1 + \frac{x}{4} + o(x),$$

si ha

$$(\sqrt{4+x} - 1)^{\frac{1}{e^x - 1}} = e^{\frac{\log(\sqrt{4+x} - 1)}{e^x - 1}} = e^{\frac{\log\left(1 + \frac{x}{4} + o(x)\right)}{x + o(x)}} = e^{\frac{\frac{x}{4} + o(x)}{x + o(x)}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} e^{1/4}.$$

5. Si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+7} - \sqrt{7}}{\sqrt{x+5} - \sqrt{5}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cancel{x}(\sqrt{x+5} + \sqrt{5})}{\cancel{x}(\sqrt{x+7} + \sqrt{7})} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{7}},$$

quindi  $g(x) \sim \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{7}}f(x)$  ( $x \rightarrow 0$ ).

6. Si ha

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{2})^2}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)^2}{(\sqrt{x} + \sqrt{2})^2 (x - 2)} = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{\sqrt[3]{\frac{1}{x} - \frac{1}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{\left(\frac{2-x}{2x}\right)^{1/3}} = - \lim_{x \rightarrow 2} (x - 2)^{2/3} (2x)^{1/3} = 0.$$

Quindi  $(\sqrt{x} - \sqrt{2})^2$  è un infinitesimo di ordine superiore a  $x - 2$ , e  $x - 2$  è un infinitesimo di ordine superiore a per  $\sqrt[3]{\frac{1}{x} - \frac{1}{2}}$  per  $x \rightarrow 2$ . Possiamo anche calcolare l'ordine di infinitesimo  $\alpha$  e la parte principale  $k(x - 2)^\alpha$  per  $x \rightarrow 2$  rispetto a  $x - 2$  (l'infinitesimo campione di ordine 1). Infatti si ha

$$\sqrt[3]{\frac{1}{x} - \frac{1}{2}} = \left(\frac{2-x}{2x}\right)^{\frac{1}{3}} \sim -\frac{(x-2)^{\frac{1}{3}}}{\sqrt[3]{4}} \quad (x \rightarrow 2),$$

$$(\sqrt{x} - \sqrt{2})^2 = \left(\frac{x-2}{\sqrt{x} + \sqrt{2}}\right)^2 \sim \frac{(x-2)^2}{8} \quad (x \rightarrow 2),$$

e quindi  $\sqrt[3]{\frac{1}{x} - \frac{1}{2}}$  ha ordine  $\frac{1}{3}$  e parte principale  $-\frac{(x-2)^{\frac{1}{3}}}{\sqrt[3]{4}}$ , e  $(\sqrt{x} - \sqrt{2})^2$  ha ordine 2 e parte principale  $\frac{(x-2)^2}{8}$ .

7. a) Ricordando che  $e^t - 1 \sim t$  ( $t \rightarrow 0$ ) abbiamo

$$e^{3x^4} - 1 \sim 3x^4 \quad (x \rightarrow 0),$$

quindi  $\alpha = 4$ ,  $k = 3$ .

b) Si ha

$$\begin{aligned} e^{\sqrt{x^2+1}} - e &= e^{1+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)} - e = e \left( e^{\frac{1}{2}x^2+o(x^2)} - 1 \right) \\ &= e \left( \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \right) \sim \frac{e}{2}x^2 \quad (x \rightarrow 0). \end{aligned}$$

c)

$$\frac{1 - \cos x}{\sqrt{x} + x^2} = \frac{\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}{\sqrt{x} + o(\sqrt{x})} \sim \frac{1}{2}x^{3/2} \quad (x \rightarrow 0).$$

d) Essendo  $\log(1+t) = t + o(t) \sim t$  ( $t \rightarrow 0$ ), si ha

$$\log(\cos x) = \log \left( 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \right) = -\frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \sim -\frac{1}{2}x^2 \quad (x \rightarrow 0).$$

e) Notiamo che  $\sqrt[3]{x+x^2} \sim \sqrt[3]{x}$  ( $x \rightarrow 0$ ), ma questo non ci permette di concludere che  $\sqrt[3]{x+x^2} - \sqrt[3]{x} + x^2$  è equivalente a  $x^2$  per  $x \rightarrow 0$ . Infatti ricordando che  $(1+x)^\alpha - 1 = \alpha x + o(x) \sim \alpha x$  ( $x \rightarrow 0$ ), si ha

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{x+x^2} - \sqrt[3]{x} + x^2 &= \sqrt[3]{x} \left( (1+x)^{1/3} - 1 \right) + x^2 = \sqrt[3]{x} \left( \frac{1}{3}x + o(x) \right) + x^2 \\ &= \frac{1}{3}x^{4/3} + o(x^{4/3}) \sim \frac{1}{3}x^{4/3} \quad (x \rightarrow 0). \end{aligned}$$

f) Per  $x \rightarrow 0$  si ha

$$\begin{aligned} e^{e^x} - e^{\cos x} &= e^{1+x+o(x)} - e^{1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)} = e \left( e^{x+o(x)} - e^{-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)} \right) \\ &= e \left( x + o(x) + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \right) = ex + o(x) \sim ex. \end{aligned}$$

g)

$$\log(x+3) - \log 3 = \log \frac{x+3}{3} = \log \left( 1 + \frac{x}{3} \right) \sim \frac{x}{3} \quad (x \rightarrow 0).$$

h) Essendo  $\sin(2x^2) \sim 2x^2$  e  $\sqrt{1+3x} - 1 \sim \frac{3}{2}x$  ( $x \rightarrow 0$ ), si ha

$$\sin(2x^2) (\sqrt{1+3x} - 1) \sim 3x^3 \quad (x \rightarrow 0).$$

i) Essendo  $1 - \cos t \sim \frac{1}{2}t^2$  ( $t \rightarrow 0$ ), si ha

$$\sqrt{1 - \cos(x^2)} = (1 - \cos(x^2))^{1/2} \sim \left( \frac{1}{2}x^4 \right)^{1/2} = \frac{1}{\sqrt{2}}x^2 \quad (x \rightarrow 0).$$

l) Per  $x \rightarrow 0$  si ha

$$\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x} = 1 + \frac{1}{2}x + o(x) - \left( 1 - \frac{1}{2}x + o(x) \right) = x + o(x) \sim x.$$

m) Per  $x \rightarrow 0$  si ha  $\sin x = x + o(x)$  e quindi

$$\frac{\sin x + 2\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x} + \sqrt[5]{x}} = \frac{2x^{1/3} + o(x^{1/3})}{x^{1/5} + o(x^{1/5})} \sim \frac{2x^{1/3}}{x^{1/5}} = 2x^{2/15}.$$

n) La funzione  $\sin(2x^3) \sim 2x^3$  ( $x \rightarrow 0$ ) è un infinitesimo di ordine 3, mentre  $1 - e^{-x^2} \sim x^2$  ( $x \rightarrow 0$ ) ha ordine 2, quindi

$$x^2 + \sin(2x^3) + 1 - e^{-x^2} = 2x^2 + o(x^2) \sim 2x^2 \quad (x \rightarrow 0).$$

o) Utilizzando l'identità  $\sin(\pi + t) = -\sin t$  abbiamo per  $x \rightarrow 0$

$$\sin(\pi\sqrt{1+x}) \sin\left(\pi + \pi\frac{x}{2} + o(x)\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2}x + o(x)\right) \sim \frac{\pi}{2}x.$$

p) Ricordiamo che  $\frac{1}{1+t} = 1 - t + o(t)$  ( $t \rightarrow 0$ ), quindi si ha

$$\begin{aligned} (1 + \sin x) \frac{1}{1-x} - 1 &= (1 + x + o(x))(1 + x + o(x)) \\ &= 2x + o(x) \sim 2x \quad (x \rightarrow 0). \end{aligned}$$

Possiamo anche procedere facendo prima il denominatore comune:

$$\frac{1 + \sin x}{1-x} - 1 = \frac{\sin x + x}{1-x} = \frac{2x + o(x)}{1 + o(1)} \sim 2x \quad (x \rightarrow 0).$$

q)

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{1+3x^2}}{1+2x} - 1 &= \frac{\sqrt{1+3x^2} - 1 - 2x}{1+2x} = \frac{\frac{3}{2}x^2 + o(x^2) - 2x}{1+2x} \\ &= \frac{-2x + o(x)}{1 + o(1)} \sim -2x \quad (x \rightarrow 0). \end{aligned}$$

r) Notiamo che

$$\begin{aligned} \sqrt{9+x} - 2 &= 3\sqrt{1 + \frac{x}{9}} - 2 = 3\left(1 + \frac{x}{18} + o(x)\right) - 2 \\ &= 1 + \frac{x}{6} + o(x) \quad (x \rightarrow 0), \end{aligned}$$

e quindi per  $x \rightarrow 0$

$$\log(\sqrt{9+x} - 2) = \log\left(1 + \frac{x}{6} + o(x)\right) = \frac{x}{6} + o(x) \sim \frac{x}{6}.$$

8. a) Si ha

$$\frac{2x^2 + \sqrt[3]{x}}{x^3} = \frac{2}{x} + \frac{1}{x^{8/3}} = \frac{2}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \sim \frac{2}{x} \quad (x \rightarrow +\infty),$$

essendo  $\frac{1}{x^{8/3}}$  un infinitesimo di ordine superiore a  $\frac{1}{x}$  per  $x \rightarrow +\infty$ .

b) Essendo  $\operatorname{arctg} t \sim t$  ( $t \rightarrow 0$ ), si ha

$$\operatorname{arctg} \frac{3}{x^2} \sim \frac{3}{x^2} \quad (x \rightarrow +\infty).$$

c) Notiamo che  $\sqrt{x+1} \sim \sqrt{x}$  ( $x \rightarrow +\infty$ ), ma ciò non ci consente di dire che la funzione  $\sqrt{x+1} - \sqrt{x} + \frac{1}{x}$  è equivalente a  $\frac{1}{x}$  per  $x \rightarrow +\infty$ . Infatti per  $x \rightarrow +\infty$  si ha

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{1}{x}}\right)} \sim \frac{1}{2\sqrt{x}},$$

e quindi essendo  $\frac{1}{x} = o\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$  per  $x \rightarrow +\infty$ , si ha

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} + \frac{1}{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) \sim \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

d) Essendo  $\sqrt{1+t} - 1 \sim \frac{1}{2}t$  ( $t \rightarrow 0$ ), sarà

$$\sqrt{\frac{x-3}{x}} - 1 = \sqrt{1 - \frac{3}{x}} - 1 \sim -\frac{3}{2x} \quad (x \rightarrow +\infty).$$

e) Essendo  $e^t - 1 \sim t$  ( $t \rightarrow 0$ ), si ha

$$e^{\frac{x+1}{x}} - e = e^{1+\frac{1}{x}} - e = e \left(e^{\frac{1}{x}} - 1\right) \sim \frac{e}{x} \quad (x \rightarrow +\infty).$$

f) Si ha  $\log(1+t) \sim t$  ( $t \rightarrow 0$ ), quindi

$$\log\left(\frac{x+3}{x+1}\right) = \log\left(1 + \frac{2}{x+1}\right) \sim \frac{2}{x+1} \sim \frac{2}{x} \quad (x \rightarrow +\infty).$$

9. a) Posto  $x - 2 = t$ , quando  $x$  tende a 2,  $t$  tende a 0, e quindi

$$\log x - \log 2 = \log \frac{2+t}{2} = \log\left(1 + \frac{t}{2}\right) \sim \frac{t}{2} = \frac{1}{2}(x-2) \quad (x \rightarrow 2).$$

b) Posto  $x - 1 = t$  si ha

$$e^x - e = e(e^{x-1} - 1) = e(e^t - 1) \sim et = e(x-1) \quad (x \rightarrow 1).$$

c) Posto  $x - \pi/2 = t$  si ha

$$1 - \sin x = 1 - \sin\left(\frac{\pi}{2} + t\right) = 1 - \cos t \sim \frac{1}{2}t^2 = \frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 \quad (x \rightarrow \pi/2).$$

d) Poniamo  $x - \sqrt{\pi} = t$ . Ricordando che  $1 - \cos z \sim \frac{1}{2}z^2$  ( $z \rightarrow 0$ ), si ha per  $x \rightarrow \sqrt{\pi}$

$$\begin{aligned} 1 + \cos(x^2) &= 1 + \cos(\sqrt{\pi} + t)^2 = 1 + \cos(\pi + 2\sqrt{\pi}t + t^2) \\ &= 1 - \cos(2\sqrt{\pi}t + t^2) \sim \frac{1}{2}(2\sqrt{\pi}t)^2 = 2\pi(x - \sqrt{\pi})^2. \end{aligned}$$

10. a) Per  $x \rightarrow +\infty$  si ha

$$\frac{x^{3/2} + 5x^2}{1 + \sqrt{x} + \sqrt[4]{x}} = \frac{5x^2 + o(x^2)}{x^{1/2} + o(x^{1/2})} \sim \frac{5x^2}{x^{1/2}} = 5x^{3/2}.$$

b) Notiamo che per  $x \rightarrow +\infty$  si ha

$$\sqrt{x^4 + x^3} - x^2 = x^2 \left( \sqrt{1 + \frac{1}{x}} - 1 \right) = x^2 \left( \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right) = \frac{x}{2} + o(x),$$

e quindi essendo  $\sqrt{x} = o(x)$  ( $x \rightarrow +\infty$ ), sarà

$$\sqrt{x^4 + x^3} - x^2 + \sqrt{x} = \frac{x}{2} + o(x) + \sqrt{x} = \frac{x}{2} + o(x) \sim \frac{x}{2} \quad (x \rightarrow +\infty).$$

11. a) Si ha

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x+2}{2x+3} & \text{se } x \geq 2 \\ \frac{2x^2-x-2}{2x+3} & \text{se } x < 2, \end{cases}$$

dunque  $\text{dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{3}{2}\}$ . Essendo

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}^{\pm}} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}^{\pm}} \frac{2x^2 - x - 2}{2x + 3} = \frac{4}{0^{\pm}} = \pm\infty,$$

la retta  $x = -\frac{3}{2}$  è asintoto verticale per  $f$ . Essendo  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1/2$ , la retta  $y = \frac{1}{2}$  è asintoto orizzontale destro per  $f$ . Infine si verifica facilmente che

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - x) = -2,$$

e quindi la retta  $y = x - 2$  è asintoto obliquo sinistro per  $f$ .

b) Si ha  $\text{dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ . I limiti laterali per  $x \rightarrow 0^{\pm}$  sono

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x e^{1+\frac{1}{x}} = e \lim_{x \rightarrow 0^+} x e^{\frac{1}{x}} = e \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^t}{t} = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -e \lim_{x \rightarrow 0^-} x e^{\frac{1}{x}} = (-e) \cdot 0 \cdot e^{-\infty} = 0,$$

quindi la retta  $x = 0$  è asintoto verticale (da destra) per  $f$ . Si ha poi

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} |x|e^{1+\frac{1}{x}} = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{1+\frac{1}{x}} = e,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ex) = \lim_{x \rightarrow +\infty} ex \left( e^{\frac{1}{x}} - 1 \right) = e \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^t - 1}{t} = e,$$

e la retta  $y = ex + e$  è asintoto obliquo destro per  $f$ . In modo analogo si verifica che la retta  $y = -ex - e$  è asintoto obliquo sinistro per  $f$ .

12. Notando che

$$\log(e^x + x) = \log[e^x(1 + \frac{x}{e^x})] = x + \log(1 + \frac{x}{e^x}),$$

si verifica facilmente che la retta  $y = x$  è asintoto obliquo destro per  $f$ . Non ha senso cercare l'asintoto per  $x \rightarrow -\infty$  in quanto la funzione è definita su  $(x_0, +\infty)$ , per un certo  $x_0 < 0$ .

13. In ordine crescente di infinito per  $x \rightarrow +\infty$  si ha

$$x \log^{10} x, \frac{x^2}{\log^{100} x}, x^2, 2^x, 2^x \log x, 2^x x^2, x^x, 2^{5^x}.$$

Per verificare che  $2^{5^x}$  è infinito di ordine superiore a  $x^x$  osserviamo che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^{5^x}}{x^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{5^x \log 2}}{e^{x \log x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{5^x \log 2 - x \log x} = e^{+\infty} = +\infty.$$