

FICHE DE TRAVAIL – TRAITEMENTS & EFFETS

1. ANTALGIQUES (Douleur)

❖ Paracétamol

- **Indication** : Douleur légère à modérée, fièvre
- **Mécanisme** : Action centrale antalgique et antipyrétique
- **Effets secondaires possibles** :
 - Toxicité hépatique en surdosage
- **Surveillance** : Dose maximale 3 à 4 g/jour adulte selon recommandations

❖ AINS (Ibuprofène, Kétoprofène)

- **Indication** : Douleur inflammatoire, fièvre
- **Mécanisme** : Inhibition des prostaglandines (anti-inflammatoire)
- **Effets secondaires** :
 - Risque gastrique (ulcère, saignement)
 - Insuffisance rénale fonctionnelle
- **Contre-indications majeures** : Ulcère actif, insuffisance rénale sévère

❖ Morphiniques (Morphine)

- **Indication** : Douleur intense
- **Mécanisme** : Agoniste opioïde
- **Effets secondaires** :
 - Dépression respiratoire
 - Constipation
 - Somnolence
- **Surveillance** : FR, conscience, SpO₂

2. CARDIOVASCULAIRES

❖ Trinitrine

- **Indication :** Douleur angineuse
- **Effet :** Vasodilatation coronarienne
- **Effets secondaires :**
 - Hypotension
 - Céphalées
- **Surveillance :** Tension artérielle

❖ Bêtabloquants (ex : Métoprolol)

- **Indication :** HTA, tachycardie
- **Effet :** Diminue fréquence cardiaque
- **Effets secondaires :**
 - Bradycardie
 - Fatigue

❖ Anticoagulants (Héparine)

- **Indication :** Prévention thrombose
- **Effet :** Inhibition coagulation
- **Effets secondaires :**
 - Risque hémorragique
- **Surveillance :** Signes de saignement

3. RESPIRATOIRES

❖ Salbutamol

- **Indication :** Asthme, bronchospasme
- **Effet :** Bronchodilatation
- **Effets secondaires :**
 - Tremblements
 - Tachycardie

❖ Corticoïdes (Prednisone)

- **Indication :** Inflammation sévère, asthme
- **Effets secondaires :**

- Hyperglycémie
- Immunosuppression

4. NEUROLOGIE / URGENCE

❖ Benzodiazépines (Diazépam)

- **Indication :** Convulsions, anxiété aiguë
- **Effet :** Sédation
- **Effets secondaires :**
 - Dépression respiratoire
 - Somnolence

❖ Adrénaline

- **Indication :** Choc anaphylactique, ACR
- **Effet :** Vasoconstriction + stimulation cardiaque
- **Effets secondaires :**
 - Tachycardie
 - HTA transitoire

5. ANTIBIOTIQUES (GÉNÉRALITÉS)

❖ Amoxicilline

- **Indication :** Infection bactérienne sensible
- **Effets secondaires :**
 - Allergie
 - Troubles digestifs

MÉDICAMENTS COURANTS À CONNAÎTRE

Antalgiques / antalgiques opioïdes

- **Paracétamol** : Doliprane®, Efferalgan®, Dafalgan®
- **Ibuprofène** : Advil®, Nurofen®
- **Kétoprofène** : Profénid®
- **Morphine** : Skenan®, Actiskenan®
- **Tramadol** : Topalgic®, Contramal®

Cardiovasculaires

- **Trinitrine** : Natispray®
- **Métoprolol** : Lopressor®
- **Bisoprolol** : Cardensiel®
- **Ramipril** : Triatec®
- **Énoxaparine** : Lovenox®

Respiratoires

- **Salbutamol** : Ventoline®
- **Terbutaline** : Bricanyl®
- **Prednisone** : Cortancyl®
- **Méthylprednisolone** : Solumédrol®

Neurologie / urgences / antidotes

- **Diazépam** : Valium®
- **Midazolam** : Hypnovel®
- **Adrénaline** : Anapen®, Epipen®
- **Naloxone** : Nalscue®,
- Toujours vérifier allergies.
- Toujours contrôler constantes après administration d'un traitement d'urgence.
- Respect strict des doses.
- Surveiller conscience + respiration si traitement sédatif ou opioïde.
- Noter heure d'administration.

