

川红花

(中药材)

别名：红花、草红花、刺红花
学名：Carthamus tinctorius L.
科属：菊科 (Asteraceae)
红花属 (Carthamus)

药用部位：干燥花冠
采收期：夏季花由黄变红时采收

生态习性
一年生或二年生草本，高50~150cm。
喜温暖、阳光充足、干燥环境，耐旱、怕涝。
生于平原、山坡、荒地、田野、路旁等。

特征概述
① 茎直立，上部分枝，白色或淡黄色，有纵棱。
② 叶片无柄，披针形或椭圆形，边缘有羽状齿刺，尖锐硬刺。
③ 头状花序顶生，花初开为黄色，盛开时变红色或橙红色。
④ 果实为瘦果，倒卵形，具纵棱。

药用价值
味辛，性温。
归心、肝经。
活血通经，祛瘀止痛，消肿散结。

主要分布
全国大部分地区均有栽培，主产于新疆、甘肃、河南、山东、江苏等地。



1. 生境与分布



生于山坡、田野、荒地、路旁等阳光充足处。喜温暖干燥气候，耐旱性强。



2. 植株全貌 (花期)



3. 叶片特写 (羽状齿刺叶)



- 叶片披针形或椭圆形，无柄。
- 边缘具羽状齿刺，尖锐硬刺。
- 表面绿色，有光泽。

4. 花序特写 (头状花序)



- 头状花序单生，顶生，直径3~4cm。
- 总苞多层，卵状披针形，边缘有刺。
- 花托平坦，密生管状花。

5. 花的特写 (渐变过程)



- 花初开时黄色，逐渐变为橙色，盛开时红色。
- 花冠管状，5裂，花柱伸出。

6. 果实与种子



- 果实为瘦果，倒卵形，有纵棱。
- 成熟时褐色，内含种子一粒。
- 种子黄白色，扁平。

7. 药材加工过程 (花)




① 采收 (黄变红时) ② 摊晒 ③ 切干 ④ 烘干 ⑤ 筛选 ⑥ 成品

药材性状 (饮片)



为干燥的管状花，橙红色或红色，质轻而松脆，气微，味微苦。


8. 显微特征 (花粉及花冠)



花粉粒 花柱表面 花冠表皮 腺毛

- 花粉呈球形，表面具刺状突起。
- 花冠表皮细胞呈长方形，排列紧密。
- 可见腺毛，顶端多细胞。

9. 主要成分



红花黄色素 A 红花黄色素 B 红花苷

- 主要成分为红花黄色素类化合物。
- 具有活血化淤、抗氧化等作用。

10. 主要产地



主产地：新疆、甘肃、河南、山东、江苏、安徽、湖北、四川等地。

11. 性状鉴别要点



- 花冠筒细长，先端5裂。
- 柱头分叉，伸出花冠外。
- 色橙红或红色，质轻松脆。

12. 易混品鉴别

藏红花 (本品)	野红花
花冠细长，先端5裂，柱头分叉显著，颜色暗红。	花冠短胖，柱头不明显，颜色暗红或紫暗红。

《神农本草经》原文摘要

红花，味辛，温。主心腹邪气，忧恚怒，益气，通九窍，破坚，散瘀血。



来源

本品为菊科植物红花 Carthamus tinctorius L. 的干燥花。



性味归经

味辛，性温。
归心、肝经。



功效

活血通经，祛瘀止痛，消肿散结。



主治

血瘀经闭，痛经，产后瘀阻腹痛，跌打损伤，瘀血肿痛。



用法用量

煎服：3~9g。
外用：适量，研末调敷或浸酒敷患处。



川红花

- 全景构图与株型 (Overall Habit) ——【核心绘图抓手：直立草本与羽状齿刺叶】：一年生或二年生直立草本，高约 50~150 厘米。茎直立，上部分枝，呈白色或淡黄色。最核心的视觉抓手是它的叶片：叶片无柄，呈披针形或椭圆形，边缘有尖锐的羽状齿刺（针刺），显得极为硬朗和锋利。
- 花序特写 (Flower Morphology) ——【核心抓手：头状花序与渐变管状花】：茎顶端生有大型的头状花序，直径可达 3~4 厘米。花序外围包裹着多层卵状披针形

的绿色苞片，苞片边缘同样带有锋利的齿刺。花序中央密生着管状花，在开放过程中会经历奇妙的颜色渐变——初开时为黄色，盛开时变为红色或橙红色。

- **生态环境背景（Ecological Background）：** 背景可设置为阳光充沛、温暖干燥的农田、山坡或平原绿野。在夏日晴空下，红花那带有锋利硬刺的翠绿植株上，绽放出一团团如火般燃烧的橙红色花头，展现出极其顽强且富有张力的生命律动。

识别维度	川红花 (草红花)	藏红花 (番红花)
植株高度	50~150 厘米（高大）	10~20 厘米（矮小）
地上茎	有明显粗壮、分枝的茎干	无地上茎，叶花直接自地面长出
地下根茎	普通直根	扁球形的“大蒜状”球茎
叶片形态	宽大，硬革质， 边缘有尖锐刺	极狭长如韭菜，柔软， 边缘无刺
花朵外观	绿刺苞片包裹的 橙红色管状头状花序	优雅、柔嫩的 六瓣紫色花朵
药用部分在活体上的位置	顶端头状花序上的整朵管状花	紫色花朵中央垂下的 3 根深红色柱头

- **叶片与花部特写 (Leaf & Flower Morphology) ——【核心抓手：三出复叶与亮黄花朵】：** 叶片为典型的羽状三出复叶。托叶很大，呈披针形；小叶片多为卵形或长圆状卵形，全缘或微有三裂，叶面呈现健康的深绿色。花序为腋生的总状花序，花朵小巧而精致，花冠呈现极其明亮的【鲜黄色或亮黄色】。龙骨瓣（花瓣的一种）呈螺旋状卷曲，在绿叶衬托下犹如一只只金色的小蝴蝶。
- **生态环境背景 (Ecological Background)：** 背景应设置为阳光充足的华北或华中农田、田埂两旁、或是乡村的菜园边缘。

- **叶片特写与纹理（Leaf Morphology）——【核心抓手：羽状深裂与白绒毛】：** 叶片互生，具有强烈的几何艺术感。中下部叶片较大，呈卵状椭圆形，呈羽状深裂（通常 5~7 裂，裂片呈椭圆状披针形，边缘有不规则的粗锯齿）。叶片正面为饱满的翠绿色或深绿色，有稀疏的柔毛；**最惊艳的视觉抓手是叶片背面：密被一层极厚、极细腻的灰白色或银白色的蛛丝状绒毛，迎光看去，宛如覆盖了一层白霜。**
- **花序与花部细节（Macro Floral Details）：** 夏秋季开花，顶生宏大而密集的**穗状圆锥花序**。花头（头状花序）极小，直径仅 2.5~3 毫米，呈椭圆形，无柄，密集成密穗状。花冠为极其低调的淡黄色、黄褐色或微带紫色，无数小花序在枝头排布，充满乡野自然的气息。
- **生态环境背景（Ecological Background）：** 背景应设置为阳光充足的荒地、路旁、田野边缘、或是低山坡的灌木丛旁。端午时节的清晨，阳光穿透薄雾照在带有晶莹露珠的艾叶上，展现出其顽强的生命力。

药名	标志性视觉抓手	标志性物理触觉与气味	临床核心神技 (一句话概括)
艾叶	叶片羽状大裂，叶背密布银白厚绒毛	质地如软布；带浓烈提神的特异温和辛香	暖宫散寒，温经止血（妇科圣药、艾灸主角）
茵陈	叶片裂成极细的丝线（绵茵陈幼苗）	质地卷曲如绵絮团；气味微香、味微苦	清热利湿，专退黄疸（肝胆湿热核心药）
青蒿	叶片呈精细的蕨类状深裂，通体光滑无毛	质地干枯发脆；带有强烈的特异解暑恶香	清透虚热，凉血截疟（专治疟疾与骨蒸潮热）

没药

(中药材)

别名: 没药树、末药

学名: *Commiphora myrrha* (Nees) Engl.

科属: 橄榄科 (Burseraceae)

没药属 (*Commiphora*)

药用部位: 干燥树脂

采收期: 全年可采, 以干燥季节为佳

生态习性

落叶灌木或小乔木, 高3~4米。

喜高温干旱、阳光充足的环境, 耐极度干旱, 适应性强。

生于非洲东部、阿拉伯半岛等地的荒漠、岩石山坡及干旱灌丛中。

特征概述

① 树干粗壮, 树皮灰色或黄褐色, 薄片状剥落。

② 枝条多刺, 尖端常退化为尖锐硬刺。

③ 叶多为单叶或三出复叶, 倒卵形, 边缘波状钝锯齿。

④ 花朵细小, 簇生于叶腋, 黄绿色, 花瓣4片。

⑤ 树干或枝条受伤后渗出乳白色或淡黄色油胶树脂, 干燥后呈黄褐色透明或半透明的块状。

药用价值

味苦, 性平。

归心、肝、脾经。

活血止痛, 消肿生肌。

用于跌打损伤, 内服、痛经, 瘀血肿痛, 痈肿疮毒。

主要分布

主要分布于非洲东北部(索马里、埃塞俄比亚等地)及阿拉伯半岛的干旱地区。

1. 生境与分布

生于极度干旱的岩石山坡、荒漠地带, 耐高温干旱, 阳光强烈。

2. 植株全貌 (开花期)

3. 叶片特写 (单叶与三出复叶)

- 单叶倒卵形, 边缘波状钝锯齿。
- 三出复叶, 小叶倒卵形或倒卵状椭圆形。
- 叶表面绿色, 略带光泽; 叶背淡绿色。

4. 花序特写 (花簇)

- 花序簇生于叶腋处。
- 花根小, 花瓣4片, 黄绿色。
- 雄蕊4枚, 花丝短, 花药黄色。

5. 花部特写 (单花)

- 花瓣4片, 卵圆形。
- 花盘环状, 中央具花柱。
- 花香淡雅。

6. 枝条与刺特写

- 枝条多刺, 硬刺尖锐。
- 刺由枝条顶端退化而成。
- 刺长约1~3厘米, 坚硬锐利。

7. 树干渗出树脂 (油胶) 及加工过程

① 人工割伤树皮 ② 树脂缓慢渗出 ③ 树脂凝固 ④ 采集树脂块 ⑤ 初步筛选 ⑥ 成品

药材性状 (饮片)

呈不规则块状或颗粒状, 大小不一。表面黄褐色或淡棕色, 半透明, 有光泽, 质脆而韧, 气香, 味苦。

8. 显微特征 (树脂粉末)

油滴 树脂块 石细胞 导管

- 树脂中含油滴、树脂块、石细胞等。
- 油滴圆形或椭圆形, 散在或聚集。
- 石细胞多角形或类圆形, 壁厚。

9. 主要成分

倍半萜类 挥发油 树脂酸类

- 主要成分为倍半萜类、挥发油、树脂酸等。
- 具有抗炎、镇痛、抗菌等作用。

10. 主要产地

主产地: 索马里、埃塞俄比亚、肯尼亚、阿曼、也门等干旱地区。

11. 性状鉴别要点

- 表面黄褐色或淡棕色, 半透明。
- 质脆而韧, 断面玻璃样光泽。
- 气芳香, 味苦, 嚼之粘牙。

12. 易混品鉴别

乳香	安息香
乳香呈豆状, 乳白色。	安息香呈块状, 棕褐色。
质坚硬, 断面白色。	气香浓烈, 味微苦。

《神农本草经》原文摘要

没药, 味苦, 平。主心腹邪气, 风痹, 寒热, 破积聚, 除痼癖, 止痛。久服轻身, 不老。

来源

本品为橄榄科植物没药 *Commiphora myrrha* (Nees) Engl. 的干燥树脂。

性味归经

味苦, 性平。归心、肝、脾经。

功效

活血止痛, 消肿生肌。

主治

跌打损伤, 痛经, 瘀血肿痛, 痈肿疮毒。

用法用量

煎服: 3~10g。
外用: 适量, 研末调敷或入膏药中。

没药

- 全景构图与株型 (Overall Habit) ——【核心绘图抓手: 多刺小乔木与树干渗出的油胶】: 低矮的落叶灌木或小乔木, 高约 3~4 米。树干粗壮, 树皮呈灰色或黄褐色, 常成薄片状剥落。最震撼、最具故事感的视觉抓手是它的树干: 在粗壮树干或树枝上, 有天然裂口或人工割伤的痕迹, 从这些伤口中正缓缓渗出黏稠的乳白色或淡黄色的油胶树脂, 它们在空气中渐渐凝固, 挂在树皮上, 宛如一滴滴凝固的琥珀或泪珠。此外, 它的枝条尖端常退化成尖锐的硬刺。

- 叶片与花部特写（Leaf & Flower Morphology）——【核心抓手：倒卵形单叶/三出复叶与细小黄花】：叶片多为单叶，或由3片小叶组成的三出复叶，倒卵形，边缘有波状钝锯齿。花朵非常细小，成簇生于叶腋处，花瓣4片，呈现低调的黄绿色。
- 生态环境背景（Ecological Background）：背景可设置为极度干旱、阳光炽烈的热带沙漠、荒漠或岩石山坡上（如东非、阿拉伯半岛）。在烈日灼烧的干旱荒漠背景中，这棵充满沧桑感、挂着凝固树脂的带刺树木，展现出一种在极端环境下顽强分泌生命精华的悲壮之美。

乳香

（中药材）

别名：熏陆香、檳香、乳头香
学名：Boswellia carterii Birdw.
科属：橄榄科（Burseraceae）
乳香属（Boswellia）
药用部位：树脂
采收期：秋、冬两季树脂分泌旺盛时。

生态习性
常绿矮小灌木或小乔木，高4~5米。
喜炎热干燥、阳光充足环境，耐旱耐贫瘠，耐盐碱，生于海拔0~1500米的荒漠、半荒漠、山坡、岩石旱地中。

特征概述
① 树皮灰白色或淡黄色，光滑，常有低状薄片剥落。
② 树干受伤或割伤后，渗出乳白色黏稠树脂，滴落后凝固成淡黄色透明或半透明树脂滴。
③ 叶为奇数羽状复叶，小叶对生，长圆形，边缘波状钝锯齿。
④ 花小，白色，5瓣，成总状花序。
⑤ 果实椭圆形，成熟后开裂。

药用价值
味辛、苦，性温。
归心、肝、脾经。
活血行气、止痛止血、消肿生肌。

主要分布
主要分布于非洲东北部（索马里、埃塞俄比亚、肯尼亚）及阿拉伯半岛（阿曼、也门）等干旱地区。

显微特征（树脂粉末）
树脂酸结晶 树脂油滴 石细胞 导管
• 可见树脂酸结晶，形态不一。
• 含大量树脂油滴，呈圆形或椭圆形。
• 有石细胞及导管，壁厚纹孔明显。

主要成分
本品为橄榄科植物乳香 Boswellia carterii Birdw. 等树干渗出的树脂。
乳香酸（Boswellic acids）
 β -乳香树脂醇（ β -Boswellic acid）
• 主要成分为五环三萜类化合物。
• 具有抗炎、镇痛、抗肿瘤等作用。

主要产地
主产地：索马里、埃塞俄比亚、肯尼亚、阿曼、也门等干旱地区。

性状鉴别要点
• 树脂滴状或块状，半透明。
• 折断面玻璃样光泽。
• 燃烧时有松香样香气。

易混品鉴别
没药
多为棕色或红棕色，质较硬，断面不透明。
安息香
多为黄白色，质较软，有香气。

《神农本草经》原文摘要
乳香，味辛，温。主心腹寒热，邪气，去恶气，下气，消痈风，除寒热，破血通经，止痛。

来源
本品为橄榄科植物乳香 Boswellia carterii Birdw. 等树干渗出的树脂。

性味归经
味辛、苦，性温。归心、肝、脾经。

功效
活血行气，止痛止血，消肿生肌。

主治
胸痹心痛，胃脘疼痛，痛经经闭，风湿痹痛，跌打损伤，痈肿疮毒。

用法用量
煎服：1.5~3g。
研末吞服或入丸散。
外用适量，研末调敷患处。

1. 生境与分布

2. 植株全貌（开花期）

3. 叶片特写（奇数羽状复叶）

4. 花序特写（总状花序）

5. 花部特写（单花）

6. 果实与种子

7. 树脂渗出及加工过程

药材性状（饮片）

① 人工割伤树干 ② 乳汁渗出 ③ 滴落凝固 ④ 采集树脂块 ⑤ 去杂清理 ⑥ 成品

呈不规则颗粒或滴状，半透明，淡黄色或黄白色，表面光滑。质脆，断面玻璃样光泽，具芳香，味辛、苦。

乳香

- **全景构图与株型 (Overall Habit) —— 【核心绘图抓手：羽状复叶与标志性“乳汁滴落”】：** 矮小灌木或小乔木，高约 **4~5 米**。树干粗壮，树皮光滑，呈灰白色或淡黄色，常有纸状薄片剥落。**最核心的视觉抓手是树干上的割伤：在粗糙的树皮缝隙中，正缓缓渗出乳白色的黏稠树脂，就像一滴滴正在流淌的乳汁（故名乳香），并在空气中逐渐凝固成一颗颗半透明的淡黄色硬滴。**
- **叶片与花序特写 (Leaf & Flower Morphology) —— 【核心抓手：奇数羽状复叶与白色小花】：** 叶片为**奇数羽状复叶**，小叶对生，长圆形，边缘有不规则的波状钝锯齿，表面覆盖着一层细小的绒毛。花序为总状花序，花朵小巧精致，**花瓣 5 片**，呈纯洁的白色或微微泛着淡黄色，雄蕊的黄色花药在其间点缀。
- **生态环境背景 (Ecological Background)：** 背景可设置为极度贫瘠、阳光暴晒的**红海沿岸热带荒漠、石灰岩山坡或干燥的戈壁（如阿曼、索马里）**。在干燥龟裂的土地与烈日下，这棵挂着莹润“泪滴”的荒漠树木显得神秘而珍贵。

三七

(中药材)

别名：田七、金不换

学名：Panax notoginseng (Burk.) F.H.Chen

科属：五加科 (Araliaceae)

人参属 (Panax)

药用部位：干燥根和根茎

采收期：秋、冬季采收，
除去须根及泥沙，
晒干。

生态习性

多年生草本。

喜温暖湿润气候，耐阴，怕强光。

适宜在疏松肥沃、富含腐殖质的
微酸性红壤中生长。

主要分布于云南、广西等
地的山坡林下。

特征概述

① 茎直立，单一，高30~60cm。

圆柱形，被疏柔毛。

② 叶轮生茎顶，通常3~4片轮生。

掌状复叶，小叶5~7片，椭圆形，
或倒卵形，边缘有细锯齿和刺毛。

③ 花单性，黄绿色，花小，伞形花序。

花序生于叶腋，花梗细长。

④ 果实球形，成熟时鲜红色。

成熟果实如火如珠，甚为醒目。

⑤ 地下有肥大肉质根，呈不规则
圆锥形或团块状。

药用价值

味甘、微苦，性温。

归肝、肾经。

散瘀止血，消肿定痛。

用于咯血、吐血、衄血、便血、
崩漏下血、外伤出血、跌扑肿痛。

主要分布

主产于云南文山、砚山、马关、
西畴、广西等地，亦有栽培。

1. 生境与分布

2. 植株全貌（花果期）

3. 叶片特写（掌状复叶）

4. 花序特写（花期）

5. 果序特写（果期）

6. 根茎特写（药材形态）

7. 药材加工过程（干燥根）

药材性状（饮片）

8. 显微特征（根横切面）

9. 主要成分

10. 主要产地

11. 性状鉴别要点

12. 易混品鉴别

《神农本草经》原文摘要

来源

性味归经

功效

主治

用法用量

三七

- 全景构图与株型（Overall Habit）——【核心绘图抓手：直立茎与掌状复叶】：
多年生草本植物。株高约 30~60 厘米。茎直立，通常单一，圆柱形，被疏柔毛。
最核心的视觉抓手是其叶片：茎顶通常丛生着几片大型的【掌状复叶】，一般为 3~4 片轮生。每片掌状复叶有小叶 5~7 片，椭圆形至倒卵形，边缘有细密的锯齿和刺毛（轮生掌状复叶是其标志性特征）。

- **地下部分与果序特写 (Root & Flower Morphology) ——【核心抓手：肉质根与红色伞形果序】：** 地下有肥大的肉质根，呈不规则的圆锥形或团块状（即我们所说的三七药材形态），外表淡黄褐色。初夏时节，从叶腋中抽出一根细长的总花梗，顶端长着一团伞形花序。花序上密密麻麻地挂着圆球形的小果实，成熟时变成醒目的鲜红色，宛如一团火红的小宝珠挂在绿叶丛中。
- **生态环境背景 (Ecological Background)：** 背景可设置为云南、广西等亚热带地区温暖湿润、阳光充足的山坡森林下或人工培植园中。阳光透过树叶洒在轮生掌状复叶和那一团火红的伞形果序上，与周围湿润的夏日红土、杂草形成鲜明的对比。

识别维度	三七 (Panax notoginseng)	人参 (Panax ginseng)
小叶数量	通常为 5~7 片	通常为 5 片 （偶见 7 片）
叶缘特征	细锯齿，有明显的硬刺毛	粗锯齿，无刺毛
叶片质地	较薄，叶脉处的刺毛摸上去有粗糙感	较厚，叶面相对平滑
地下主根	短粗疙瘩状 ，坚硬，多瘤状突起	细长圆柱形 ，有芦头，分叉似人形
生长环境	喜温暖湿润，多分布于 南方 （云南、广西）	喜冷凉阴湿，多分布于 北方 （吉林、辽宁、黑龙江）

木通

(中药材)

别名：八月扎、野香蕉、通草藤

学名：Akebia quinata (Houtt.) Deene

科属：木通科 木通属

药用部位：成熟果实

采收期：秋季果实成熟期

生态型与生境

多年生落叶木质缠绕藤本，茎蔓长达数米。

原生于温暖湿润的山地灌木丛或森林中，海拔 500~1500 米。常见于山坡林下、溪流两旁的湿润岩石旁、或攀附在古老树干上。

特征概述

茎蔓粗壮，缠绕性强；掌状复叶，小叶倒卵形；春季开紫黑色花；秋季结大而肥的果实，形似红薯，俗称“八月炸”。

药用价值

果实药用，入药部位为木通果。具有清热利水、通经下乳之功效。



主要分布：中国南方各省区，如四川、贵州、云南、湖北、湖南、江西等地。

1. 生境与分布



攀生于山地林缘、溪旁树干上，喜湿润环境，土壤肥沃。分布于中国南方大部分地区。



2. 株体与茎蔓特征



- 茎蔓粗壮，木质，直径可达 2~5 cm。
- 幼枝绿色，老枝褐色，具纵皱纹。
- 缠绕性强，常呈螺旋状缠绕树木或支架。

3. 叶片特写 (掌状复叶)



- 掌状复叶，3~5 片小叶聚生于长叶柄顶端。
- 小叶倒卵形或椭圆形，先端微凹，基部圆形。
- 叶缘全缘或有波状齿，叶面深绿色光滑，叶背淡绿色。

4. 花序与花部细节



- 春季开花，花单性，雌雄同株。
- 花序为下部的总状花序。
- 花无花瓣，具 3 枚肥厚的萼片，紫黑色或暗紫色。
- 雌花较大，雄花较小且密集。

5. 果实特写 (八月炸)



- 果实长圆形或椭圆形，长 10~20 cm。
- 成熟时外皮紫红色或淡紫色，具淡褐色斑点。
- 果肉白色，味甜，内含多数黑色种子。
- 种子椭圆形，表面光滑。

6. 药用部位 (干燥果实)



- 药用部位为成熟果实。
- 干燥后呈不规则块状或片状。
- 表面棕褐色，质硬而脆，断面黄白色。
- 气微，味微甜。

7. 药材加工过程 (果实→切片→干燥)



① 采收：秋季果实成熟时采收。 ② 剖开：剖开果实，取出果肉与种子。 ③ 切片：将果肉或果肉切片，厚度约 0.5~1 cm。 ④ 晾晒：置于通风处晾晒至干燥。 ⑤ 成品：干燥后即为本通药材，备用。

药材性状 (干燥切片)



呈不规则片状，表面棕褐色，内面黄白色，质硬而脆，气微，味微甜。


8. 显微特征 (果皮横切面)



表皮细胞 石细胞 薄壁细胞 导管

- 果皮表皮细胞外壁增厚。
- 含成群石细胞，呈多角形。
- 薄壁细胞含淀粉粒。

9. 主要成分



- 主要成分为三萜类、皂苷类和生物碱类。
- 其他成分：黄酮类、氨基酸、挥发油等。

10. 性状鉴别要点

- 表面棕褐色，具皱纹及斑点。
- 切面黄白色，质硬而脆。
- 有种子残迹，呈黑色椭圆形。
- 气微，味微甜。

11. 生态环境



生长于海拔 500~1500 米的山地林下，溪边等，喜湿润、半阴环境，土壤肥沃。常攀附于树干、岩石或灌木上。

12. 相关对比



掌状复叶，小叶 3~5 枚。果实大，紫红色。



三出复叶，小叶 3 枚。果实较小，绿色。

木通

- 全景构图与株型 (Overall Habit) ——【核心绘图抓手：缠绕藤本与垂吊果实】：多年生落叶木质缠绕藤本，茎蔓长达数米。最核心的视觉抓手是其强大的“攀援感”：粗糙的褐色藤茎如巨蟒般紧紧缠绕在周围的树干或支架上；到了秋季，藤蔓

间会垂吊着一个个硕大、肥胖、形似红薯的【木通果实】（俗称“八月炸”）。整体构图呈现一种林下藤萝交织、野性而错落有致的视觉张力。

- **叶片特写与纹理 (Leaf Morphology) ——【核心抓手：掌状复叶与长柄】：** 叶片多为**掌状复叶**（通常 3-5 片小叶聚生在长叶柄顶端）。小叶片呈倒卵形或椭圆形（前端微凹，基部圆形），全缘或有波状齿。叶面为清脆的深绿色，叶背为淡绿色。细长的总叶柄在藤蔓上交互错落，形成一片片如绿色手掌般的视觉遮蔽。
- **花序与花部细节 (Macro Floral Details)：** 春季开花，雄雌同株。长有下垂的**总状花序**。最奇特的是花朵的结构与颜色：**花朵没有真正的花瓣，只有 3 枚肥厚的、形似花瓣的萼片，颜色呈高雅而诡异的【紫黑色、暗紫色或淡紫色】**。雌花较大，雄花较小且密集，聚在一起如同精致的微型紫色风铃。
- **生态环境背景 (Ecological Background)：** 原生于温暖湿润的山地灌木丛或疏林中。背景应设置为**海拔 500~1500 米的山坡林下、溪流两旁的湿润岩石旁、或是攀附在古老树干上的野外场景**。阳光透过树叶缝隙，照亮紫暗色的奇特花朵。

郁金

(中药材)

别名: 温郁金、广郁金、白丝郁金
学名: *Curcuma wenyujin* Y. H. Chen
科属: 姜科 (Zingiberaceae)
姜黄属 (*Curcuma*)
药用部位: 侧根顶端膨大的肉质块根
采收期: 秋、冬季采挖

生态习性
多年生大型草本, 喜温暖湿润、阳光充足或半阴的环境, 耐热不耐寒。适宜在疏松肥沃、富含腐殖质、排水良好的微酸性红壤或黄壤中生长。主要分布于云南、广西、四川、贵州等亚热带地区的山坡林下、荒地或人工栽培。

特征概述
① 植株高大, 株高可达1米以上。
② 叶片巨大, 长圆状披针形, 形似芭蕉叶, 4~6片丛生。
③ 花序从叶丛中抽出, 伞形花序, 顶生, 穗状花序, 苞片粉红色, 花朵黄色。
④ 地下根茎发达, 呈块状, 切面黄绿色。
⑤ 侧根顶端膨大成纺锤形或卵圆形肉质块根, 即郁金药材。

药用价值
味辛、苦, 性寒。
归心、肝、脾经。
行气解郁, 活血止痛, 清心凉血, 利胆退黄。
用于胸胁胀痛、心脾两虚、惊悸失眠、热病邪入心包、血瘀气滞经闭、痛经、跌打肿痛、黄疸尿赤等。

主要分布
主产于云南文山、红河、西双版纳、德宏、广西、四川、贵州等地。

1. 生境与分布

生于海拔500~1500米的山坡、平原、林下或人工栽培地。温暖湿润, 阳光充足, 土壤肥沃, 排水良好。

2. 植株全貌 (花期)

3. 叶片特写 (巨型叶片)

4. 花序特写 (穗状花序)

5. 花部特写 (苞片与花)

6. 伞形花序结构

7. 地下部分及加工过程

8. 显微特征 (根茎粉末)

9. 主要成分

10. 主要产地

11. 性状鉴别要点

12. 易混品鉴别

③

②

①

④

⑤

• 叶片长圆状披针形, 长30~60cm, 宽10~20cm。
• 叶柄长而粗, 基部鞘状抱茎。
• 叶脉平行明显, 叶面光滑, 鲜绿色。

• 花序为伞形花序, 顶生, 穗状。
• 苞片粉红色或紫红色, 叠生如宝塔。
• 花小, 黄色, 唇形, 藏于苞片内。

• 苞片顶端粉红色, 下部渐绿或淡黄。
• 花冠黄色, 唇瓣3裂, 中间有紫红斑纹。
• 花小而精致, 散发淡香。

• 花序从叶丛中抽出细长花序干。
• 伞形花序, 辐射状小花梗。
• 果实初期绿色, 成熟红色。

① 挖出植株 ② 剪去地上部分 ③ 洗净泥土 ④ 切开根茎 ⑤ 切取块根 ⑥ 成品 (郁金)

呈类圆形或椭圆形薄片, 表面灰黄色, 切面黄绿色或黄白色, 质坚实, 气香, 味苦、辛。

草酸钙结晶 螺纹导管 淀粉粒 纤维

• 草酸钙结晶类圆形或椭圆形。
• 导管多为螺纹或网纹导管。
• 淀粉粒单粒椭圆形或圆形。
• 纤维长梭形, 壁较厚。

姜黄素 去甲基姜黄素 姜黄素

• 主要成分为姜黄素类化合物。
• 具有抗氧化、抗炎、保肝等作用。

主产地: 云南文山、红河、西双版纳、广西、四川、贵州等地。

• 块根表面灰褐色, 有细皱纹。
• 切面黄绿色或黄白色, 角质样, 内皮层环明显。
• 气香浓郁, 味苦、辛。

温郁金 姜黄

• 温郁金 (本品): 块根纺锤形, 切面黄绿色。
• 姜黄: 根茎呈圆柱形, 切面棕黄色。

《神农本草经》原文摘要

郁金, 味辛, 寒。主心腹邪气, 诸疸瘕, 脐下血, 痛中, 利小便, 止痛。久服轻身, 益气力, 延年。

来源

本品为姜科植物郁金 *Curcuma wenyujin* Y. H. Chen 的干燥块根。

性味归经

味辛、苦, 性寒。归心、肝、脾经。

功效

行气解郁, 活血止痛, 清心凉血, 利胆退黄。

主治

胸胁胀痛, 心脾两虚, 惊悸失眠, 热病邪入心包, 血瘀气滞经闭痛经, 跌打肿痛, 黄疸尿赤。

用法用量

煎服: 3~10g。
外用: 适量, 研末调敷或煎汤洗。

郁金

- 全景构图与株型 (Overall Habit) ——【核心绘图抓手: 巨型叶片与穗状花序】: 多年生大型草本植物, 株高可达1米甚至更高。它最醒目的视觉抓手是那宽大、长圆状披针形的绿色巨型叶片 (形似芭蕉叶), 叶片通常4~6片丛生, 叶柄长而粗。在生长的后期, 会从叶丛中抽出一个细长的伞形花序干, 顶端长着一团密集、如同“粉色小宝塔”或“火炬”一样的穗状花序。花序顶部是美丽的粉红色或紫红色苞片, 里面包裹着细小的黄色唇形花朵。

- **地下部分特写（Underground Structure）——【核心抓手：莖术状根茎与纺锤形块根】：** 这是识别姜黄属植物的关键。挖开红土，可以看到发达、形似姜的【莖术状根茎】，根茎肥大，切面通常是黄绿色。在这些大根茎下面，又生出许多细长的侧根，这些侧根的顶端膨大，形成一个个不规则的纺锤形或卵圆形的【肉质块根】。这些膨大的侧根块根，就是我们所说的郁金药材。它们在生时表面灰褐色，质地非常坚实。
- **生态环境背景（Ecological Background）：** 背景可设置为初夏时节，云南、广西、四川等湿润亚热带地区的山坡、平原或林下，或者人工培植的郁金园中。在阳光透过叶片洒下、红土湿润的夏日杂草背景中，那挂着粉色“火炬”和地下发达块根结构的巨大植物，展现出一种蓬勃、充满异域色彩的姜科生机。

薤白

(中药材)

别名：薤、野薤、山蒜

学名：Allium macrostemon Bunge

科属：葱科 (Amaryllidaceae)

葱属 (Allium)

药用部位：地下鳞茎

采收期：夏季茎叶枯萎后

采挖，除去须根，洗净，鲜用或干燥。

生态习性

多年生草本，喜冷凉湿润气候，耐寒，耐旱，耐瘠薄。常生于山坡、路旁、田野、溪谷旁等处。分布于全国大部分地区。

特征概述

① 叶狭长，半圆柱状，中空，表面有细纵条纹，基部鞘状。

② 地下具小鳞茎，卵球形，直径约1~2cm，外膜白色或带紫色。

③ 花茎自叶丛中抽出，细长直立。

④ 顶生伞形花序，球状，花小而密集。

⑤ 花被片6枚，淡紫色或粉红色。

药用价值

性微温，味辛，苦。归心、肺经。通阳散结，行气导滞。用于胸痹心痛，脘腹痞闷，痛经，产后腹痛，跌打损伤，痈肿作痛等。

主要分布

主产于河北、山西、山东、江苏、安徽、河南、湖北、四川、贵州、云南等地。

1. 生境与分布



生于海拔200~2000米的山坡、路旁、荒地、田野、溪谷旁、林缘等处。



2. 植株全貌 (开花期)



3. 叶片特写 (韭菜状)



- 叶狭长，半圆柱状，中空。
- 表面有细纵条纹。
- 基部鞘状，叶色鲜绿，质地较脆。

4. 花序特写 (伞形花序)



- 伞形花序顶生，球状。
- 花小而密集，呈粉紫色。
- 花梗细长，直立，中空。

5. 花朵特写



- 花被片6枚，淡紫色。
- 雄蕊6枚，花药黄色。
- 花柱细长，柱头略膨大。

6. 地下鳞茎特写 (药材)



- 鳞茎卵球形，直径1~2cm。
- 外膜白色或带紫色，膜质。
- 肉质鳞片肥厚，具有辛辣气味。

7. 地下部分及加工过程




① 挖出植株 ② 去除须根和泥土 ③ 洗净鳞茎 ④ 切片 ⑤ 干燥 ⑥ 成品

药材性状 (饮片)



呈类圆形或椭圆形薄片，表面类白色或淡棕色，质脆，易折断，气微，味辛。


8. 显微特征 (鳞茎横切面)



表皮 皮层 维管束 内皮层

- 外层表皮细胞一列，外被角质层。
- 皮层薄壁细胞，含淀粉粒。
- 维管束散生，呈点状分布。
- 内皮层细胞含草酸钙结晶。

9. 主要成分



硫化丙烯 (allicin) 苊素 (allin)

- 主要成分为含硫化合物。
- 具有抗菌、抗炎、扩张血管等作用。

10. 主要产地



主产地：河北、山西、山东、江苏、安徽、河南、湖北、四川等地。

11. 性状鉴别要点



- 鳞茎小而圆，外膜白或紫，辛辣气味。
- 切面乳白色，质脆，易断。
- 微辛辣味，嚼之有蒜臭。

12. 易混品鉴别



野薤 薤

- 野薤：鳞茎小，单生或2~3枚。
- 薤：鳞茎大，成簇。
- 野薤：叶细，花紫。
- 薤：叶中空，花白色。

《神农本草经》原文摘要



薤，味辛，温。主心腹邪气，结痛痈病，破冷气，散痈疽，开胃下气，化谷食。

来源

本品为葱科植物薤 (Allium macrostemon Bunge) 的干燥鳞茎。



性味归经

性温，味辛，苦。归心、肺经。



功效

通阳散结，行气导滞。



主治

胸痹心痛，脘腹痞闷，痛经，产后腹痛，跌打损伤，痈肿作痛。



用法用量

煎服：3~10g。外用：适量，捣敷或调敷。



薤白

- 全景构图与株型 (Overall Habit) ——【核心绘图抓手：韭菜/葱状细叶与地下小鳞茎】：多年生草本植物，株高约 30~70 厘米。最醒目的视觉抓手是它的叶片：叶子非常狭长，呈半圆柱状或线形（极像我们平时吃的野葱、细韭菜或小葱），中空，表面有细纵条纹。
- 地下部分与花序特写 (Underground & Flower Morphology) ——【核心抓手：小球状鳞茎与粉紫色伞形花序】：地下生有肉质的、卵球形的小鳞茎（也就是薤白

药材本体），直径约 1~2 厘米，外面包裹着白色或带紫色的膜质鳞皮。初夏时，从叶丛中抽出一根直立、细长的花葶，顶端长着一团圆球状的伞形花序。花朵非常细小而密集，花被片 6 片，呈现淡紫色或粉红色，像一朵挂在细秆顶端、毛茸茸的粉紫色小绒球。

- 生态环境背景（Ecological Background）：背景可设置为春末夏初的荒地、山坡、路旁、田野或溪谷旁的草丛中。在微风吹拂的绿色野草背景下，薤白那纤细的、带着粉紫色小球花序的茎秆轻轻摇曳，泥土下隐约露出一颗颗白嫩、饱满的卵圆形小蒜头。

识别维度	薤白 (Allium macrostemon)	野葱 (普通野葱/山葱等)
鳞茎聚散	单生，一颗一颗独立生长	丛生，几颗常常粘连在一起
鳞茎形状	圆球形、卵圆形（像小蒜头）	纺锤形、修长卵形（像小洋葱）
鳞茎外皮	白色/淡紫色膜质，光滑易碎	红褐色/黄褐色，常老熟为网状纤维
叶片截面	半圆柱形，单侧有纵沟	正圆柱形，中空圆筒状
花序特征	花序中密生暗紫色的小珠芽（硬疙瘩）	花序非常干净，只有花，无珠芽

补骨脂

(中药材)

别名：破故纸、补骨脂子
学名：Psoralea corylifolia L.
科属：豆科 (Fabaceae)
补骨脂属 (Psoralea)

药用部位：干燥成熟果实
采收期：秋季果实成熟时采收。
晒干或低温干燥。

形态特征

- 多年生草本，或一二年生。
- 茎直立，多分枝，具明显棱角，被黑褐色腺点。
- 叶单生，互生；叶片宽卵形，先端钝圆，基部近心形；边缘有不规则粗锯齿；两面密被细柔毛，背面更密。
- 花期 6~8 月。头状花序腋生或顶生，花小而密集，花冠紫红色或白色。
- 果期 8~10 月，果实极小，为肾形小坚果，表面密布黑色腺点和细小网纹。

生长环境

喜温暖、阳光充足环境，耐旱、耐瘠薄。多生于山坡、荒地、路旁、田边、灌丛或林缘等地。

药用价值

味辛、苦，性温。归肾、脾经。
补肾助阳，纳气平喘，温脾止泻，外用消风祛斑、杀虫止痒。
主治肾阳虚寒、腰膝冷痛、阳痿遗精、虚寒泄泻、久泻不止、白痢风、斑秃、疥癣等。

1. 生境环境

多生于山坡、荒地、路旁、田边、灌丛或林缘等阳光充足处。

2. 植株全貌 (花期)

3. 茎与叶特写

- 叶单生，宽卵形，边缘粗锯齿。
- 茎具明显棱角，密生黑褐色腺点。
- 两面被细柔毛，背面更密。

4. 花序特写 (头状)

- 头状花序，腋生或顶生。
- 花小而密集，紫红色或白色。
- 花期 6~8 月。

5. 花特写

- 花冠蝶形，花小。
- 紫红色或白色。
- 花萼具细毛。

6. 果实特写 (成熟)

- 果期 8~10 月。
- 果实极小，为肾形小坚果。
- 表面具刺状突起及黑色腺点。

7. 果实与种子特写

- 肾形或扁肾形小坚果，长约 1~1.5 mm。
- 表面密布突起小网纹与黑色腺点。
- 质坚硬，断面黄白色，种仁油润。

8. 地下部分 (根系)

- 主根粗壮，黄棕色，向下深长直伸。
- 侧根多，细长，分布广。
- 根上有横生根状茎。

药材性状 (饮片)

呈肾形小颗粒，表面黑褐色或黑色，有细小网纹及黑色腺点。质坚硬，气微，味微苦。

9. 生长周期示意

出苗期 幼苗期 生长期 开花期 结果期

10. 分布区域

主产于陕西、山西、浙江、河南、湖北、四川、湖南、江西等地。

11. 易混品鉴别

补骨脂	胡芦巴
• 表面密布黑色腺点和网纹。	• 表面光滑或微皱。
• 形状为肾形。	• 形状多为三角形。

12. 采收与加工

采收 晒干或阴干 脱粒去杂

补骨脂

- 全景形态与生态 (Overall Habit & Habitat)：** 植株高约 60–150 厘米。茎直立，枝条有明显棱角和黑褐色腺点。叶单生，呈宽卵形，边缘有不规则的粗锯齿。夏秋季节开花，花小，呈紫红色或白色，密集成头状的花序。
- 地下与果实特写 (Fruit & Seed Morphology) ——【核心抓手：小肾形/扁颗粒与黑色腺点】：** 采收期多在秋季果实成熟时。最核心的视觉抓手是其极小的黑色或黑褐色肾形小果实，表面密布突起的细小网纹与黑点。

