

# 川红花

## (中药材)

别名：红花、草红花、刺红花  
学名：Carthamus tinctorius L.  
科属：菊科 (Asteraceae)  
红花属 (Carthamus)

药用部位：干燥花冠  
采收期：夏季花由黄变红时采收

**生态习性**  
一年生或二年生草本，高50~150cm。  
喜温暖、阳光充足、干燥环境，耐旱、怕涝。  
生于平原、山坡、荒地、田野、路旁等。

**特征概述**  
① 茎直立，上部分枝，白色或淡黄色，有纵棱。  
② 叶片无柄，披针形或椭圆形，边缘有羽状齿刺，尖锐硬刺。  
③ 头状花序顶生，花初开为黄色，盛开时变红色或橙红色。  
④ 果实为瘦果，倒卵形，具纵棱。

**药用价值**  
味辛，性温。  
归心、肝经。  
活血通经，祛瘀止痛，消肿散结。

**主要分布**  
全国大部分地区均有栽培，主产于新疆、甘肃、河南、山东、江苏等地。



**1. 生境与分布**



生于山坡、田野、荒地、路旁等阳光充足处。喜温暖干燥气候，耐旱性强。



**2. 植株全貌 (花期)**



**3. 叶片特写 (羽状齿刺叶)**



- 叶片披针形或椭圆形，无柄。
- 边缘具羽状齿刺，尖锐硬刺。
- 表面绿色，有光泽。

**4. 花序特写 (头状花序)**



- 头状花序单生，顶生，直径3~4cm。
- 总苞多层，卵状披针形，边缘有刺。
- 花托平坦，密生管状花。

**5. 花的特写 (渐变过程)**



- 花初开时黄色，逐渐变为橙色，盛开时红色。
- 花冠管状，5裂，花柱伸出。

**6. 果实与种子**



- 果实为瘦果，倒卵形，有纵棱。
- 成熟时褐色，内含种子一粒。
- 种子黄白色，扁平。

**7. 药材加工过程 (花)**




① 采收 (黄变红时) ② 摊晒 ③ 切干 ④ 烘干 ⑤ 筛选 ⑥ 成品

**药材性状 (饮片)**



为干燥的管状花，橙红色或红色，质轻而松脆，气微，味微苦。


**8. 显微特征 (花粉及花冠)**



花粉粒 花柱表面 花冠表皮 腺毛

- 花粉呈球形，表面具刺状突起。
- 花冠表皮细胞呈长方形，排列紧密。
- 可见腺毛，顶端多细胞。

**9. 主要成分**



红花黄色素 A 红花黄色素 B 红花苷

- 主要成分为红花黄色素类化合物。
- 具有活血化淤、抗氧化等作用。

**10. 主要产地**



主产地：新疆、甘肃、河南、山东、江苏、安徽、湖北、四川等地。

**11. 性状鉴别要点**



- 花冠筒细长，先端5裂。
- 柱头分叉，伸出花冠外。
- 色橙红或红色，质轻松脆。

**12. 易混品鉴别**

| 藏红花 (本品)               | 野红花                  |
|------------------------|----------------------|
|                        |                      |
| 花冠细长，先端5裂，柱头分叉显著，颜色橙红。 | 花冠短胖，柱头不明显，颜色暗红或紫暗红。 |

**《神农本草经》原文摘要**

红花，味辛，温。主心腹邪气，忧恚怒，益气，通九窍，破坚垒，散瘀血。



**来源**

本品为菊科植物红花 Carthamus tinctorius L. 的干燥花。



**性味归经**

味辛，性温。  
归心、肝经。



**功效**

活血通经，祛瘀止痛，消肿散结。



**主治**

血瘀经闭，痛经，产后瘀阻腹痛，跌打损伤，瘀血肿痛。



**用法用量**

煎服：3~9g。  
外用：适量，研末调敷或浸酒敷患处。



川红花

- 全景构图与株型 (Overall Habit) ——【核心绘图抓手：直立草本与羽状齿刺叶】：一年生或二年生直立草本，高约 50~150 厘米。茎直立，上部分枝，呈白色或淡黄色。最核心的视觉抓手是它的叶片：叶片无柄，呈披针形或椭圆形，边缘有尖锐的羽状齿刺（针刺），显得极为硬朗和锋利。
- 花序特写 (Flower Morphology) ——【核心抓手：头状花序与渐变管状花】：茎顶端生有大型的头状花序，直径可达 3~4 厘米。花序外围包裹着多层卵状披针形

的绿色苞片，苞片边缘同样带有锋利的齿刺。花序中央密生着管状花，在开放过程中会经历奇妙的颜色渐变——初开时为黄色，盛开时变为红色或橙红色。

- **生态环境背景（Ecological Background）：**背景可设置为阳光充沛、温暖干燥的农田、山坡或平原绿野。在夏日晴空下，红花那带有锋利硬刺的翠绿植株上，绽放出一团团如火般燃烧的橙红色花头，展现出极其顽强且富有张力的生命律动。

| 识别维度        | 川红花 (草红花)                | 藏红花 (番红花)                 |
|-------------|--------------------------|---------------------------|
| 植株高度        | 50~150 厘米（高大）            | 10~20 厘米（矮小）              |
| 地上茎         | 有明显粗壮、分枝的茎干              | 无地上茎，叶花直接自地面长出            |
| 地下根茎        | 普通直根                     | 扁球形的“大蒜状”球茎               |
| 叶片形态        | 宽大，硬革质， <b>边缘有尖锐刺</b>    | 极狭长如韭菜，柔软， <b>边缘无刺</b>    |
| 花朵外观        | 绿刺苞片包裹的 <b>橙红色管状头状花序</b> | 优雅、柔嫩的 <b>六瓣紫色花朵</b>      |
| 药用部分在活体上的位置 | 顶端头状花序上的整朵管状花            | 紫色花朵中央垂下的 <b>3 根深红色柱头</b> |



- **叶片与花部特写 (Leaf & Flower Morphology) ——【核心抓手：三出复叶与亮黄花朵】：** 叶片为典型的羽状三出复叶。托叶很大，呈披针形；小叶片多为卵形或长圆状卵形，全缘或微有三裂，叶面呈现健康的深绿色。**花序为腋生的总状花序，花朵小巧而精致，花冠呈现极其明亮的【鲜黄色或亮黄色】。**龙骨瓣（花瓣的一种）呈螺旋状卷曲，在绿叶衬托下犹如一只只金色的小蝴蝶。
- **生态环境背景 (Ecological Background)：** 背景应设置为阳光充足的华北或华中农田、田埂两旁、或是乡村的菜园边缘。





- **叶片特写与纹理（Leaf Morphology）——【核心抓手：羽状深裂与白绒毛】：** 叶片互生，具有强烈的几何艺术感。中下部叶片较大，呈卵状椭圆形，呈羽状深裂（通常 5~7 裂，裂片呈椭圆状披针形，边缘有不规则的粗锯齿）。叶片正面为饱满的翠绿色或深绿色，有稀疏的柔毛；**最惊艳的视觉抓手是叶片背面：密被一层极厚、极细腻的灰白色或银白色的蛛丝状绒毛，迎光看去，宛如覆盖了一层白霜。**
- **花序与花部细节（Macro Floral Details）：** 夏秋季开花，顶生宏大而密集的**穗状圆锥花序**。花头（头状花序）极小，直径仅 2.5~3 毫米，呈椭圆形，无柄，密集成密穗状。花冠为极其低调的淡黄色、黄褐色或微带紫色，无数小花序在枝头排布，充满乡野自然的气息。
- **生态环境背景（Ecological Background）：** 背景应设置为阳光充足的荒地、路旁、田野边缘、或是低山坡的灌木丛旁。端午时节的清晨，阳光穿透薄雾照在带有晶莹露珠的艾叶上，展现出其顽强的生命力。

| 药名 | 标志性视觉抓手            | 标志性物理触觉与气味         | 临床核心神技 (一句话概括)       |
|----|--------------------|--------------------|----------------------|
| 艾叶 | 叶片羽状大裂，叶背密布银白厚绒毛   | 质地如软布；带浓烈提神的特异温和辛香 | 暖宫散寒，温经止血（妇科圣药、艾灸主角） |
| 茵陈 | 叶片裂成极细的丝线（绵茵陈幼苗）   | 质地卷曲如绵絮团；气味微香、味微苦  | 清热利湿，专退黄疸（肝胆湿热核心药）   |
| 青蒿 | 叶片呈精细的蕨类状深裂，通体光滑无毛 | 质地干枯发脆；带有强烈的特异解暑恶香 | 清透虚热，凉血截疟（专治疟疾与骨蒸潮热） |



# 没药

## (中药材)

别名: 没药树、末药

学名: *Commiphora myrrha* (Nees) Engl.

科属: 橄榄科 (Burseraceae)

没药属 (*Commiphora*)

药用部位: 干燥树脂

采收期: 全年可采, 以干燥季节为佳

### 生态习性

落叶灌木或小乔木, 高3~4米。

喜高温干旱、阳光充足的环境, 耐极度干旱, 适应性强。

生于非洲东部、阿拉伯半岛等地的荒漠、岩石山坡及干旱灌丛中。

### 特征概述

① 树干粗壮, 树皮灰色或黄褐色, 薄片状剥落。

② 枝条多刺, 尖端常退化为尖锐硬刺。

③ 叶多为单叶或三出复叶, 倒卵形, 边缘波状钝锯齿。

④ 花朵细小, 簇生于叶腋, 黄绿色, 花瓣4片。

⑤ 树干或枝条受伤后渗出乳白色或淡黄色油胶树脂, 干燥后呈黄褐色透明或半透明的块状。

### 药用价值

味苦, 性平。

归心、肝、脾经。

活血止痛, 消肿生肌。

用于跌打损伤, 内服、痛经, 瘀血肿痛, 痈肿疮毒。

### 主要分布

主要分布于非洲东北部(索马里、埃塞俄比亚等地)及阿拉伯半岛的干旱地区。

### 1. 生境与分布

生于极度干旱的岩石山坡、荒漠地带, 耐高温干旱, 阳光强烈。

### 2. 植株全貌 (开花期)

### 3. 叶片特写 (单叶与三出复叶)

- 单叶倒卵形, 边缘波状钝锯齿。
- 三出复叶, 小叶倒卵形或倒卵状椭圆形。
- 叶表面绿色, 略带光泽; 叶背淡绿色。

### 4. 花序特写 (花簇)

- 花序簇生于叶腋处。
- 花根小, 花瓣4片, 黄绿色。
- 雄蕊4枚, 花丝短, 花药黄色。

### 5. 花部特写 (单花)

- 花瓣4片, 卵圆形。
- 花盘环状, 中央具花柱。
- 花香淡雅。

### 6. 枝条与刺特写

- 枝条多刺, 硬刺尖锐。
- 刺由枝条顶端退化而成。
- 刺长约1~3厘米, 坚硬锐利。

### 7. 树干渗出树脂 (油胶) 及加工过程

① 人工割伤树皮 ② 树脂缓慢渗出 ③ 树脂凝固 ④ 采集树脂块 ⑤ 初步筛选 ⑥ 成品

### 药材性状 (饮片)

呈不规则块状或颗粒状, 大小不一。表面黄褐色或淡棕色, 半透明, 有光泽, 质脆而韧, 气香, 味苦。

### 8. 显微特征 (树脂粉末)

油滴 树脂块 石细胞 导管

- 树脂中含油滴、树脂块、石细胞等。
- 油滴圆形或椭圆形, 散在或聚集。
- 石细胞多角形或类圆形, 壁厚。

### 9. 主要成分

倍半萜类 挥发油 树脂酸类

- 主要成分为倍半萜类、挥发油、树脂酸等。
- 具有抗炎、镇痛、抗菌等作用。

### 10. 主要产地

主产地: 索马里、埃塞俄比亚、肯尼亚、阿曼、也门等干旱地区。

### 11. 性状鉴别要点

- 表面黄褐色或淡棕色, 半透明。
- 质脆而韧, 断面玻璃样光泽。
- 气芳香, 味苦, 嚼之粘牙。

### 12. 易混品鉴别

| 乳香          | 安息香          |
|-------------|--------------|
| 乳香呈豆状, 乳白色。 | 安息香呈块状, 棕褐色。 |
| 质坚硬, 断面白色。  | 气香浓烈, 味微苦。   |

### 《神农本草经》原文摘要

没药, 味苦, 平。主心腹邪气, 风痹, 寒热, 破积聚, 除痼癖, 止痛。久服轻身, 不老。

### 来源

本品为橄榄科植物没药 *Commiphora myrrha* (Nees) Engl. 的干燥树脂。

### 性味归经

味苦, 性平。归心、肝、脾经。

### 功效

活血止痛, 消肿生肌。

### 主治

跌打损伤, 痛经, 瘀血肿痛, 痈肿疮毒。

### 用法用量

煎服: 3~10g。  
外用: 适量, 研末调敷或入膏药中。

没药

- 全景构图与株型 (Overall Habit) ——【核心绘图抓手: 多刺小乔木与树干渗出的油胶】: 低矮的落叶灌木或小乔木, 高约 3~4 米。树干粗壮, 树皮呈灰色或黄褐色, 常成薄片状剥落。最震撼、最具故事感的视觉抓手是它的树干: 在粗壮树干或树枝上, 有天然裂口或人工割伤的痕迹, 从这些伤口中正缓缓渗出黏稠的乳白色或淡黄色的油胶树脂, 它们在空气中渐渐凝固, 挂在树皮上, 宛如一滴滴凝固的琥珀或泪珠。此外, 它的枝条尖端常退化成尖锐的硬刺。



- 叶片与花部特写（Leaf & Flower Morphology）——【核心抓手：倒卵形单叶/三出复叶与细小黄花】：叶片多为单叶，或由3片小叶组成的三出复叶，倒卵形，边缘有波状钝锯齿。花朵非常细小，成簇生于叶腋处，花瓣4片，呈现低调的黄绿色。
- 生态环境背景（Ecological Background）：背景可设置为极度干旱、阳光炽烈的热带沙漠、荒漠或岩石山坡上（如东非、阿拉伯半岛）。在烈日灼烧的干旱荒漠背景中，这棵充满沧桑感、挂着凝固树脂的带刺树木，展现出一种在极端环境下顽强分泌生命精华的悲壮之美。

## 乳香

### （中药材）

别名：熏陆香、檳香、乳头香  
学名：Boswellia carterii Birdw.  
科属：橄榄科（Burseraceae）  
乳香属（Boswellia）  
药用部位：树脂  
采收期：秋、冬两季树脂分泌旺盛时。

**生态习性**  
常绿矮小灌木或小乔木，高4~5米。  
喜炎热干燥、阳光充足环境，耐旱耐贫瘠，耐盐碱，生于海拔0~1500米的荒漠、半荒漠、山坡、岩石旱地中。

**特征概述**  
① 树皮灰白色或淡黄色，光滑，常有低状薄片剥落。  
② 树干受伤或割伤后，渗出乳白色黏稠树脂，滴落后凝固成淡黄色透明或半透明树脂滴。  
③ 叶为奇数羽状复叶，小叶对生，长圆形，边缘波状钝锯齿。  
④ 花小，白色，5瓣，成总状花序。  
⑤ 果实椭圆形，成熟后开裂。

**药用价值**  
味辛、苦，性温。  
归心、肝、脾经。  
活血行气、止痛止血、消生肌。

**主要分布**  
主要分布于非洲东北部（索马里、埃塞俄比亚、肯尼亚）及阿拉伯半岛（阿曼、也门）等干旱地区。

**显微特征（树脂粉末）**  
树脂酸结晶 树脂油滴 石细胞 导管  
• 可见树脂酸结晶，形态不一。  
• 含大量树脂油滴，呈圆形或椭圆形。  
• 有石细胞及导管，壁厚纹孔明显。

**主要成分**  
本品为橄榄科植物乳香 Boswellia carterii Birdw. 等树干渗出的树脂。  
乳香酸（Boswellic acids）  
 $\beta$ -乳香树脂醇（ $\beta$ -Boswellic acid）  
• 主要成分为五环三萜类化合物。  
• 具有抗炎、镇痛、抗肿瘤等作用。

**主要产地**  
主产地：索马里、埃塞俄比亚、肯尼亚、阿曼、也门等干旱地区。

**性状鉴别要点**  
• 树脂滴状或块状，半透明。  
• 折断面玻璃样光泽。  
• 燃烧时有松香样香气。

**易混品鉴别**  
没药  
多为棕色或红棕色，质较硬，断面不透明。  
安息香  
多为黄白色，质较软，有香气。

**《神农本草经》原文摘要**  
乳香，味辛，温。主心腹寒热，邪气，去恶气，下气，消痈风，除寒热，破血通经，止痛。

**来源**  
本品为橄榄科植物乳香 Boswellia carterii Birdw. 等树干渗出的树脂。

**性味归经**  
味辛、苦，性温。归心、肝、脾经。

**功效**  
活血行气，止痛止血，消生肌。

**主治**  
胸痹心痛，胃脘疼痛，痛经经闭，风湿痹痛，跌打损伤，痈肿疮毒。

**用法用量**  
煎服：1.5~3g。  
研末吞服或入丸散。  
外用适量，研末调敷患处。

1. 生境与分布

2. 植株全貌（开花期）

3. 叶片特写（奇数羽状复叶）

4. 花序特写（总状花序）

5. 花部特写（单花）

6. 果实与种子

7. 树脂渗出及加工过程

① 人工割伤树干 ② 乳汁渗出 ③ 滴落凝固 ④ 采集树脂块 ⑤ 去杂清理 ⑥ 成品

药材性状（饮片）

呈不规则颗粒或块状，半透明，淡黄色或黄白色，表面光滑。质脆，断面玻璃样光泽，具芳香，味辛、苦。



## 乳香

- **全景构图与株型 (Overall Habit) —— 【核心绘图抓手：羽状复叶与标志性“乳汁滴落”】：** 矮小灌木或小乔木，高约 **4~5 米**。树干粗壮，树皮光滑，呈灰白色或淡黄色，常有纸状薄片剥落。**最核心的视觉抓手是树干上的割伤：在粗糙的树皮缝隙中，正缓缓渗出乳白色的黏稠树脂，就像一滴滴正在流淌的乳汁（故名乳香），并在空气中逐渐凝固成一颗颗半透明的淡黄色硬滴。**
- **叶片与花序特写 (Leaf & Flower Morphology) —— 【核心抓手：奇数羽状复叶与白色小花】：** 叶片为**奇数羽状复叶**，小叶对生，长圆形，边缘有不规则的波状钝锯齿，表面覆盖着一层细小的绒毛。花序为**总状花序**，花朵小巧精致，**花瓣 5 片**，呈纯洁的白色或微微泛着淡黄色，雄蕊的黄色花药在其间点缀。
- **生态环境背景 (Ecological Background)：** 背景可设置为**极度贫瘠、阳光暴晒的红海沿岸热带荒漠、石灰岩山坡或干燥的戈壁（如阿曼、索马里）**。在干燥龟裂的土地与烈日下，这棵挂着莹润“泪滴”的荒漠树木显得神秘而珍贵。





- **地下部分与果序特写 (Root & Flower Morphology) ——【核心抓手：肉质根与红色伞形果序】：** 地下有肥大的肉质根，呈不规则的圆锥形或团块状（即我们所说的三七药材形态），外表淡黄褐色。初夏时节，从叶腋中抽出一根细长的总花梗，顶端长着一团伞形花序。花序上密密麻麻地挂着圆球形的小果实，成熟时变成醒目的鲜红色，宛如一团火红的小宝珠挂在绿叶丛中。
- **生态环境背景 (Ecological Background)：** 背景可设置为云南、广西等亚热带地区温暖湿润、阳光充足的山坡森林下或人工培植园中。阳光透过树叶洒在轮生掌状复叶和那一团火红的伞形果序上，与周围湿润的夏日红土、杂草形成鲜明的对比。

| 识别维度 | 三七 (Panax notoginseng)       | 人参 (Panax ginseng)               |
|------|------------------------------|----------------------------------|
| 小叶数量 | 通常为 <b>5~7 片</b>             | 通常为 <b>5 片</b> （偶见 7 片）          |
| 叶缘特征 | 细锯齿，有明显的硬刺毛                  | 粗锯齿，无刺毛                          |
| 叶片质地 | 较薄，叶脉处的刺毛摸上去有粗糙感             | 较厚，叶面相对平滑                        |
| 地下主根 | <b>短粗疙瘩状</b> ，坚硬，多瘤状突起       | <b>细长圆柱形</b> ，有芦头，分叉似人形          |
| 生长环境 | 喜温暖湿润，多分布于 <b>南方</b> （云南、广西） | 喜冷凉阴湿，多分布于 <b>北方</b> （吉林、辽宁、黑龙江） |

# 木通

(中药材)

别名：八月扎、野香蕉、通草藤

学名：Akebia quinata (Houtt.) Deene

科属：木通科 木通属

药用部位：成熟果实

采收期：秋季果实成熟期

## 生态型与生境

多年生落叶木质缠绕藤本，茎蔓长达数米。

原生于温暖湿润的山地灌木丛或森林中，海拔 500~1500 米。常见于山坡林下、溪流两旁的湿润岩石旁、或攀附在古老树干上。

## 特征概述

茎蔓粗壮，缠绕性强；掌状复叶，小叶倒卵形；春季开紫黑色花；秋季结大而肥的果实，形似红薯，俗称“八月炸”。

## 药用价值

果实药用，入药部位为木通果。具有清热利水、通经下乳之功效。



主要分布：中国南方各省区，如四川、贵州、云南、湖北、湖南、江西等地。

### 1. 生境与分布



攀援于山地林缘、溪旁树干上，喜湿润环境，土壤肥沃。分布于中国南方大部分地区。



### 2. 株体与茎蔓特征



- 茎蔓粗壮，木质，直径可达 2~5 cm。
- 幼枝绿色，老枝褐色，具纵皱纹。
- 缠绕性强，常呈螺旋状缠绕树木或支架。

### 3. 叶片特写 (掌状复叶)



- 掌状复叶，3~5 片小叶聚生于长叶柄顶端。
- 小叶倒卵形或椭圆形，先端微凹，基部圆形。
- 叶缘全缘或有波状齿，叶面深绿色光滑，叶背淡绿色。

### 4. 花序与花部细节



- 春季开花，花单性，雌雄同株。
- 花序为下部的总状花序。
- 花无花瓣，具 3 枚肥厚的萼片，紫黑色或暗紫色。
- 雌花较大，雄花较小且密集。

### 5. 果实特写 (八月炸)



- 果实长圆形或椭圆形，长 10~20 cm。
- 成熟时外皮紫红色或淡紫色，具淡褐色斑点。
- 果肉白色，味甜，内含多数黑色种子。
- 种子椭圆形，表面光滑。

### 6. 药用部位 (干燥果实)



- 药用部位为成熟果实。
- 干燥后呈不规则块状或片状。
- 表面棕褐色，质硬而脆，断面黄白色。
- 气微，味微甜。

### 7. 药材加工过程 (果实→切片→干燥)



① 采收 秋季果实成熟时采收。



② 剖开果实，取出果肉与种子。



③ 切片 将果肉或果肉切片，厚度约 0.5~1 cm。



④ 晾晒 置于通风处晾晒至干燥。



⑤ 成品 干燥后即为本通药材，备用。

#### 药材性状 (干燥切片)



呈不规则片状，表面棕褐色，内面黄白色，质硬而脆，气微，味微甜。

### 8. 显微特征 (果皮横切面)



表皮细胞 石细胞 薄壁细胞 导管

- 果皮表皮细胞外壁增厚。
- 含成群石细胞，呈多角形。
- 薄壁细胞含淀粉粒。

### 9. 主要成分



齐墩果酸 (Oleonic acid)



木通皂苷 (Akebiin)



木通碱 (Akebin)

- 主要成分为三萜类、皂苷类和生物碱类。
- 其他成分：黄酮类、氨基酸、挥发油等。

### 10. 性状鉴别要点

- 表面棕褐色，具皱纹及斑点。
- 切面黄白色，质硬而脆。
- 有种子残迹，呈黑色椭圆形。
- 气微，味微甜。

### 11. 生态环境



生长于海拔 500~1500 米的山地林下，溪边等，喜湿润、半阴环境，土壤肥沃。常攀附于树干、岩石或灌木上。

### 12. 相关对比



木通 (本品)



三叶木通

掌状复叶，小叶 3~5 枚。三出复叶，小叶 3 枚。果实大，紫红色。果实较小，绿色。

木通

- 全景构图与株型 (Overall Habit) ——【核心绘图抓手：缠绕藤本与垂吊果实】：多年生落叶木质缠绕藤本，茎蔓长达数米。最核心的视觉抓手是其强大的“攀援感”：粗糙的褐色藤茎如巨蟒般紧紧缠绕在周围的树干或支架上；到了秋季，藤蔓

间会垂吊着一个个硕大、肥胖、形似红薯的【木通果实】（俗称“八月炸”）。整体构图呈现一种林下藤萝交织、野性而错落有致的视觉张力。

- **叶片特写与纹理 (Leaf Morphology) ——【核心抓手：掌状复叶与长柄】：** 叶片多为**掌状复叶**（通常 3-5 片小叶聚生在长叶柄顶端）。小叶片呈倒卵形或椭圆形（前端微凹，基部圆形），全缘或有波状齿。叶面为清脆的深绿色，叶背为淡绿色。细长的总叶柄在藤蔓上交互错落，形成一片片如绿色手掌般的视觉遮蔽。
- **花序与花部细节 (Macro Floral Details)：** 春季开花，雄雌同株。长有下垂的**总状花序**。最奇特的是花朵的结构与颜色：**花朵没有真正的花瓣，只有 3 枚肥厚的、形似花瓣的萼片，颜色呈高雅而诡异的【紫黑色、暗紫色或淡紫色】**。雌花较大，雄花较小且密集，聚在一起如同精致的微型紫色风铃。
- **生态环境背景 (Ecological Background)：** 原生于温暖湿润的山地灌木丛或疏林中。背景应设置为**海拔 500~1500 米的山坡林下、溪流两旁的湿润岩石旁、或是攀附在古老树干上的野外场景**。阳光透过树叶缝隙，照亮紫暗色的奇特花朵。



# 郁金

(中药材)

别名: 温郁金、广郁金、白丝郁金  
学名: *Curcuma wenyujin* Y. H. Chen  
科属: 姜科 (Zingiberaceae)  
姜黄属 (*Curcuma*)  
药用部位: 侧根顶端膨大的肉质块根  
采收期: 秋、冬季采挖

**生态习性**  
多年生大型草本, 喜温暖湿润、阳光充足或半阴的环境, 耐热不耐寒。适宜在疏松肥沃、富含腐殖质、排水良好的微酸性红壤或黄壤中生长。主要分布于云南、广西、四川、贵州等亚热带地区的山坡林下、荒地或人工栽培。

**特征概述**  
① 植株高大, 株高可达1米以上。  
② 叶片巨大, 长圆状披针形, 形似芭蕉叶, 4~6片丛生。  
③ 花序从叶丛中抽出, 伞形花序, 顶生, 穗状花序, 苞片粉红色, 花朵黄色。  
④ 地下根茎发达, 呈块状, 切面黄绿色。  
⑤ 侧根顶端膨大成纺锤形或卵圆形肉质块根, 即郁金药材。

**药用价值**  
味辛、苦, 性寒。  
归心、肝、胆经。  
行气解郁, 活血止痛, 清心凉血, 利胆退黄。  
用于胸胁胀痛、心痹抑郁、惊悸失眠、热病邪入心包、血瘀气滞经闭、痛经、跌扑肿痛、黄疸尿赤等。

**主要分布**  
主产于云南文山、红河、西双版纳、德宏、广西、四川、贵州等地。

1. 生境与分布

生于海拔500~1500米的山坡、平原、林下或人工栽培地。温暖湿润, 阳光充足, 土壤肥沃, 排水良好。

2. 植株全貌 (花期)

3. 叶片特写 (巨型叶片)

4. 花序特写 (穗状花序)

5. 花部特写 (苞片与花)

6. 伞形花序结构

7. 地下部分及加工过程

8. 显微特征 (根茎粉末)

9. 主要成分

10. 主要产地

11. 性状鉴别要点

12. 易混品鉴别

③

②

①

④

⑤

• 叶片长圆状披针形, 长30~60cm, 宽10~20cm。  
• 叶柄长而粗, 基部鞘状抱茎。  
• 叶脉平行明显, 叶面光滑, 鲜绿色。

• 花序为伞形花序, 顶生, 穗状。  
• 苞片粉红色或紫红色, 叠生如宝塔。  
• 花小, 黄色, 唇形, 藏于苞片内。

• 苞片顶端粉红色, 下部渐绿或淡黄。  
• 花冠黄色, 唇瓣3裂, 中间有紫红斑纹。  
• 花小而精致, 散发淡香。

• 花序从叶丛中抽出细长花序干。  
• 伞形花序, 辐射状小花梗。  
• 果实初期绿色, 成熟红色。

**药材性状 (饮片)**  
呈类圆形或椭圆形薄片, 表面灰黄色, 切面黄绿色或黄白色, 质坚实, 气香, 味苦、辛。

① 挖出植株 ② 剪去地上部分 ③ 洗净泥土 ④ 切开根茎 ⑤ 切取块根 ⑥ 成品 (郁金)

主产地: 云南文山、红河、西双版纳、广西、四川、贵州等地。

• 块根表面灰褐色, 有细皱纹。  
• 切面黄绿色或黄白色, 角质样, 内皮层环明显。  
• 气香浓郁, 味苦、辛。

温郁金 姜黄

• 温郁金 (本品): 块根纺锤形, 切面黄绿色。  
• 姜黄: 根茎呈圆柱形, 切面棕黄色。

**《神农本草经》原文摘要**  
郁金, 味辛, 寒。主心腹邪气, 诸疸瘕瘕, 脐下血痼, 痛中, 利小便, 止痛。久服轻身, 益气力, 延年。

**来源**  
本品为姜科植物郁金 *Curcuma wenyujin* Y. H. Chen 的干燥块根。

**性味归经**  
味辛、苦, 性寒。归心、肝、胆经。

**功效**  
行气解郁, 活血止痛, 清心凉血, 利胆退黄。

**主治**  
胸胁胀痛, 心痹抑郁, 惊悸失眠, 热病邪入心包, 血瘀气滞经闭痛经, 跌扑肿痛, 黄疸尿赤。

**用法用量**  
煎服: 3~10g。  
外用: 适量, 研末调敷或煎汤洗。

郁金

- 全景构图与株型 (Overall Habit) ——【核心绘图抓手: 巨型叶片与穗状花序】: 多年生大型草本植物, 株高可达1米甚至更高。它最醒目的视觉抓手是那宽大、长圆状披针形的绿色巨型叶片 (形似芭蕉叶), 叶片通常4~6片丛生, 叶柄长而粗。在生长的后期, 会从叶丛中抽出一个细长的伞形花序干, 顶端长着一团密集、如同“粉色小宝塔”或“火炬”一样的穗状花序。花序顶部是美丽的粉红色或紫红色苞片, 里面包裹着细小的黄色唇形花朵。

- **地下部分特写（Underground Structure）——【核心抓手：莖术状根茎与纺锤形块根】：** 这是识别姜黄属植物的关键。挖开红土，可以看到发达、形似姜的【莖术状根茎】，根茎肥大，切面通常是黄绿色。在这些大根茎下面，又生出许多细长的侧根，这些侧根的顶端膨大，形成一个个不规则的纺锤形或卵圆形的【肉质块根】。这些膨大的侧根块根，就是我们所说的郁金药材。它们在生时表面灰褐色，质地非常坚实。
- **生态环境背景（Ecological Background）：** 背景可设置为初夏时节，云南、广西、四川等湿润亚热带地区的山坡、平原或林下，或者人工培植的郁金园中。在阳光透过叶片洒下、红土湿润的夏日杂草背景中，那挂着粉色“火炬”和地下发达块根结构的巨大植物，展现出一种蓬勃、充满异域色彩的姜科生机。



# 薤白

(中药材)

别名：薤、野薤、山蒜

学名：Allium macrostemon Bunge

科属：葱科 (Amaryllidaceae)

葱属 (Allium)

药用部位：地下鳞茎

采收期：夏季茎叶枯萎后

采收：除去须根，洗净，鲜用或干燥。

**生态习性**

多年生草本，喜冷凉湿润气候，耐寒，耐旱，耐瘠薄。常生于山坡、路旁、田野、溪谷旁等处。分布于全国大部分地区。

**特征概述**

① 叶狭长，半圆柱状，中空，表面有细纵条纹，基部鞘状。

② 地下具小鳞茎，卵球形，直径约1~2cm，外膜白色或带紫色。

③ 花茎自叶丛中抽出，细长直立。

④ 顶生伞形花序，球状，花小而密集。

⑤ 花被片6枚，淡紫色或粉红色。

**药用价值**

性微温，味辛，苦。归心、肺经。通阳散结，行气导滞。用于胸痹心痛，脘腹痞闷，痛经，产后腹痛，跌打损伤，痈肿作痛等。

**主要分布**

主产于河北、山西、山东、江苏、安徽、河南、湖北、四川、贵州、云南等地。

**1. 生境与分布**

生于海拔200~2000米的山坡、路旁、荒地、田野、溪谷旁、林缘等处。

**2. 植株全貌 (开花期)**

**3. 叶片特写 (韭菜状)**

- 叶狭长，半圆柱状，中空。
- 表面有细纵条纹。
- 基部鞘状，叶色鲜绿，质地较脆。

**4. 花序特写 (伞形花序)**

- 伞形花序顶生，球状。
- 花小而密集，呈粉紫色。
- 花梗细长，直立，中空。

**5. 花朵特写**

- 花被片6枚，淡紫色。
- 雄蕊6枚，花药黄色。
- 花柱细长，柱头略膨大。

**6. 地下鳞茎特写 (药材)**

- 鳞茎卵球形，直径1~2cm。
- 外膜白色或带紫色，膜质。
- 肉质鳞片肥厚，具有辛辣气味。

**7. 地下部分及加工过程**

① 挖出植株 ② 去除须根和泥土 ③ 洗净鳞茎 ④ 切片 ⑤ 干燥 ⑥ 成品

**药材性状 (饮片)**

呈类圆形或椭圆形薄片，表面类白色或淡棕色，质脆，易折断，气微，味辛。

**8. 显微特征 (鳞茎横切面)**

表皮 皮层 维管束 内皮层

- 外层表皮细胞一列，外被角质层。
- 皮层薄壁细胞，含淀粉粒。
- 维管束散生，呈点状分布。
- 内皮层细胞含草酸钙结晶。

**9. 主要成分**

硫化丙烯 (allicin) 苊素 (allin)

- 主要成分为含硫化合物。
- 具有抗菌、抗炎、扩张血管等作用。

**10. 主要产地**

主产地：河北、山西、山东、江苏、安徽、河南、湖北、四川等地。

**11. 性状鉴别要点**

- 鳞茎小而圆，外膜白或紫，辛辣气味。
- 切面乳白色，质脆，易断。
- 微辛辣味，嚼之有蒜臭。

**12. 易混品鉴别**

野薤 薤

- 鳞茎小，单生或2~3枚。
- 叶细，花紫。
- 鳞茎大，成簇。
- 叶中空，花白色。

**《神农本草经》原文摘要**

薤，味辛，温。主心腹邪气，结痛痼病，破冷气，散痼瘤，开胃下气，化谷食。

**来源**

本品为葱科植物薤 (Allium macrostemon Bunge) 的干燥鳞茎。

**性味归经**

性温，味辛，苦。归心、肺经。

**功效**

通阳散结，行气导滞。

**主治**

胸痹心痛，脘腹痞闷，痛经，产后腹痛，跌打损伤，痈肿作痛。

**用法用量**

煎服：3~10g。外用：适量，捣敷或调敷。

## 薤白

- **全景构图与株型 (Overall Habit)** ——【核心绘图抓手：韭菜/葱状细叶与地下小鳞茎】：多年生草本植物，株高约 **30~70 厘米**。最醒目的视觉抓手是它的叶片：叶子非常狭长，呈半圆柱状或线形（极像我们平时吃的野葱、细韭菜或小葱），中空，表面有细纵条纹。
- **地下部分与花序特写 (Underground & Flower Morphology)** ——【核心抓手：小球状鳞茎与粉紫色伞形花序】：地下生有肉质的、卵球形的小鳞茎（也就是薤白



药材本体），直径约 1~2 厘米，外面包裹着白色或带紫色的膜质鳞皮。初夏时，从叶丛中抽出一根直立、细长的花葶，顶端长着一团圆球状的伞形花序。花朵非常细小而密集，花被片 6 片，呈现淡紫色或粉红色，像一朵挂在细秆顶端、毛茸茸的粉紫色小绒球。

- 生态环境背景（Ecological Background）：背景可设置为春末夏初的荒地、山坡、路旁、田野或溪谷旁的草丛中。在微风吹拂的绿色野草背景下，薤白那纤细的、带着粉紫色小球花序的茎秆轻轻摇曳，泥土下隐约露出一颗颗白嫩、饱满的卵圆形小蒜头。

| 识别维度 | 薤白 (Allium macrostemon) | 野葱 (普通野葱/山葱等)    |
|------|-------------------------|------------------|
| 鳞茎聚散 | 单生，一颗一颗独立生长             | 丛生，几颗常常粘连在一起     |
| 鳞茎形状 | 圆球形、卵圆形（像小蒜头）           | 纺锤形、修长卵形（像小洋葱）   |
| 鳞茎外皮 | 白色/淡紫色膜质，光滑易碎           | 红褐色/黄褐色，常老熟为网状纤维 |
| 叶片截面 | 半圆柱形，单侧有纵沟              | 正圆柱形，中空圆筒状       |
| 花序特征 | 花序中密生暗紫色的小珠芽（硬疙瘩）       | 花序非常干净，只有花，无珠芽   |

# 补骨脂

## (中药材)

别名：破故纸、补骨脂子  
学名：Psoralea corylifolia L.  
科属：豆科 (Fabaceae)  
补骨脂属 (Psoralea)

药用部位：干燥成熟果实  
采收期：秋季果实成熟时采收。  
晒干或低温干燥。

### 形态特征

- 多年生草本，或一二年生。
- 茎直立，多分枝，具明显棱角，被黑褐色腺点。
- 叶单生，互生；叶片宽卵形，先端钝圆，基部近心形；边缘有不规则粗锯齿；两面密被细柔毛，背面更密。
- 花期 6~8 月。头状花序腋生或顶生，花小而密集，花冠紫红色或白色。
- 果期 8~10 月，果实极小，为肾形小坚果，表面密布黑色腺点和细小网纹。

### 生长环境

喜温暖、阳光充足环境，耐旱、耐瘠薄。多生于山坡、荒地、路旁、田边、灌丛或林缘等地。

### 药用价值

味辛、苦，性温。归肾、脾经。  
补肾助阳，纳气平喘，温脾止泻，外用消风祛湿、杀虫止痒。  
主治肾阳虚寒、腰膝冷痛、阳痿遗精、虚寒泄泻、久泻不止、白痢风、斑秃、疥癣等。

#### 1. 生境环境

多生于山坡、荒地、路旁、田边、灌丛或林缘等阳光充足处。

#### 2. 植株全貌 (花期)

#### 3. 茎与叶特写

- 叶单生，宽卵形，边缘粗锯齿。
- 茎具明显棱角，密生黑褐色腺点。
- 两面被细柔毛，背面更密。

#### 4. 花序特写 (头状)

- 头状花序，腋生或顶生。
- 花小而密集，紫红色或白色。
- 花期 6~8 月。

#### 5. 花特写

- 花冠蝶形，花小。
- 紫红色或白色。
- 花萼具细毛。

#### 6. 果实特写 (成熟)

- 果期 8~10 月。
- 果实极小，为肾形小坚果。
- 表面具刺状突起及黑色腺点。

#### 7. 果实与种子特写

- 肾形或扁肾形小坚果，长约 1~1.5 mm。
- 表面密布突起小网纹与黑色腺点。
- 质坚硬，断面黄白色，种仁油润。

#### 8. 地下部分 (根系)

- 主根粗壮，黄棕色，向下深长直伸。
- 侧根多，细长，分布广。
- 根上有横生根状茎。

#### 药材性状 (饮片)

呈肾形小颗粒，表面黑褐色或黑色，有细小网纹及黑色腺点。质坚硬，气微，味微苦。

#### 9. 生长周期示意

出苗期 幼苗期 生长期 开花期 结荚期

#### 10. 分布区域

主产于陕西、山西、浙江、河南、湖北、四川、湖南、江西等地。

#### 11. 易混品鉴别

##### 补骨脂

- 表面密布黑色腺点和网纹。
- 形状为肾形。

##### 胡芦巴

- 表面光滑或微皱。
- 形状多为三角形。

#### 12. 采收与加工

采收 晒干或阴干 脱粒去杂

补骨脂

- 全景形态与生态 (Overall Habit & Habitat)：** 植株高约 60–150 厘米。茎直立，枝条有明显棱角和黑褐色腺点。叶单生，呈宽卵形，边缘有不规则的粗锯齿。夏秋季节开花，花小，呈紫红色或白色，密集成头状的花序。
- 地下与果实特写 (Fruit & Seed Morphology) ——【核心抓手：小肾形/扁颗粒与黑色腺点】：** 采收期多在秋季果实成熟时。最核心的视觉抓手是其极小的黑色或黑褐色肾形小果实，表面密布突起的细小网纹与黑点。



# 三棱

## (黑三棱)

### (中药材)

别名：水三棱、野三棱、黑三棱  
学名：Sparganium stoloniferum Buch.-Ham.  
科属：三棱科 (Sparganiaceae)  
三棱属 (Sparganium)

药用部位：干燥块茎  
采收加工：秋、冬二季采挖，  
剥去须根及黑褐色外皮，晒干。

**生态习性**  
多年生挺水或沉水草本。  
生于池塘、湖泊、沟渠、河边浅水处，  
喜温暖湿润环境。  
适应性强，分布广泛。

**特征概述**  
① 叶片基部三棱形，上部扁平，  
背面中脉隆起成脊。  
② 花单性，穗状排列，  
上部雄花序黄褐色，  
下部雌花序绿色。  
③ 果实倒卵形，顶端具喙。  
④ 块茎肉质，呈三棱状，  
外色黑褐色，内肉黄白色，  
气味特异。

**药用价值**  
味辛、苦，性平。  
归肝、脾经。  
破血行气、消积止痛。  
用于症瘕积聚、胸腹刺痛、  
跌扑损伤、癥瘕、瘀血肿痛。

**主要分布**  
主产于江苏、浙江、  
江西、湖北、安徽、湖南、  
四川、山东等地。

#### 1. 生境与分布

生于池塘、湖泊、沟渠、河边  
浅水处。

#### 2. 植株全貌 (花穗)

#### 3. 茎的特写 (圆柱形)

- 直立，圆柱形，光滑无毛。
- 颜色深绿色，下部沉水或  
埋于泥中。

#### 4. 叶片特写 (对生叶)

- 线形，基部三棱形，上部扁平。
- 长40~90cm，宽0.7~1.5cm。
- 背面中脉隆起成脊。

#### 5. 花序特写 (穗状花序)

- 头状花序排列成穗状。
- 上部雄花序黄褐色，  
下部雌花序绿色。

#### 6. 花的特写 (单性花)

- 单性花，雌雄同株。
- 花被片膜质或匙形，3~6mm。

#### 7. 果实特写 (具喙)

- 倒卵形果实，长的6~8mm。
- 成熟时红褐色或灰棕色，具3~4棱。
- 顶端具宿存针状花柱 (喙)。

#### 8. 种子特写

- 果实内含1粒种子。
- 种子卵圆形，表面有纵棱。

#### 9. 地下块茎及加工过程

① 采挖 ② 去须根及泥沙 ③ 剥去外皮 ④ 清洗 ⑤ 切块晒干 ⑥ 干燥成品

#### 药材性状 (饮片)

- 类三棱形或圆锥形，表面黑褐色或灰褐色。
- 质硬而脆，断面类白色或黄白色，粉性。
- 气微，味微辛、苦。

#### 10. 显微特征 (根横切面)

- 根茎横切面近三角形。
- 皮层较宽，薄壁细胞多含淀粉粒。
- 维管束呈散在分布。

#### 11. 主要成分

- 主要成分为三棱皂苷、谷甾醇等。
- 还含有淀粉、黄酮类、酚类等成分。

#### 12. 主要产地

主产于江苏、浙江、江西、湖北、  
安徽、湖南、四川、山东等地。

#### 13. 性状鉴别要点

- 类三棱形或圆锥形，有3棱。
- 表面黑褐色，断面黄白色，粉性。
- 气微，味微辛、苦。

#### 14. 易混品鉴别

| 三棱 (本品) | 莪术     | 荆三棱    |
|---------|--------|--------|
| 表面黑褐色。  | 断面黄褐色。 | 表面灰褐色。 |
| 断面类白色。  | 气味芳香。  | 断面灰白色。 |
| 形似三棱。   | 形不呈三棱。 | 棱较钝。   |

#### 15. 《神农本草经》原文摘要

三棱，味辛，平。  
主治：症瘕积聚，心腹疼痛，  
寒热结，邪气不散。  
破坚积，消宿食。

#### 16. 功效与主治

功效：破血行气，消积止痛。  
主治：症瘕积聚，胸腹刺痛，跌扑损伤，  
瘀血肿痛，食积腹痛等。

#### 17. 现代药理研究

具有抗肿瘤、抗凝、抗血小板聚集、  
镇痛、抗炎等作用。

#### 18. 用法用量

内服：3~10g，煎汤；  
或入丸、散。  
外用：适量，研末调敷。

三棱（黑三棱），它是“活血化瘀药”中功用卓著的“破血行气、消积止痛第一猛药”（常与莪术相须为用，号称“三棱莪术，破血消积之双璧”）。它药性辛、苦，平。归肝、脾经。

原植物全貌形态（Plant Morphology）：

- 茎（Stem）：植株高 50–100 厘米，直立，粗壮，呈圆柱形，表面为深绿色，光滑无毛，下部沉水或埋于泥中。



- **叶 (Leaves)：** 挺水生长，叶片呈狭条形（线性），长 40–90 厘米，宽 0.7–1.5 厘米，正面深绿色，背面淡绿色；最显著的特征是叶片基部三棱形，上部扁平，全缘，中脉在背面明显隆起形成一条锐利的脊。
- **花 (Flowers)：** 5–7 月开花。单性花，雌雄同株；头状花序排成穗状或再组成圆锥花序，雄花序位于上部（呈黄褐色），雌花序位于下部（呈浅绿色）；花被片 3–6 厘米，呈膜质或匙形。
- **果实 (Fruits)：** 7–9 月结果。倒卵形或核果状果实，长约 6–8 毫米，成熟时呈红褐色或灰棕色，顶端有宿存的针状花柱（喙），具 3–4 棱。

#### **根部与用药部位 (Roots & Medicinal Part)：**

- **地下块茎形态：** 块茎生长于泥水中，呈倒圆锥形、类球形或肉质三棱块状，直径 2–4 厘米，基部有多数须根。
- **块茎颜色：** 鲜采时外皮呈黑褐色或灰褐色，质地较软，肉质部分为黄白色。
- **用药部位：** 以其秋、冬二季采挖的干燥块茎入药。采挖后削去须根及黑褐色外皮（老药工称为“削皮三棱”），晒干。

# 莪术

## (中药材)

别名：莪术、莪根、莪根木、通经木。  
学名：Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe  
科属：姜科 (Zingiberaceae)  
莪术属 (Curcuma)

药用部位：根茎 (主块茎)

采收加工：秋、冬二季采收，除去须根及泥沙，洗净，晒干或低温烘干。

生态习性  
喜温暖湿润气候，怕寒冷。灌木或草茎、林下湿地、沟边、河岸及田间湿地。适应性强，耐阴湿，不耐旱涝，忌积水。

特征概述  
① 假茎直立，基部淡紫红色。  
② 叶长披针形，中脉两侧常紫红色斑纹。  
③ 根茎呈卵圆形或球形，称“莪术块”。  
④ 穗状花序从根茎抽出，苞片紫红色。  
⑤ 花黄色，唇瓣近圆形，顶端微凹。

药用价值  
味辛、苦，性温。  
归肝、脾经。  
行气破血，消积止痛。  
用于血滞经闭，症瘕痞块，跌扑损伤，食积腹胀等。

主要分布  
主产于广西、云南、四川、广东、福建、湖南等地。以广西产量最大，质量佳。

1. 生境与分布

生于山坡林下、沟边、河岸湿地、田间湿地等。喜温暖湿润气候。

2. 植株全貌 (花前)

3. 假茎特写 (基部紫红色)

• 假茎直立，叶柄基部相互包裹成。  
• 基部常带淡紫红色，光滑无毛。

4. 叶片特写 (对生叶)

• 长圆状披针形，长30~60cm，宽10~20cm。  
• 中脉两侧常有紫红色斑纹，宽10~20cm。  
• 背面淡绿色，被无毛。

5. 花序特写 (先花后叶)

• 穗状花序从根茎抽出，长10~20cm。  
• 上部苞片粉红色或紫红色。  
• 下部苞片淡绿色。

6. 花朵特写

• 小花黄色，唇瓣近圆形。  
• 顶端微凹。

7. 果实特写

• 蒴果卵状椭圆形，长6~8mm。  
• 成熟时灰白色或淡黄褐色。  
• 顶端有宿存花柱 (喙)。

8. 种子特写

• 果内含多数种子。  
• 种子棕褐色，具白色假种皮。

9. 地下部分及加工过程 (根茎)

① 采收 ② 去须根及泥沙 ③ 蒸或煮至透心 ④ 切片或整块 ⑤ 晒干或低温烘干 ⑥ 干燥成品

10. 药材性状 (饮片)

• 主块茎呈卵圆形、圆锥形或块状。  
• 表面灰黄色或灰棕色，有皱纹及须根痕。  
• 断面淡黄褐色，灰蓝色或黄褐色，质坚实。  
• 气香，味辛、苦，微辛辣。

11. 显微特征 (根茎横切面)

• 木栓层为多列细胞。  
• 皮层有薄壁细胞及含油细胞。  
• 维管束散在，呈放射状。  
• 髓部薄壁细胞多，含淀粉粒。

12. 主要成分

莪术酮 莪术醇

• 主要成分为挥发油，含莪术酮、莪术醇等。  
• 另含姜黄素、淀粉、树脂等成分。

13. 主要产地

主产于广西、云南、四川、广东、福建、湖南等地。以广西产量最大，质量佳。

14. 性状鉴别要点

• 表面灰黄色或灰棕色，有皱纹及须根。  
• 断面淡黄褐色、灰蓝色或黄褐色。  
• 气香，味辛、苦，微辛辣。

15. 易混品鉴别

莪术 (本品) 郁金 姜黄

• 主块茎呈卵圆形、圆锥形或块状。  
• 块根细长纺锤形。  
• 根茎节状分枝，须根多。  
• 断面灰蓝色或黄褐色。  
• 断面黄褐色。  
• 断面鲜黄色。

16. 《神农本草经》原文摘录

莪术，味苦，平。  
主心腹邪气，破积聚，除痞满，通水血，破坚癥，积聚寒热，消痞满，利五脏。

17. 功效与主治

功效：行气破血，消积止痛。  
主治：血滞经闭，症瘕痞块，跌扑损伤，食积腹胀，脘腹疼痛等。

18. 现代药理研究

具有抗肿瘤、抗炎、抗血小板聚集、镇痛、保肝、促进消化等作用。

19. 用法用量

内服：6~10g，煎汤；或入丸、散。  
外用：适量，研末调敷。

莪术，是“活血化瘀药”中功用卓著的“破血行气、消积止痛第一猛药”。它药性辛、苦，温。归肝、脾经。看家本领是“行气破血、消积止痛”。

原植物全貌形态 (Plant Morphology)：

- **茎 (Stem)：** 无地上主茎，由假茎 (叶柄基部相互包裹而成) 直立生长，高 80–150 厘米，假茎基部常带有淡紫红色，光滑无毛。

- **叶 (Leaves) :** 叶片 4-7 片，呈长圆状披针形或狭椭圆形，长 30-60 厘米，宽 10-20 厘米；叶片正面深绿色，最显著的特征是沿着中脉两侧常带有明显的淡紫色 / 紫红色斑纹，叶片背面淡绿色，被无色柔毛；叶柄长约为叶片的一半。
- **花 (Flowers) :** 5-7 月开花，先花后叶或花叶同时抽出。穗状花序从根茎处单独抽出，长 10-20 厘米；苞片上部呈靓丽的粉红色或紫红色，下部苞片呈淡绿色；小花呈黄色，唇瓣近圆形，顶端微凹。
- **果实 (Fruits) :** 7-9 月结果。蒴果呈卵状椭圆形，成熟时呈灰白色或浅黄褐色，被柔毛；内含多数棕褐色种子，带有白色假种皮。

**根部与用药部位 (Roots & Medicinal Part) :**

- **地下根茎形态:** 地下根茎极其发达，主根茎呈卵圆形、圆锥形或蓬锤形（俗称“莪术蛋”），周围生出多条肉质须根，须根末端常膨大成纺锤形的块根（即“郁金”）。
- **根茎颜色:** 鲜采时外皮呈灰黄色或灰棕色，切开内部肉质呈淡黄绿色、灰蓝色或黄褐色，富含挥发油。
- **用药部位:** 以其秋冬季节茎叶枯萎时采挖的干燥主块茎（主根茎）入药。采挖后除去须根及泥沙，蒸或煮至透心，晒干或低温烘干。

| 对比维度     | 莪术（主根茎）              | 郁金（块根）                |
|----------|----------------------|-----------------------|
| 植株上的生长位置 | 地下中心大本营（地上茎叶正下方的主块茎） | 须根末端的“小吊坠”（悬挂在细须根脚尖上） |



|         |                                                            |                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 生长形态与数量 | 体型较大，呈 <b>蓬锤形、卵圆形</b> （像小菠萝/手榴弹）；一株通常只有 <b>1-2个</b> 。      | 体型较小，呈 <b>纺锤形、小橄榄状</b> （两头尖）；一株须根下可挂 <b>多个</b> 。              |
| 切面颜色与质地 | 切面呈 <b>灰蓝色、黄绿色或墨绿色</b> ；质地 <b>坚重如石</b> ，极难折断，呈半透明角质样（蜡质感）。 | 切面多呈 <b>鲜艳的金黄色、橙黄色或灰棕色</b> ；质地 <b>较坚硬</b> ，但相对易打破，微显粉性或角质样。   |
| 气味与口感   | 具 <b>特异浓郁的樟脑/生姜样芳香气</b> ；味 <b>辛辣而苦</b> 。                   | 香气较微弱或微香；味 <b>微苦、辛</b> ，口 <b>嚼微有凉爽感</b> 。                     |
| 性味与归经   | <b>辛、苦，温</b> 。归肝、脾经。                                       | <b>辛、苦，寒</b> 。归肝、心、肺经。                                        |
| 功效      | <b>行气破血，消积止痛</b>                                           | <b>活血止痛，行气解郁，清心凉血，利胆退黄</b>                                    |
| 药力与临床   | <b>药力猛烈（重型破壁）</b> ：主攻 <b>顽固血瘀、腹部包块（症瘕积聚）、肿瘤、严重食积</b> 。     | <b>药力较缓和（解郁清热）</b> ：主攻 <b>肝气郁结之胸胁胀痛、心气郁结/痰火扰心之神昏癫狂、血热吐衄</b> 。 |

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 侧<br>重 |  |  |
|--------|--|--|