

禹余粮.....	2
芒硝	4
滑石	6
石菖蒲.....	8
菊花	9
人参	10
党参	11
天门冬.....	12
甘草	13
地黄	15
白术	17
菟丝子.....	18
牛膝	20
土牛膝.....	22
柴胡	24
麦门冬.....	26
益母草.....	28
独活	30
木香	33
山药	36
薏苡仁.....	38
泽泻	39
远志	40
龙胆	42
细辛	43

巴戟天.....	45
川芎	46
黄连	47
黄芪	49
肉苁蓉.....	51
防风	52
续断	54
决明子.....	55
丹参	57
茜草	58
五味子.....	59
旋覆花.....	61
蛇床子.....	62
茵陈	63
王不留行	64
肉桂树.....	66
松脂	67
辛夷花.....	68
杜仲	69
阿胶	70
牡蛎	70
茯苓	72
覆盆子.....	73
天麻（赤箭）	75
玄参	77

- **全景构图与产状（Overall Habit & Geological Occurrence）——【核心绘图抓手：结核状块体与层状剥落结构】：** 矿体呈不规则的结核状、块状或椭圆形重石。最核心的视觉抓手是它的天然层状剖面：矿石表面粗糙不平，常由多层不同颜色的矿物一圈圈包裹而成（像木头年轮或洋葱皮），最外层为硬壳，里面常有腔穴。

- **矿物结构与断面特写（Internal & Cross-Section Morphology）——【核心抓手：红棕色外壳与腔内黄棕色粉末】：**
- **外壳与层理：** 外壳呈深红棕色、暗褐色或灰褐色，质地坚硬。
- **腔穴与粉末（空心结构）：** 砸开矿石后，内部常呈**空心腔穴状**，腔内沉积有极细腻的黄棕色/黄褐色土状粉末（即“余粮”粉）；也有的内部呈多层紧密重叠的石层。
- **生态与地质环境背景（Geological Background）：** 背景可设置为**湿热多雨的红土高原或沉积岩采矿区（如江苏、浙江、四川等地）**。在红土层或溪流断崖的岩层缝隙中，隐约嵌着一整块质地沉重、带红棕色锈斑的结核状余粮石块，旁边附着松散的黄棕色土状矿粉。

芒硝

(中药材)

【别名】玄明粉、风化硝、皮硝。

【来源】为硫酸盐类矿物芒硝(Mirabilite)经加工精制而成的结晶体。

【性味】味咸、苦，性寒。

【归经】归胃、大肠经。

【功效】泻热通便，润燥软坚，清火消肿。

【主治】用于实热便秘，目赤肿痛，咽喉肿痛，痈肿疮毒。

【用法用量】6~15g，冲服，外用适量。

【注意事项】脾胃虚寒及孕妇慎用。

《神农本草经》原文

芒硝，味咸，寒。主消渴，利小便，润五脏，通关节，软坚散结，散恶血，去积块，化痰涎，利大肠。

1. 芒硝原矿 (产地: 内蒙古、河北等地)



芒硝为天然含硫酸钠的矿物，常与石盐、石膏等共生。

2. 原矿形态 (块状或晶体集合体)



原矿多呈块状、板状或菱形晶体集合体，半透明至透明，具玻璃光泽。

3. 晶体特征 (菱形或板状)




单晶呈菱形、板状或厚板状，边缘整齐，透明或半透明。

4. 加工过程 (精制提纯)



原矿经溶解、过滤、蒸发、结晶、干燥等工序制成。

5. 饮片性状 (净芒硝)



呈无色透明的结晶或结晶性颗粒，大小不一，质脆易碎。

6. 断面特征




断面平坦，玻璃样光泽，可见层理或条纹。

7. 性质鉴别




易溶于水，水溶液呈碱性，味咸苦而凉。

8. 显微特征



显微镜下呈菱形或长方形，具双折射现象。

9. 不同规格对比



根据炮制用途不同，分为大颗粒、中颗粒、细颗粒等规格。

10. 与食盐 (氯化钠) 对比

芒硝 (硫酸钠)



食盐 (氯化钠)



外观：芒硝晶体较大，透明；食盐颗粒较小，白色。

溶解度：芒硝易溶于水；食盐溶解较慢。

味道：芒硝味咸苦而凉；食盐味咸而无苦味。

用途：芒硝为中药材；食盐为食用盐。

11. 产地分布



主产于内蒙古、河北、河南、山东、江苏、湖北、四川等地。

芒硝

- 全景构图与产状 (Overall Habit & Geological Occurrence) ——【核心绘图抓手：盐湖边缘结晶板块与针状晶簇】：矿体在盐湖岸边呈透明晶莹的结核块状或厚板状晶体。最核心的视觉抓手是它的晶体形态：无色透明的斜方晶系或单斜晶系柱状晶体，簇集在一起如一簇簇晶莹剔透透冰晶或白霜针芒，在阳光下熠熠生辉。

- **矿物结构与晶体特写 (Internal & Crystal Morphology) ——【核心抓手：无色透明六棱柱与风化白粉】：**
- **晶体形态：** 无色透明或玻璃光泽的柱状、针状结晶，质地极脆。
- **风化现象（玄明粉预兆）：** 暴露在干燥空气中极易失去结晶水，表面迅速覆盖一层白色的粉末（即风化现象）。
- **生态与地质环境背景 (Geological Background)：** 背景可设置为干燥少雨的西北盐湖或盐碱荒漠（如青海、新疆、四川盐井）。在强烈的阳光与蓝天倒影下，平静深邃的盐湖边缘结满了雪白晶莹的芒硝晶体，如雪原覆地。

滑石

(矿石)

【别名】滑石、飞滑石、画石、滑头石。

【来源】为硅酸盐类矿物滑石族滑石组的滑石(Talcum)。主含水硅酸镁。

【性味】甘、淡、寒。

【归经】脾、胃、膀胱经。

【功效】利尿通淋、清热解暑、祛湿敛疮。

【主治】用于热淋、石淋、暑热烦渴、湿热带下、湿疹、癣子等。

【用法用量】9~15g，包煎。

【注意事项】脾胃虚寒者慎用。

《神农本草经》原文

滑石，味甘，寒。主身热不去，暑热，解食，利小便，益气，入胃中，除痹热，止渴，润五脏。

1. 原矿外观 (块状)



多呈不规则的扁平块状或多角形，颜色多为类白色、淡黄白色或微带有一点淡淡的青灰色。

2. 蜡状光泽 (表面特写)



表面泛着一一种像摸了蜡、或者像摸了肥皂一样的细腻油润光泽(蜡状光泽)。

3. 断面特征 (层状结构)



断面呈层状结构，极易沿层面剥离成薄片。

4. 软度特征 (指甲可划动)




硬度为1，比指甲(约2.5)要软，用指甲即可轻易划动。

5. 手感特征 (滑腻感)



用手触摸有明显的滑腻感，如同涂了一层肥皂或油脂。

6. 薄片特征 (透明一半透明)



可剥离成薄片，薄片具弹性，透明至半透明。

7. 粉末特征 (细腻滑腻)




粉末细腻柔滑，有滑腻感，不扬尘。

8. 加水特征 (悬浮性)




加水摇匀后呈悬浮状，静置后沉降缓慢。

9. 加酸特征 (不反应)



滴加稀盐酸不发生气泡，无化学反应。

10. 紫外荧光 (无荧光)



在长波或短波紫外光下均无荧光反应。

11. 常见颜色对比



颜色以白色、淡黄白色为主，可带青灰、绿色、微红等色调。

12. 不同形态对比



形态多样：块状、片状、板状、碎块状等。

13. 滑石与相似矿物对比 (肉眼鉴别)

	滑石	石膏	方解石
光泽	蜡状光泽	玻璃光泽	玻璃光泽
硬度	1 (极软)	2	3
手感	滑腻	较滑	无滑腻感
滴酸 起泡	不反应	不反应	起泡

14. 产地分布



主产辽宁、河北、山东、四川、广西、湖北等地。

滑石

- 全景构图与产状 (Overall Habit & Geological Occurrence) ——【核心绘图抓手：致密块状片层与柔和光泽】：矿体在露天矿山或岩层缝隙中呈白色、浅绿色或淡黄色的致密块状、鳞片状集合体。最核心的视觉抓手是它的晶体与光泽：呈扁平的板状或鳞片状结构，表面散发着如同珍珠或油脂般的柔和光泽，半透明至不透明。

- **矿物结构与断面特写 (Internal & Cross-Section Morphology) ——【核心抓手：薄片可剥离与细腻白粉】：**
- **结构特征：** 质地极软（莫氏硬度仅为 1），用指甲就能轻松划出痕迹。
- **解理与粉末：** 沿片层极易剥离成柔韧的薄片；研磨后形成**极其细腻、手触如油脂般滑爽**的纯白色粉末。
- **生态与地质环境背景 (Geological Background)：** 背景可设置为**大型露天采矿场或开采断崖**（如辽宁海城、广西、山东等滑石主产区）。在白色的矿岩背景下，巨大的白中带浅绿色的滑石矿块堆叠在一起，在阳光下泛着温润的油脂与珍珠光泽。

石菖蒲

(中药材)

别名：水菖蒲、九节菖蒲、云根
学名：Acorus tatarinowii Schott
科属：天南星科 (Araceae)
菖蒲属 (Acorus)
药用部位：干燥根茎
采收期：春、秋二季均可采挖，
除去须根，晒干或低温干燥。

形态特征

• 植株：

多年生常绿草本，高20~50cm。
根茎横卧，节明显。
叶剑形，深绿色，线形至线状剑形，
长度约30~50cm，宽0.5~1.5cm，
基部鞘状抱合。
叶揉后有特殊芳香气味。

• 花：

花序为肉穗花序，佛焰苞绿色。
花序圆柱形，直立于叶丛中，
长3~10cm。
花小，密生于花序轴上。


• 果实：

浆果，球形，成熟时橙红色。
果实少见，药用不取。

生态环境

生于溪边、池沼、水田、石缝湿地，
或林下湿润处。喜温暖湿润环境，
耐阴湿，忌干旱。
在山涧溪流旁、岩石缝、
沼泽地常成丛生长。

7. 生长季节变化



早春萌芽

叶片生长期

花期 (夏初)

成熟期

8. 分布区域



主产于四川、浙江、江西、湖北、
贵州、云南、福建等地。

1. 生境照片



生长于清幽的溪流旁、石缝湿地，
或林下潮湿处，常成丛分布。

2. 植株全貌 (花期)



春末夏初抽出生花序，肉穗花序
直立于叶丛中，叶片深绿色，
基部抱合。

3. 叶片特写 (剑形)



- 叶片剑形，质地较厚，先端渐尖。
- 基部叶鞘相互重叠抱合。
- 揉搓后有独特芳香气味。

4. 根茎特写 (药材部位)



- 根茎横卧，呈扁圆柱形，
常有分枝。
- 节明显，环节密集，节上
留有密集的叶痕（叶基痕），
似竹节状。
- 生有许多须根。
- 断面类白色或淡黄色，
气芳香，味辛、微苦。

5. 根茎横切面




- 切面类白色，质地较硬。
- 维管束呈点状散在。

6. 药材形态 (干燥品)



- 干燥根茎呈扁圆柱形，长短不一。
- 表面棕褐色，节明显，节上有多数
叶痕及须根痕。
- 质硬而脆，易折断，气芳香。

9. 主要成分



10. 采收与加工



采挖

洗净晒干或低温干燥

11. 性味归经

辛、苦、温。
归心、胃经。

12. 功效

开窍豁痰，醒神益智，
化湿开胃。

13. 主治

神昏癫痫，惊悸健忘，
眩晕耳鸣，湿浊中阻，
胸闷不饥。

14. 常用配伍

配远志、茯苓：化痰开窍。
配木香、砂仁：化湿开胃。
配郁金、牛黄：清心开窍。

15. 用法用量

煎服：3~9g。
外用：适量，煎水洗或
研末敷患处。

石菖蒲

- 全景形态与生态 (Overall Habit & Habitat)：** 植株高约 20-50 厘米，叶片呈深绿色的剑形，基部相互重叠抱合，搓揉后有特殊的草本芳香。
- 根茎特写 (Rhizome Morphology)：** 根茎横卧在石缝泥水中，呈扁圆柱形，常有分枝。最核心的视觉抓手是其根茎上的“环节”：上面留有密集的叶痕（像竹节一样），并生有诸多须根。

菊花

(中药材)

别名: 黄花、白菊、杭菊、贡菊

学名: *Chrysanthemum morifolium* Ramat.

科属: 菊科 (Asteraceae)

菊属 (*Chrysanthemum*)

药用部位: 干燥头状花序

采收期: 秋季花蕾开时采收, 晒干或低温干燥。

形态特征

- 根与茎:** 多年生草本, 高60~150cm。根系发达, 须根多, 基部常木质化。茎直立, 圆柱形, 有纵条纹, 分枝多, 表面具短毛。
- 叶:** 互生, 叶片卵形至长卵形, 长4~10cm, 羽状浅裂或半裂, 边缘有粗锯齿, 上面绿色, 下面灰绿色, 有短毛。
- 花:** 头状花序单生或数个集生于茎顶, 直径2~6cm。总苞片多层, 绿色。舌状花多层, 白色、黄色或其他色; 管状花黄色。
- 果实:** 瘦果细小, 具冠毛。
- 花期:** 9~11月。
- 生境:** 喜光, 耐寒, 多栽培于山坡、田边、路旁等。全国大部分地区均有栽培。

1. 生境与分布

全国各地广泛栽培, 主产于安徽 (亳菊、滁菊)、浙江 (杭菊)、河南 (怀菊)、河北 (祁菊) 等地。

2. 植株全貌 (花期)

3. 叶片特写 (羽状浅裂)

- 叶互生, 羽状浅裂, 或半裂。
- 叶缘具粗锯齿。
- 上面绿, 下面灰绿色, 具短毛。

4. 头状花序特写 (白菊)

- 舌状花白色, 多层排列。
- 管状花黄色, 位于中央。
- 头状花序直径的3~5cm。

5. 头状花序特写 (黄菊)

- 舌状花黄色, 多层排列。
- 管状花黄色, 中央略隆起。
- 花型饱满, 层叠密集。

6. 花序剖面 (结构)

- 舌状花
- 管状花
- 总苞片
- 花托
- 外面为舌状花, 吸引昆虫传粉。
- 中央为管状花, 负责结实。
- 总苞片多层, 绿色。

7. 药材性状 (干燥花)

- 头状花序呈球形或扁球形, 直径2~4cm。
- 舌状花多层, 皱缩, 完整或略散离。
- 质轻, 气微, 味甘、微苦。

8. 不同品种 (花色与花型)

白菊 (杭菊) 黄菊 (贡菊) 滁菊 怀菊 祁菊

9. 主要成分

- 挥发油 (如龙脑、樟脑等)
- 黄酮类 (木犀草苷、芹菜素等)
- 绿原酸、鞣质、胆碱等

木犀草苷 (示例)

10. 产地分布

主产区: 安徽、浙江、河南、河北、山东、湖北、湖南、四川等。

11. 采收与加工

采收 摊晒 干燥成品

【性味归经】

味甘、苦, 性微寒。归肺、肝经。

【功效】

疏散风热、平肝明目, 清热解毒。

【主治】

风热感冒, 头痛眩晕, 目赤肿痛, 肝阳上亢, 高血压, 疮痈肿毒等。

【用法用量】

煎服: 6~15g。泡茶、入丸、散均可。

菊花

- 全景形态与生态 (Overall Habit & Habitat):** 植株高约 60–150 厘米。茎直立, 分枝多, 基部常木质化。叶互生, 羽状浅裂或半裂, 边缘有粗锯齿。深秋季节开花, 头状花序单生或数个集生于茎顶, 花色丰富 (药用多为白、黄两色)。

- 头状花序特写（**Flower Morphology**）——【核心抓手：舌状花与管状花】： 采收期多在秋季花盛开时。最核心的视觉抓手是其由外围多层舌状花（花瓣）与中央少数管状花（花心）组成的完整头状花序，干燥后依然保持层叠花形。

人参（上品）

【别名】黄参、神草、地精、海蔘、土精。

【来源】为五加科植物人参 *Panax ginseng* C. A. Mey. 的干燥根。

【性味】甘、微苦，微温。

【归经】归脾、肺、心经。

【功效】大补元气，补脾益肺，生津，安神益智。

【主治】用于体虚欲脱，肢冷脉微，脾虚食少，肺虚喘咳，津伤口渴，内热消渴，惊悸失眠，健忘眩晕。

【用法用量】3~9g。

【注意事项】不宜与藜芦同用。

1. 植株形态

叶（掌状复叶）

花（伞形花序）

果实（红色浆果）

2. 原药材（整体）

3. 原药材（近景）

4. 原药材（断面）

5. 原药材（细节特征）

芦头（茎痕）

横纹（环节明显）

须根（细长多分枝）

6. 原药材（不同规格）

特大支

大支

中支

小支

生晒参

7. 原产地与生境

8. 采收与加工（原始状态）

刚采挖的人参

去除泥土后的原参

自然晾晒（未加工炮制）

9. 易混品种对比

主根肥大呈纺锤形或圆柱形，具横纹及芦头，有多数须根。	主根较短粗，呈圆柱形，表面淡黄色，有横纹，须根较少。	细长条柱形，表面黄棕色，纹理细密，无芦头，须根少。	多为细长圆柱形，表面黄褐色，纹理粗糙，无芦头。	节明显膨大，形似竹节，无芦头，须根少。	不规则团块状，有瘤状突起，断面灰绿色或黄绿色。

人参

花与果： 到了 4-6 年，人参茎顶会抽出一根细长的伞形花序，开淡黄绿色的极小花朵。到了秋天，会结出扁球形的浆果，熟透时**通红耀眼**，在绿林里非常显眼。



党参

是桔梗科党参属的多年生**缠绕草本植物**。它和人参直立挺拔的姿态完全不同，它是个“软骨头”，喜欢像藤蔓一样缠绕在其他植物上。

- **叶子（心形卵叶）**： 它的叶子通常呈卵形或广卵形，长得有点像个小心心。叶子边缘没有尖锐的刺齿，而是比较温柔的**波状钝锯齿**。
- **花朵（倒扣的小铃铛）**： 7-10 月开花。它的花非常漂亮，像一个个倒挂的**钟或者小铃铛**。花瓣外面是淡黄绿色或乳黄色，如果你把花托起来往里看，会发现花冠内侧带有一圈神秘的**紫堇色斑点或线条**。
- **气味（受伤流奶）**： 鲜活的党参如果在野外被折断茎叶，断口处会流出一种乳白色的粘稠浆汁。



天门冬

攀援**藤蔓**，长得像长刺的松针盆栽。麦门冬：矮小的**草丛**，长得像路边的韭菜或草坪。

- **假叶（像松针）**：天门冬真正的叶子已经退化成了鳞片，我们肉眼看到的是它的“假叶”（叶状枝）。这些假叶长得扁扁的、弯弯的，**像一簇簇翠绿的松针**，在阳光下非常好看，现在很多人把它当做观叶盆栽（文竹的亲戚）。
- **刺（暗藏玄机）**：它的藤蔓茎非常长，上部有很多分枝。最关键的是，茎上长有**往后弯曲的短刺**，去野外采摘时如果不小心，很容易被它挂住衣服或划伤皮肤。

- **果实（红玛瑙）**：它的花非常小，淡绿色。到了秋天，会结出球形的浆果。熟透时会变成鲜红耀眼的红色小球，像一串串红玛瑙，挂在绿色的“松针”间。

甘草

(中药材)

别名：国老、甜草、美草

学名：Glycyrrhiza uralensis Fisch.

科属：豆科 (Fabaceae)

甘草属 (Glycyrrhiza)

药用部位：干燥根及根茎

采收期：秋、冬季地上部分枯黄后，挖出根及根茎，除去须根和泥沙，晒干或低温干燥。

生态习性

多年生草本，喜光，耐旱、耐寒，耐盐碱，生命力强。

生于海拔600~2000米的干旱沙地、荒漠草原、河滩、山坡草地、盐碱地或黄土丘陵等地。

主产于内蒙古、甘肃、新疆、宁夏等地。

特征概述

- ① 直立草本，高30~100cm。全株被白色柔毛和腺点，手摸有黏性。
- ② 奇数羽状复叶，小叶5~17片。卵形或椭圆形，先端圆钝或微凹，上面密布腺点，背面密被白色柔毛。
- ③ 夏季开花，花紫红色或淡紫色，蝶形，成总状花序，腋生。
- ④ 秋季结果，荚果镰刀状或环状弯曲，密被刺状腺毛，果皮坚韧。
- ⑤ 地下主根粗壮，圆柱形，外皮红棕色，味极甜。

药用价值


味甘，性平。归心、肺、脾、胃经。

补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。

主要分布


主产于内蒙古（乌拉特前后旗）、甘肃（陇西、张掖）、新疆、宁夏、山西、陕西等地。

8. 显微特征（根横切面）



- 木栓层细胞多角形。
- 皮层薄壁细胞中含草酸钙簇晶。
- 维管束形成层明显。
- 木栓部等管束少数散在排列。

9. 主要成分



- 主要成分为三萜皂苷类、黄酮类等。
- 具有抗炎、抗氧化、保肝、免疫调节等作用。

10. 主要产地



主产地：内蒙古、甘肃、新疆、宁夏等（乌拉特前后旗、陇西、张掖等地为道地产区）。

11. 性状鉴别要点



- 根长圆柱形，表面红棕色，有纵皱纹及皮孔。
- 质坚实，断面粉性，味极甜。

12. 易混品鉴别

圆叶甘草	光果甘草	胀果甘草
根较细，表面灰棕色。	荚果较光滑，少刺。	荚果膨胀，少刺毛。
味微甜。	味微甜。	味微甜。

《神农本草经》原文摘要



甘草，味甘，平。主心腹邪气，诸惊痫症，坚筋骨，长肌肉，倍气力，金疮，解百药毒。

来源

本品为豆科植物甘草 Glycyrrhiza uralensis Fisch. 的干燥根及根茎。

性味归经

味甘，性平。归心、肺、脾、胃经。

功效

补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。

主治

脾胃虚弱，倦怠乏力，咳嗽痰多，心悸气短，病后体虚，缓急止痛，药物中毒等。

用法用量

煎服：3~15g。外用：适量。蜜炙用。



甘草

是豆科甘草属的多年生草本植物。由于它是豆科大家族的成员，它的地上部分长得**极像大豆（黄豆）或者槐树的叶子**。在野外未开花时，它非常擅长伪装成“一团普通的绿草”

- **全景构图与株型 (Overall Habit) ——【核心绘图抓手：羽状复叶与刺毛豆荚】：**
多年生草本，株高约 **30~100 厘米**。茎直立，木质化程度较低，被白色柔毛和腺体。最核心的视觉抓手是它的叶片：奇数羽状复叶，小叶 **5~17 片**，呈卵形或椭圆形，上面密布小腺点（摸起来微黏），背面密被白色柔毛。
- **地下部分与花果特写 (Underground & Flower/Fruit Morphology) ——【核心抓手：粗长红棕色主根与刺毛密集弯曲豆荚】：**
- **地下根系：** 长有极其粗壮、延伸很深的**圆柱形主根**（即甘草药材），外皮红棕色，地下还有横向蔓延的根状茎。
- **花与果实：** 夏季（6~7 月），叶腋抽出**密集的总状花序**，开着蝶形的**紫红色或淡紫色**花朵。到了秋季，会结出极其独特的豆荚：**镰刀状或环状弯曲**的荚果，外面**密密麻麻紧抱着**用肉眼可见的**刺状腺毛**（像一个个小刺猬膨大串）。
- **生态环境背景 (Ecological Background)：** 背景可设置为**盛夏或初秋时节**，西北（如内蒙古、甘肃、新疆）干燥的荒漠草原、半沙漠边缘或黄土丘陵草地。在干旱强烈的阳光下，绿色的羽状复叶与紫红色的花穗挺立，地表隐约可见粗壮深埋的红棕色根系。

地黄

(中药材)

别名：生地、怀庆地黄、玄参

学名：Rehmannia glutinosa (Gaertn.) DC.

科属：玄参科 (Scrophulariaceae)

地黄属 (Rehmannia)

药用部位：根 (肉质块根)

采收加工：秋季茎叶枯萎时采挖，除去须根及泥沙，晒干或低温烘干。

生态习性

多生于山坡、路旁、荒地、田边、草地、林缘等处。

喜温暖湿润气候，耐旱，不耐寒。适应在排水良好、疏松肥沃的腐土或沙壤土上生长。

主产于河南焦作 (怀庆地黄)、陕西、山西、河北、山东、甘肃等地。

特征概述

① 全株密被灰白色长柔毛及黏性腺毛，触摸有黏手感。

② 叶片较厚，互生，边缘有细锯齿，背面密被紫红色。

③ 花冠唇状钟形，紫红色，内有紫白色斑点及黄道。

④ 块根肉质肥大，呈纺锤形或条状，表面有横皱纹及突起。

药用价值

味甘，性寒。

归心、肝、肾经。

滋阴清热，凉血生津。

用于热病伤阴，舌绛无津，吐血衄血，咽喉肿痛，阴虚内热，骨蒸潮热，滑精，肝胃阴虚，腰膝酸软，头昏耳鸣，须发早白。

主要分布

主产于河南 (焦作、温县)、山西、陕西、河北、山东、甘肃、安徽等地。

① 茎 (根茎部)

② 叶 (侧生叶)

③ 花 (总状花序)

④ 根 (肉质块根)

1. 生境与分布

生于山坡、路旁、荒地、田边、草地、林缘等处。

2. 植株全貌 (花前)

3. 茎的特写 (被毛)

- 茎直立，单一或基部分枝。
- 密被灰白色长柔毛及黏性腺毛。

4. 叶片特写 (对生叶)

- 基生状茎生叶，倒卵形至长圆形。
- 长3-15cm，宽1.5-6cm。
- 叶面深绿色，背面常带紫红色。
- 边缘有不规则锯齿，密被腺毛。

5. 花序特写 (总状花序)

- 4-5月开花，茎顶抽出总状花序。
- 花冠密被黏性腺毛。

6. 花朵特写

- 花冠管状钟形，长3-4cm。
- 外唇紫红色，内有紫白色斑点及黄道。

7. 花部解剖

- 花萼5裂，密被黏性腺毛。
- 花冠5裂，内面有斑点及黄道。
- 雄蕊4枚，花丝着生喉部。
- 子房上位，2室。

8. 果实与种子

- 5-6月结果，蒴果卵形或状卵形。
- 长1-1.5cm，顶端有细尖嘴。
- 成熟时灰褐色，内含多数细小黑色种子。

9. 地下部分及加工过程 (肉质块根)

① 采挖 ② 去须根及泥沙 ③ 清洗 ④ 置成堆或通心 ⑤ 晒干或低温烘干 ⑥ 干燥成品

10. 药材性状 (饮片)

- 块根呈纺锤形或条状，长5-15cm，直径1-6cm。
- 表面黄棕色，有横皱纹及纵状突起。
- 断面黄白色或淡黄色，肉质，易折断。
- 气微，味甘，微苦，嚼之粘牙。

11. 显微特征 (根横切面)

- 木栓层为数列木栓细胞。
- 皮层薄壁细胞含淀粉粒及草酸钙簇晶。
- 韧皮部狭小，木质部等宽为细长。
- 髓部薄壁细胞大，含淀粉粒。

12. 主要成分

地黄苷D (Catalpol)

毛蕊花糖苷

- 主要成分为环烯醚萜苷 (如地黄苷)。
- 及糖甙、氨基酸、挥发油等。
- 具有滋阴清热、凉血生津作用。

13. 主要产地

主产于河南 (焦作、温县)、山西、陕西、河北、山东、甘肃、安徽等地。

13. 性状鉴别要点

- 块根肥大，表面有横皱纹及纵状突起。
- 断面黄白色或淡黄色，肉质，易折断。
- 气微，味甘，微苦，嚼之粘牙。

15. 易混品鉴别

地黄 (本品)	玄参	麦冬
块根肉质肥大	根呈圆柱形	块根细长
表面纵状突起	表面较光滑	表面有纵皱纹

16. 《神农本草经》原文摘录

地黄，味甘，性寒。

主折跌绝筋，伤中，通血痹，血痹，小腹痛，利五脏，益气力，生肌肉，通血脉，久服轻身不老。

17. 功效与主治

功效：滋阴清热，凉血生津。

主治：热病伤阴，舌绛无津，吐血衄血，咽喉肿痛，阴虚内热，骨蒸潮热，肝肾阴虚，腰膝酸软，头昏耳鸣，须发早白，滑精等。

18. 现代药理研究

具有抗胃状、抗炎、降血糖、保护肝肾、免疫调节等作用。

19. 用法用量

内服：6-15g，煎汤；或入丸、散、膏。

外用：适量，鲜品捣敷或煎汤洗。

地黄

原植物全貌形态 (Plant Morphology) :

- **茎 (Stem) :** 植株高 10-30 厘米。茎直立，单一或基部分枝，全株密被灰白色长柔毛及带黏性的腺毛 (触摸有明显的黏手感)。

- **叶 (Leaves) :** 莲座状基生叶，呈倒卵形至长椭圆形，长 3–15 厘米，宽 1.5–6 厘米，顶端钝圆，基部渐狭成梯状柄，边缘有不规则的锯齿或重锯齿；叶片正面深绿色，背面常带紫红色；最显著的特征是叶面极度凹凸不平、呈深皱缩状，网脉在背面显著隆起。
- **花 (Flowers) :** 4–5 月开花。茎顶抽出总状花序；花冠呈管状钟形（像小喇叭），长 3–4 厘米，外表紫红色或黄紫色，内部有紫褐色斑点及黄道；花萼 5 裂，同样密被黏性腺毛。
- **果实 (Fruits) :** 5–6 月结果。蒴果呈卵形或狭卵形，长 1–1.5 厘米，成熟时呈灰褐色，顶端有细尖喙，内含多数细小的黑色种子。

根部与用药部位 (Roots & Medicinal Part) :

- **地下块根形态:** 块根呈肉质肥大的纺锤形或条状，长 5–15 厘米，直径 1–6 厘米，表面有不规则的横向皮孔及肉质瘤状突起。
- **根部颜色:** 鲜采时外皮呈浅黄棕色或黄红色，内部肉质为鲜黄色或类白色，水分充足，易折断。
- **用药部位:** 以其秋季采挖的干燥或新鲜肉质块根入药。



白术

(中药材)

别名：于术、冬术、片术、山萆薢

学名：Atractylodes macrocephala Koidz.

科属：菊科 (Asteraceae)

苍术属 (Atractylodes)

用药部位：干燥根茎

采收期：冬季下部叶枯萎时

采挖，除去须根及泥沙，晒干入药。

生境与分布

- 喜温暖湿润气候，耐寒耐旱，怕水涝。喜肥沃、疏松、排水良好的砂质壤土或腐殖质土。
- 主产于浙江、湖南、安徽、四川、江西、湖北等地。



1. 植株全貌 (生长期)



高30~60厘米。茎直立，圆柱形，绿色或微带紫红色，上部多分枝。

2. 茎部特写



茎圆柱形，光滑无毛，节部膨大，绿色或微带紫红色。

3. 叶片特写 (下部叶)



下部叶常3深裂或羽状5深裂，叶缘具针刺状细锯齿 (风芒之缘)。

4. 叶片特写 (上部叶)



上部叶不裂，狭披针形，叶缘同样具针刺状细锯齿。

5. 花序特写 (头状花序)



头状花序单生枝顶；总苞钟状，由9~10层覆瓦状苞片包覆。

6. 小花特写



小花密集，紫红色或红紫色，花冠管状，5裂，顶端微裂。

7. 果实特写 (瘦果)



瘦果倒圆锥形，密被白色绢毛，顶端具羽毛状污白色冠毛。

8. 果实附着特写



果实具倒钩刺，易粘附在人畜衣物或毛发上，藉以传播。

9. 地下根茎 (鲜品)



根茎肥厚不规则的结节状块状或串状，表面有许多小瘤状突起。

10. 根茎切面 (鲜品)



外皮淡灰黄或浅棕黄，内部肉质黄白色或类白色，有挥发香气。

11. 干燥根茎 (药材)



除去须根，晒干或烘干，表面黄白色至淡棕黄色，质轻而坚实。

12. 干品切面



质坚实，断面黄白色，粉性足，气香，味苦微辛。

13. 生境环境



多生于山坡草地、林缘、路旁或溪边湿地。

14. 产地分布



主产于浙江、湖南、安徽、四川、江西、湖北等地。

15. 采收与加工



采挖 (冬季)



去泥沙



晒干或烘干



除去须根

【功效主治】

健脾益气，燥湿利水，止汗，安胎。

【主治】

脾虚食少，腹胀便溏，痰饮水肿，自汗胎动不安等。



白术

原植物全貌形态 (Plant Morphology)：

- **茎 (Stem)：** 植株高 30-60 厘米。茎直立，呈圆柱形，表面绿色或微带紫红色，光滑无毛，上部多有分枝。

- **叶 (Leaves)：** 叶互生，薄纸质；茎下部叶常呈 **3 深裂或羽状 5 深裂**，顶端裂片较大；茎上部叶不裂，呈狭披针形；叶片正面深绿色，背面淡绿色，最显著的特征是叶缘带有针刺状的细锯齿（古称“风芒”之象）。
- **花 (Flowers)：** 8–10 月开花。头状花序单生于茎枝顶端；总苞呈钟状，由 9–10 层覆瓦状排列的苞片包裹；小花密集，呈靓丽的紫红色或红紫色。
- **果实 (Fruits)：** 8–10 月结果。瘦果呈倒圆锥状，成熟时呈灰褐色或紫褐色，密被白色绒毛，顶端带有羽毛状的污白色冠毛。

根部与用药部位 (Roots & Medicinal Part)：

- **地下根茎形态：** 根茎生长于泥土中，呈肥厚不规则的结节状块状或拳状，表面有许多小瘤状突起（老药工常依其形状称为“狗头术”、“狮子术”或“鸡腿术”）。
- **根茎颜色：** 鲜采时外皮呈淡灰黄色或浅棕黄色，内部肉质为黄白色或类白色，富含挥发油。
- **用药部位：** 以其冬季下部叶枯黄时采挖的干燥根茎入药。采挖后除去泥沙，烘干或晒干，再除去须根。



菟丝子

是旋花科菟丝子属的一年生**寄生草本植物**。它在野外的生长方式极其霸道，完全颠覆了我们对普通植物的认知：

- **无根无叶（金色面条）**：菟丝子在野外没有一根绿色的叶子，也没有扎在泥土里的根。它的地上部分看起来就像是一大团金黄色、黄色或红褐色的细面条，密密麻麻地缠绕覆压在其他绿色植物（特别是大豆、花生等豆科作物）的头顶。
- **吸血鬼本色（吸器）**：它的藤蔓茎一旦触碰到绿色植物，就会长出无数个微小的“吸盘”（刺吸根），直接刺入宿主植物的体内，疯狂吸取人家的水分和营养，直到把宿主吸得枯萎甚至死亡。
- **花朵（聚生小球）**：7-9月开花。它那像面条一样的茎上会簇生出一团团密集的白色或淡粉色小花，形状像一粒粒小钟。

- 果实（小胶囊）：随后会结出扁球形的蒴果。熟透裂开后，里面就会掉落出我们真正入药的精髓——菟丝子（种子）。

牛膝

(中药材)

别名：百根、牛夕、怀牛膝、土牛膝、野牛膝。

学名：Achyranthes bidentata Bl.

科属：苋科 (Amaranthaceae)

牛膝属 (Achyranthes)

药用部位：根 (肉质直根)

采收期：冬季茎叶枯萎时采挖。除全国大部分地区外，甘肃、宁夏、青海、四川、云南、贵州、广西、广东、福建、浙江、江西、湖北、湖南、安徽、江苏、山东、河南、河北、山西、陕西、甘肃等地。

生态习性

喜生于山坡草地、路旁、田边、林缘及荒荒地。

喜温暖、耐旱，适应性强，不耐积水。

产于山地、丘陵、平原地区。

特征概述

① 茎直立，四棱形，节部膨大，无毛或微毛。

② 叶对生，椭圆形或披针形，先端钝或稍尖。

③ 花穗状，花小而密，花冠下反折。

④ 果实被针状苞片，具倒钩刺。

⑤ 根肉质直根，细长圆柱形，入药部分。

药用价值

味苦、酸、性平。

归肝、肾经。

具有补肝肾、强筋骨、活血通经、引血下行的作用。

主治：膝部酸痛、筋骨痠软、月经不调、跌打损伤等。

主要分布

主产于河南、山东、陕西、山西、河北、安徽、湖北、四川、甘肃等地。

1. 生境与分布

生于山坡草地、路旁、田边、林缘及荒地。

分布于河南、山东、陕西、山西、河北、安徽、湖北、四川、甘肃等地。

2. 植株全貌 (花圃)

茎直立，四棱方柱形，表面被稀疏白色星毛。

节部膨大呈膝状，常紫红色或深绿色。

3. 茎的特写 (四棱与节膨大)

茎直立，四棱方柱形，表面被稀疏白色星毛。

节部膨大呈膝状，常紫红色或深绿色。

4. 叶片特写 (对生叶)

叶对生，椭圆形，长圆形或披针形。

长5~12cm，宽2~6cm。

两面被白色星毛，全缘。

叶柄长0.5~3cm，常带紫红色。

5. 花序特写 (穗状花序)

穗状花序顶生或兼生，花多而密集。

花小，绿白色或淡紫色。

花期7~9月。

6. 花朵特写

花小，花被5裂，绿白色。

花冠花条向下反折紧贴花序轴。

7. 苞片特写 (针状刺)

苞片针状，基部有淡红紫色膜质小苞片。

苞片顶端弯曲呈钩状。

8. 果实与种子

蒴果长圆形，长的2~2.5mm。

成熟黄褐色或棕褐色。

外被针状刺苞片，具倒钩刺。

易粘附作穗 (8~10月结果)。

9. 地下部分及加工过程 (根)

① 采挖 ② 去须根及泥沙 ③ 清洗 ④ 晾晒 ⑤ 晒干 ⑥ 干燥成品

药材性状 (饮片)

根呈长圆柱形，常微弯曲，长30~90cm。

表面黄白色或棕黄色，有纵纹及细根痕。

质脆，断面黄白色，木质部较小。

气微，味微苦、酸。

11. 显微特征 (根横切面)

木栓层 皮层 韧皮部 木质部

- 木栓层为多列栓细胞。
- 皮层薄壁细胞含草酸钙针晶。
- 韧皮部有筛管及伴细胞。
- 木质部导管多为环纹及网纹导管。
- 髓部薄壁细胞大，含淀粉粒。

12. 主要成分

牛膝皂苷A 牛膝皂苷B (dactylogenin)

- 主要成分为皂苷类 (如牛膝皂苷A、B)。
- 还含有多糖、黄酮、氨基酸等成分。

13. 主要产地

主产于河南、山东、陕西、山西、河北、安徽、湖北、四川、甘肃等地。

14. 性状鉴别要点

根呈长圆柱形，顺直少分枝。

表面黄白色或棕黄色，具纵纹及细根痕。

断面黄白色，粉性。

气微、味微苦、酸。

15. 易混品鉴别

川牛膝 (未品) 白牛膝 土牛膝 (对半草)

- 川牛膝节膨大，四棱明显。
- 白牛膝节不膨大，表面光滑。
- 土牛膝节不膨大，味淡。

16. 《神农本草经》原文摘要

牛膝，味苦，平。

主治：寒热，空湿痹，腰痛，足痹，脚酸，血闭，破症瘕积聚，溺不利，除温痹。

17. 功效与主治

功效：补肝肾，强筋骨，活血通经，引血下行。

主治：膝部酸痛，筋骨痠软，月经不调，痛经闭经，跌打损伤，瘀血肿痛。

18. 现代药理研究

具有抗炎、镇痛、抗氧化、保护骨髓、调节免疫等作用。

19. 用法用量

内服：6~15g，煎汤；或入丸、散。

外用：适量，煎水洗或研末调敷。

药典中的正品

牛膝

（特指怀牛膝）是苋科牛膝属的多年生草本植物，高大约 70-120 厘米。在野外，它的辨识度非常高，主要看它的茎：

原植物全貌形态（Plant Morphology）：

- **茎（Stem）：** 植株高 30–120 厘米。茎直立，呈明显的四棱方柱形，表面呈绿色或常带有暗紫红色，被有稀疏的白色柔毛；最显著的形态特征是其茎节膨大呈膝状（关节状膨大），颜色常呈紫红色或深绿色。
- **叶（Leaves）：** 单叶对生，叶片呈椭圆形、长圆形或披针形，长 5–12 厘米，宽 2–6 厘米，全缘；叶片正面呈深绿色，背面呈淡绿色，两面均被白色柔毛；叶柄长 0.5–3 厘米，常带紫红色。
- **花（Flowers）：** 7–9 月开花。穗状花序顶生或腋生，花多而密集，花小，呈绿白色或淡紫色；花后花朵向下反折紧贴花序轴；苞片呈针刺状，基部带有淡红紫色的膜质小苞片，顶端弯曲呈钩状。
- **果实（Fruits）：** 8–10 月结果。胞果呈长圆形，长约 2–2.5 毫米，成熟时呈黄褐色或棕黑色，外面包被有宿存的花被和带有倒钩刺的针刺状苞片，熟时极易粘附在人畜衣物或毛发上藉以传播。

根部与用药部位（Roots & Medicinal Part）：

- **地下根形态：** 根为肉质直根，呈细长圆柱形，长可达 30–90 厘米，直径 0.5–1.5 厘米，通常垂直向下生长，顺直少分枝。
- **根部颜色：** 鲜采时外皮呈淡黄色、土黄白色或浅棕黄色，内部肉质为黄白色或类白色，水分充足且较脆嫩。
- **用药部位：** 以其冬季茎叶枯萎时采挖的干燥肉质根入药。采挖后除去须根、泥沙及残留茎叶，捆成小把，晒至干瘪后堆闷发汗，再晒干即成。

土牛膝

(中药材)

【别名】 倒扣草、倒扣根、百仙子、野牛膝

【来源】 苋科 (Amaranthaceae)
牛膝属 (Achyranthes)
以野生牛膝
或粗毛牛膝为主。

【产地】 长江流域以南及西南各省，
如四川、云南、贵州、广东、
广西、福建等。
多生于山坡、路旁、山谷
或村庄附近的草丛湿润处。

【性味归经】 苦、酸、平。
归肝、肾经。

【功效】 补肝肾，强筋骨，
活血通经，引血下行。

【主治】 腰膝酸痛，筋骨痠软，
风湿痹痛，跌打损伤，
月经不调，经闭，
产后瘀阻腹痛等。

【用法用量】 9~15g。

【采收加工】 秋季采挖，除去须根
及泥沙，晒干或切片晒干。

1. 生境与分布

多生于山坡、路旁、山谷或村庄附近的草丛湿润处。主产于长江流域以南及西南各省（四川、云南、贵州、广东、广西、福建等）。

2. 茎的特征

多年生草本，茎直立，呈方柱形或多棱形，节部膨大，分枝多，被柔毛或近无毛。

3. 叶的特征

叶对生；叶片纸质，椭圆形、侧卵形或长圆状披针形，长5~12cm，宽2~6cm，基部楔形，全缘，两面被柔毛。

4. 花的特征

7~9月开花。穗状花序顶生或腋生；花小，密集；苞片及小苞片刺状，苞片刺尖弯曲如钩（倒扣）。

5. 果实的特征

8~10月结果。胞果矩圆形，长约2~3毫米，被宿存的花被片和刺状苞片包被。

6. 根部特征（原植物）

7. 药材加工过程

- ① 采挖地上部分（秋季）
- ② 除去泥沙及须根
- ③ 切段或切片
- ④ 晒干或切片晒干

8. 药材性状

土牛膝（饮片）

呈圆柱形或类圆柱形，长短不一，表面灰黄色或浅棕色，具纵纹及横向皮孔。

土牛膝（切片）

切片呈圆形或类圆形，表面淡黄白色或黄色，皮部较薄，木部较大。

土牛膝（段）

段呈圆柱形，节部膨大，坚实，质地较硬，断面淡黄白色。

土牛膝（粉末）

淡黄色或棕黄色粉末，气微，味微苦。

9. 显微鉴别

- ① 木栓细胞
- ② 皮层薄壁细胞
- ③ 木质部导管
- ④ 纤维
- ⑤ 草酸钙簇晶

10. 断面特征

断面淡黄白色，可见同心环状维管束点，排列成环，木部占大部分，无正品牛膝的“星点”纹理。

11. 鉴别要点（与牛膝比较）

	土牛膝（粗毛牛膝）	牛膝（正品）
茎	方柱形或多棱形，节部膨大	圆柱形，实心为主
叶	对生，椭圆形或倒卵形，全缘，两面被毛。	对生，长圆形，先端渐尖
花序	穗状，苞片刺状，刺尖弯曲如钩	穗状或圆锥状，苞片不弯钩
果实	胞果矩圆形，具刺状苞片包被	胞果卵圆形，无刺状苞片
根部	根茎短，细长根多，断面无“星点”	根粗大，断面有“星点”纹理

12. 主要产地

主产于长江流域以南及西南各省，如四川、云南、贵州、广东、广西、福建等地。

13. 性状鉴别要点

- ① 茎方柱形或多棱形，节部膨大。
- ② 叶对生，椭圆形或倒卵形，全缘，两面被毛。
- ③ 穗状花序，苞片刺状，刺尖弯曲如钩。
- ④ 根细长，断面淡黄白色，无“星点”，可见同心环状维管束点。

14. 常见主治应用

- 补肝肾：用于腰膝酸痛，筋骨痠软。
- 强筋骨：用于风湿痹痛，关节疼痛。
- 活血通经：用于月经不调，经闭。
- 引血下行：用于产后瘀阻腹痛等。

土牛膝

（以野生牛膝或粗毛牛膝为例）分布较广，主产于我国长江流域以南及西南各省（如四川、云南、贵州、广东、广西、福建等），多生于山坡、路旁、山谷或村庄附近的草丛湿润处：

原植物全貌形态：

- **茎 (Stem)：** 多年生草本，高 40–100 厘米。茎直立，呈方柱形或多棱形，节部膨大（状如牛之膝关节），分枝多，被柔毛或近无毛。
- **叶 (Leaves)：** 对生 (Opposite)。叶片纸质，椭圆形、倒卵形或长圆状披针形，长 5–12 厘米，宽 2–6 厘米，基部楔形，全缘，两面被柔毛。
- **花 (Flowers)：** 7–9 月开花。穗状花序顶生或腋生；花小，密集；胞片及小苞片刺状，苞片刺尖弯曲如钩（倒扣），容易勾挂人衣物或动物毛发（故名“倒扣草”）。
- **果实与根部 (Fruits & Roots)：**
 - **果实：** 8–10 月结果。胞果矩圆形，长约 2–3 毫米，被宿存的花被片和刺状苞片包被。
 - **根部 (入药部位)：** 根茎粗短，丛生多数细长的圆柱形主根。外皮呈灰黄色或浅棕色，质地较坚硬，富含甾酮类及皂苷成分（断面淡黄白色，可见同心环状维管束点）。
 -

柴胡

(中药材)

别名：地熏、山菜、慈草、柴草

来源：为伞形科植物柴胡
Bupleurum chinense DC.
的干燥根。

主产地：
北柴胡（硬柴胡）：
河北（道地“津柴胡”）、
河南、辽宁、山西、
陕西等地。
南柴胡（软柴胡）：
黑龙江、吉林、辽宁、
内蒙古等地。

生境与分布

- 喜温暖、干燥气候，耐旱，耐旱。
- 生于山坡草地、路旁、林缘、
灌丛、荒地及田边等处。
- 我国东北、华北、西北及
华中地区均有分布。

形态特征（要点）

- 植株高40-80厘米。
- 茎直立，常呈“Z”字形弯曲或
分枝多，表面具细纵棱。
- 叶互生，无柄；狭长披针形或
倒披针形，平行脉明显。
- 7-9月开花，复伞形花序；
花黄色，极小。
- 8-10月结果，双悬果
长圆形，具明显果棱。

10. 根部与药材（北柴胡为例）

鲜根（采挖后） → 洗净 → 晒干 → 药材（全根） → 切段 → 饮片（柴胡片）

主根明显，长圆锥形或长圆柱形，
下部常有分枝。

去除泥沙及须根。

春、秋二季采挖，除去茎叶
及泥沙，晒干。

干燥根呈细长圆锥形或长圆柱形，
表面灰褐色，有纵皱纹及支根痕。

质硬而脆，易折断，断面
纤维性，黄白色。

可切厚片，呈类圆形或卵圆形。

11. 北柴胡与南柴胡的比较

北柴胡（硬柴胡）

- 产于华北、西北等地
- 根较粗壮，质地坚硬
- 断面皮部较厚，色较深
- 气微香，味微苦

南柴胡（软柴胡）

- 产于东北等地
- 根较细长，质地较软
- 断面皮部较薄，色较淡
- 气微香，味微甜

12. 粉末显微特征（柴胡根）

木栓细胞 导管（螺旋纹导管） 草酸钙簇晶

13. 性味与主治

性微寒，味苦。

归肝、胆经。

主治：疏散退热，和解表里，
疏肝解郁，升举阳气。
用于感冒发热，寒热往来，
胸胁胀满，月经不调，脱肛，
子宫脱垂等。

柴胡

柴胡主要分为“北柴胡”（硬柴胡）和“南柴胡”（狭叶柴胡/软柴胡）两大来源：

- 北柴胡（硬柴胡）：主产于河北（道地“津柴胡”）、河南、辽宁、山西、陕西等地。
- 南柴胡（软柴胡）：主产于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古等地。

- **茎 (Stem) :** 植株高 40–80 厘米。茎直立，常呈“Z”字形弯曲或分枝较多，表面具细纵棱。
- **叶 (Leaves) :** 叶互生，无柄；基生叶及下部茎生叶多呈狭长披针形或倒披针形，平行脉明显（似竹叶或禾草叶）。
- **花 (Flowers) :** 7–9 月开花。复伞形花序顶生或侧生；花极小，花瓣黄色，倒卵形，顶端内折。
- **果实 (Fruits) :** 8–10 月结果。双悬果长圆形，果棱明显。
- **根部与用药部位 (Roots & Medicinal Part) :**
 - **地下根形态:** 主根明显，长圆柱形或长圆锥形，下部常有分枝。
 - **用药部位:** 春、秋二季采挖，除去茎叶及泥沙，晒干即得。

麦门冬

(中药材)

别名: 麦冬、沿阶草、书带草
学名: *Ophiopogon japonicus* (L.f.) Ker Gawl.
科属: 百合科 (Asparagaceae)
沿阶草属 (*Ophiopogon*)
药用部位: 干燥块根
采收期: 秋、冬季采挖, 除去茎叶, 洗净, 晒干或低温干燥。

生态习性
多年生常绿草本, 喜温暖湿润气候, 耐阴, 忌强光直射。
生于海拔300~1500米的山坡林下、溪谷旁、竹林下或潮湿处。
主产于华东、中南、西南等地。

特征概述
① 叶基生, 禾叶状, 线形, 细长如麦苗或韭菜, 深绿色, 革质, 叶缘有细锯齿。
② 从叶丛中抽出花茎, 微弯, 花序总状, 花小, 淡紫色或白色。
③ 花后结浆果, 球形, 成熟时深蓝色或黑蓝色。
④ 根系发达, 须根多, 须根的近端膨大成纺锤形肉质块茎, 即药材麦门冬。

药用价值
味甘、微苦, 性微寒。
归心、肺、肾经。
养阴生津, 润肺清心。
用于肺燥干咳, 咽干口渴, 心烦失眠, 内热消渴等。

主要分布
主产于浙江、安徽、江苏、湖南、湖北、四川、贵州、福建等地, 亦有栽培。

1. 生境与分布

生于海拔300~1500米的山坡林下、溪谷旁、竹林下或潮湿处。喜温暖湿润、耐阴的环境。

2. 植株全貌 (开花期)

3. 叶片特写 (麦苗状)

- 叶片细长, 线形, 似麦苗或韭菜。
- 丛生, 革质, 深绿色。
- 叶缘有细锯齿, 表面有光泽。

4. 花序特写 (总状花序)

- 花序总状, 花小, 密生。
- 花被6裂, 淡紫色或白色。
- 花期5~6月。

5. 花朵特写

- 花被6裂, 裂片细长。
- 雄蕊6枚, 花药黄色。
- 花朵小巧精致, 淡雅清新。

6. 果实特写 (成熟浆果)

- 浆果球形, 直径约6~8mm。
- 未熟时淡绿色, 成熟时深蓝色或黑蓝色。
- 果期7~9月, 极为醒目。

7. 地下部分及加工过程

药材性状 (饮片)

呈纺锤形或长圆形, 略弯曲, 长1.5~3cm, 直径0.3~0.6cm, 表面黄白色或淡黄棕色, 半透明, 有细纵皱纹, 质柔软, 断面角质样, 味甘、微苦。

8. 显微特征 (根横切面)

① 木栓层 ② 皮层 ③ 中柱 ④ 髓

- 木栓层细胞呈多角形。
- 皮层薄壁细胞多为类圆形, 含草酸钙结晶。
- 维管束散在, 中柱鞘明显。
- 内皮层细胞内含草酸钙结晶。

9. 主要成分

麦冬皂苷 (asparagusin) 麦冬皂苷 (asparagoside)

- 主要成分为甾体皂苷类化合物。
- 具有养阴生津、润肺清心等作用。

10. 主要产地

主产地: 浙江、安徽、江苏、湖南、湖北、四川、贵州、福建等地。

11. 性状鉴别要点

- 纺锤形或长圆形, 略弯曲。
- 表面黄白色或淡黄棕色, 半透明, 具细皱纹。
- 质柔软, 断面角质样。
- 味甘、微苦。

12. 易混品鉴别

玉竹	沿阶草	石菖蒲
较粗, 表面黄白色, 有环节, 稍扁。	细长, 表面黄棕色, 有纵皱纹。	短粗, 表面灰黄色, 有香气。

《神农本草经》原文摘要

麦门冬, 味甘、微苦、平。主心腹邪气, 结热积聚, 阳气不足, 阴气有余, 咳逆上气, 劳极羸瘦。

来源

本品为百合科植物麦门冬 *Ophiopogon japonicus* (L.f.) Ker Gawl. 的干燥块根。

性味归经

味甘、微苦, 性微寒。归心、肺、肾经。

功效

养阴生津, 润肺清心。

主治

肺阴虚燥咳, 津伤口渴, 心阴不足, 心烦失眠, 内热消渴。

用法用量

煎服: 6~15g, 外用: 适量, 研末调敷, 或煎水含漱。

麦门冬

是百合科沿阶草属的多年生常绿草本植物, 高大约 15-40 厘米。它在我国分布极广, 因为耐阴且常绿, 现在也是城市绿化带里最常见的植物之一。

- 全景构图与株型 (Overall Habit) —— 【核心绘图抓手: 麦苗状细叶与深色浆果】: 多年生常绿草本, 株高约 10~30 厘米。最直观的视觉抓手是它的叶片: 禾叶状 (细长如麦苗或韭菜), 丛生, 深绿色, 坚韧, 叶缘有细锯齿。从叶丛中央

抽出一根微弯的花葶，开着淡紫色或白色的小花。花谢后结出浆果状的果实，成熟时呈极其醒目的深蓝色或黑蓝色（像一颗颗小蓝宝石）。

- **地下部分特写（Underground Morphology）——【核心抓手：纺锤形膨大肉质块茎】：**
- **地下根系：** 根系发达，长有许多细长的须根。最关键的是，在须根的吐息膨大处，生有一个个膨大的、不规则的纺锤形肉质块茎（即麦门冬药材本体），长约**1.5~3 厘米**，肉质白嫩。
- **生态环境背景（Ecological Background）：** 背景可设置为初夏时节，南方山坡林下、溪谷旁阴湿处或竹林脚下。湿润的黑土上丛生着深绿细长叶片，地表隐约可见连着须根的白嫩纺锤形小块茎。

原植物全貌形态 (Plant Morphology) :

- **茎 (Stem)：** 植株高 30–120 厘米。茎直立，呈非常标准的**四棱方柱形**，微被倒生白色短柔毛，断面中空或有白色髓部。
- **叶 (Leaves)：** **叶对生**；叶片形态存在明显的“异型叶现象”——基生叶呈心形（近圆形），有长柄；茎中部的叶片呈羽状深裂为 3 个锐裂片；茎上部的叶片渐变为线形或三裂片，叶柄变短。
- **花 (Flowers)：** 6–9 月开花。**轮伞花序**腋生，多花紧密围绕茎节点排成穗状；花萼钟形，有 5 个尖锐的刺齿；**花冠呈淡红色或紫红色**，二唇形（上唇直立，下唇 3 裂）。
- **果实 (Fruits)：** 9–10 月结果。小坚果呈三棱状小卵形，淡褐色，表面光滑（入药即为“茺蔚子”）。
- **用药部位：** 夏季茎叶茂盛、花未开或初开时采割地上部分，晒干或切段晒干入药。

独活

(中药材)

别名: 重齿毛当归、独摇草、长生草

学名: *Angelica pubescens* Maxim. f. *biserrata* Shan et Yuan

科属: 伞形科 (Apiaceae)

当归属 (Angelica)

药用部位: 干燥根

采收期: 秋、冬季地上部分枯萎后, 挖出根, 除去泥沙及须根, 晒干或低温干燥。

生态习性

多年生高大草本, 喜凉爽湿润气候。耐寒, 耐阴, 忌积水。

生于海拔800~2400米的山谷草丛、林下或溪沟旁。

主产于四川、湖北、贵州、陕西、甘肃等地。

特征概述

① 茎直立, 中空, 有纵沟纹, 常带紫色。高1~2米。

② 叶大形, 二至三回三出羽状复叶。叶柄基部膨大成抱茎叶鞘。

③ 小叶卵状披针形或卵形, 边缘有不规则重锯齿, 下面有白色短柔毛。

④ 茎顶抽出大型复伞形花序, 花白色或淡绿色。

⑤ 根粗壮, 肉质, 顶端有膨大根头, 下部分出数条弯曲支根。

药价值

性微温, 味辛、苦。归肝、肾、膀胱经。

祛风除湿, 通痹止痛。

用于风湿痹痛, 筋骨拘挛, 少阴头痛, 风寒湿痹。

主要分布

主产于四川、湖北、贵州, 及陕西、甘肃、云南等地。

8. 显微特征 (根横切面)

木栓层 皮层 维管束 内皮层

- 木栓层数列明显。
- 皮层宽广, 薄壁细胞多。
- 维管束呈环状排列, 形成层明显。
- 木质部导管木化。

9. 主要成分

欧前胡素 (imperatorin) 异欧前胡素 (isomerimperatorin)

- 主要成分为呋喃香豆素类化合物。
- 具有抗炎、镇痛、抗氧化等作用。

10. 主要产地

主产地: 四川 (川东、绵阳、平武、理县)、湖北 (鄂东、六棱水)、陕西、甘肃、云南等地。

11. 性状鉴别要点

- 根粗壮, 顶端有膨大根头。
- 下部分出数条弯曲支根。
- 表面有纵沟纹及横长皮孔。

12. 易混品鉴别

防风	羌活	当归
根较细长, 表面有细纵纹。	根头膨大, 表面有明显瘤状突起。	根多细碎, 有纵皱纹及横纹。

《神农本草经》原文摘要

独活, 味辛, 温。主风寒湿痹, 臂风头痛, 以酒渍之。

来源

本品为伞形科植物独活 *Angelica pubescens* Maxim. f. *biserrata* Shan et Yuan 的干燥根。

性味归经

味辛, 性微温。归肝、肾、膀胱经。

功效

祛风除湿, 通痹止痛。

主治

风湿痹痛, 筋骨拘挛, 少阴头痛, 风寒湿痹。

用法用量

煎服: 6~15g。外用: 适量, 煎水洗或研末调敷。

1. 生境与分布

生于海拔800~2400米的阴湿山谷、林下、草丛或溪沟旁, 土壤肥沃湿润。

2. 植株全貌 (开花期)

3. 茎与叶特写 (重齿羽状复叶)

- 茎粗壮, 中空, 表面有纵沟纹, 常带紫色。
- 叶为二至三回三出羽状复叶。
- 小叶边缘有不规则重锯齿, 下面密被短毛。
- 叶柄基部膨大成抱茎叶鞘, 颜色紫绿。

4. 花序特写 (复伞形花序)

- 复伞形花序顶生或腋生, 十分庞大。
- 花序轴密被短柔毛。
- 花小, 白色或淡绿色, 7~9月开花。

5. 花朵特写

- 花小, 花瓣5枚。
- 雄蕊5枚, 花药黄色。
- 花柱2枚, 花柱基部圆锥形。

6. 果实特写 (双悬果)

- 果实椭圆形, 木质, 密生钩刺。
- 成熟后易分裂成2个分果。
- 果期8~10月, 具芳香气味。

7. 地下部分及加工过程

① 挖出全株 ② 去除茎叶和泥沙 ③ 洗净 ④ 切除须根 ⑤ 干燥 ⑥ 成品(干燥根)

药材性状 (饮片)

呈不规则圆柱形, 略弯曲, 表面灰棕色或黄棕色, 有纵皱纹及横长皮孔。断面黄白色, 质硬, 气香, 味苦、辛。

独活

- 全景构图与株型 (Overall Habit) ——【核心绘图抓手: 高大直立茎与重齿复叶】: 多年生高大草本, 株高可达 1~2 米。茎粗壮直立, 中空, 表面有纵沟纹, 常带紫色。最核心的视觉抓手是它的叶片: 大型二至三回三出羽状复叶, 小叶片边缘有不规则的重锯齿 (“重齿毛当归”之名的由来), 叶柄基部膨大成巨大的抱茎叶鞘。

- 地下部分与花序特写（Underground & Flower Morphology）——【核心抓手：肉质粗根与复伞形花序】：
- 地下根系： 地下长着粗壮的**肉质主根**，顶端有膨大的根头，下部分出数条弯曲的支根，外皮呈灰棕色或黑棕色。
- 花序： 夏秋季节（7~9月），茎顶抽出巨大的**复伞形花序**，花序轴密被短柔毛。密集的小花呈现**白色或淡绿色**，如同一朵朵散开的白色云朵或小伞。
- 生态环境背景（Ecological Background）： 背景可设置为**夏末秋初，四川、湖北或贵州高山阴湿的山谷草丛、林下或溪沟旁**。高大的紫绿色茎秆与密布白色小花的复伞形花序在潮湿山谷中挺立。

识别维度	独活（重齿毛当归 A. biserrata）	当归（A. sinensis）
株高/体量	高大（1.5~2米），长势魁梧	较矮（0.4~1米）
小叶边缘	粗大不规则的“重锯齿”（锯齿套锯齿）	不规则浅锯齿或近全缘
叶面与质感	叶面较粗糙，有微毛	叶面平滑、微带浅绿光泽
茎与叶鞘毛茸	茎上部及膨大叶鞘密被微柔毛	茎与叶鞘光滑无毛
花朵颜色	纯白色或淡绿色	白色微带淡紫色或黄绿色
揉碎叶片气味	强烈特异的芹菜香与草药味	极为浓郁甜香的当归挥发油香

识别维度	独活（重齿毛当归 A. biserrata）	当归（A. sinensis）	防风（Saposhnikovia divaricata）	羌活（Notopterygium incisum）	蛇床子（Cnidium monnieri）
------	------------------------	-----------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------

株高/体量	高大魁梧 (1.5~2米)	较矮 (0.4~1米)	中等(0.3~0.8米)，分枝极多呈丛生状	中等(0.6~1.2米)	矮小草本 (0.3~0.8米)
茎干特征	粗壮直立，中空，表面带浅紫色，上部密被微柔毛	直立，中空，表面光滑无毛，有紫红色纵沟纹	茎基部常残留纤维状叶鞘残基，表面有条纹，无毛	粗壮中空，表面常带紫红色，节部与上部有微柔毛	细弱，中空，表面有纵棱，上部有稀疏短柔毛
叶片分裂类型	二至三回三出羽状复叶	二至三回三出羽状复叶	二至三回羽状全裂(裂片呈线形/狭披针形)	三回羽状复叶(裂片极小且多)	二至三回羽状全裂(裂片非常细小狭窄)
小叶边缘	粗大不规则的**“重锯齿”(锯齿套锯齿)**	不规则浅锯齿或近全缘	全缘(裂片细长如线，无锯齿)	边缘有深裂或不规则深锯齿	全缘(终羽片极细小如羽毛)
叶面质感与毛茸	叶面粗糙，两面或沿脉有微柔毛	叶面平滑，微带浅绿光泽，无毛	叶面光滑无毛，质地较厚略带肉质感	叶面粗糙，背面沿脉密被短柔毛	叶片柔嫩，两面及边缘有稀疏短柔毛
叶鞘	膨大成巨大抱茎	膨大成管状叶鞘	叶鞘稍微膨大，边缘膜质	抱茎叶鞘膨大，边缘膜质带紫色	叶鞘较小，短而

（ 叶 柄 基 部 ）	鞘，外侧 密被微柔 毛	（常深紫/ 绿紫 色），光 滑无毛			抱茎，边 缘膜质
----------------------------	-------------------	----------------------------	--	--	-------------



木香

是菊科木香属的多年生高大草本。它的地上部分长得很像野外的刺儿菜（大薊）。

- 全景构图与株型（Overall Habit）——【核心绘图抓手：巨型基生叶与暗紫色头状花序】： 多年生高大草本，株高可达 1.2~2 米。茎粗壮直立，中空，表面有深纵沟纹并被短柔毛。最核心的视觉抓手是它的叶片：基生叶极巨大（可达 1 米长），呈三角状卵形或心形，边缘有不规则的齿缺，叶柄长且具不明显的翅；茎生叶较小，基部抱茎。
- 地下部分与花果特写（Underground & Flower/Fruit Morphology）——【核心抓手：圆柱形灰褐色厚重圆根与紧密暗紫花头】：

- **地下根系：** 长有粗壮、沉重的**圆柱形主根**（即木香药材），外皮灰褐色至棕褐色，表面有网状纵纹。
- **花与果实：** 夏季（7~8 月），茎顶簇生数个**球形头状花序**，开着极其深沉的**暗紫色或墨紫色管状小花**，花序基部覆盖着多层总苞片。
- **生态环境背景（Ecological Background）：** 背景可设置为**盛夏时节，高海拔山区**（如云南、西藏、四川等高山灌丛或草甸）。高大挺拔的紫绿茎秆、巨大的三角叶片与深紫色的球形花头在高原阳光下耸立，泥土下隐约露出粗重红棕/灰褐根系。



山药

是薯蓣科薯蓣属的多年生缠绕草本藤本植物。

- **全景构图与株型 (Overall Habit) ——【核心绘图抓手：对生心形叶与腋生山药豆】：** 多年生缠绕草本藤本，茎细长，常带紫红色，向右缠绕生长。**最核心的视觉抓手是它的叶片：**通常为两两对生，叶片呈三角状心形或箭形，掌状脉 7~9 条，叶腋间常常长有棕褐色的球形或卵形珠芽（即“零余子”/ 山药豆）。

- **地下部分与花果特写（Underground & Flower/Fruit Morphology）——【核心抓手：垂直下伸的粗大肉质块茎】：**
- **地下根茎：** 地下生有极其粗壮、垂直深入土中的**长圆柱形肉质块茎**（即山药药材本体），长可达 30~100 厘米，外皮黄褐色，密生细长须根。
- **花与果实：** 夏秋季（6~8 月），叶腋抽出**穗状花序**，开着极其微小的淡黄白色小花（雌雄异株）；结出的蒴果有 3 个宽翅（像三个小小的风车叶片）。
- **生态环境背景（Ecological Background）：** 背景可设置为**初秋时节，华北或中原地区**（如河南焦作太行山麓）**肥沃疏松的沙质土壤中**。繁茂的藤蔓攀援在竹架或灌木上，密生深绿心形叶与棕色山药豆，湿润的黑土下隐约露出一根根粗壮深埋的黄褐色长块茎。



- **叶子（形如玉米）：** 它的叶子又长又宽（长披针形），叶片表面有一条白色的中脉，叶子边缘非常粗糙，如果不小心划过皮肤，会有明显的割裂感。
- **果实（天然的佛珠）：** 到了秋天（8-10月），茎顶会挂满一串串总状花序。最奇特的是它的果实，外面包裹着一层坚硬如瓷器、泛着珐琅光泽的总苞壳。果壳熟透后会变成灰白色、黑褐色或蓝灰色。
- 由于这个外壳硬得像石头，两端天然有孔，古人经常把它摘下来串成**手串**或**佛珠**，民间也亲切地叫它“菩提子”或“草珠子”。将这层坚硬的黑外壳脱掉，里面才是我们入药的

薏苡仁

泽泻

(中品)

【别名】泽泻、水泽、泽泻、芒芋、芒泽、如意菜等。

【来源】为泽泻科植物泽泻 *Alisma orientale* (Sam.) Juzep. 的干燥块茎。

【性味】甘、淡、寒。

【归经】归肾、膀胱经。

【功效】利水渗湿，泄热。

【主治】用于小便不利、水肿胀满、泄泻、湿热带下。

【用法用量】6~12g。

【注意事项】孕妇慎用。

《神农本草经》原文
泽泻，味甘，寒。主风寒湿痹，散皮肤热，止寒热，利小便，补中益气，久服耳目聪明，轻身不饥，延年耐老。

1. 植株形态 (整体)

2. 花序 (圆锥花序)

3. 花 (放大)

4. 叶片特征 (正面)

5. 叶片特征 (背面)

6. 叶脉特征 (弧形脉)

7. 生境 (浅水、稻田、沼泽或溪流边)

8. 地下部分 (整体)

9. 地下部分 (近景)

10. 块茎特征 (外形)

11. 块茎特征 (断面)

12. 花蕾

13. 花开放过程

14. 花正面 (3片花瓣)

15. 花背面

16. 花的结构 (剖面)

17. 果实 (聚合果)

18. 采收与加工

19. 易混品种对比

泽泻 (本品)	东方泽泻	慈姑	薏苡
叶卵形或椭圆形，基部心形，脉弧形；块茎多数、椭圆、球形。	叶近圆形，基部心形，脉放射状；块茎较大、近球形。	叶箭形，基部截形；块茎扁球形，节明显，呈扁状。	叶细长条形；块茎扁圆形，表皮紫黑色。

20. 药材规格 (泽泻)

泽泻

是泽泻科泽泻属的多年生水生草本植物。它长在浅水、稻田、沼泽或者溪流边。

- **叶子（芭蕉小扇）**：它的叶子直接从根部抽出来，长得宽宽胖胖的，呈卵形或椭圆形，很像微缩版的芭蕉扇。叶片上有非常明显的弧形纵脉。
- **花朵（轮生小伞）**：夏秋季节，它会从叶丛中心高高抽出一根长长的花茎。花序呈金字塔形状的分枝（圆锥花序），开出的白色小花有**3片花瓣**，非常清新。

远志

(中品)

【别名】 小草远志、细草远志、线几远志、藤草。

【来源】 为远志科植物远志 *Polygala tenuifolia* Willd. 或卵叶远志 *P. sibirica* L. 的干燥根。

【性味】 苦、辛、温。

【归经】 心、肾、肺经。

【功效】 安神益智、祛痰、消肿。

【主治】 用于心神不安、烦躁失眠、健忘、惊悸、咳嗽不爽、癰肿疮毒。

【用法用量】 3~9g。

【注意事项】 孕妇慎用。

《神农本草经》原文

远志，味苦，温。主惊悸，安神益智，除邪气痰癖，坚筋骨，疗咳逆，止泻，利九窍，通血脉，久服亦入皮，通血，久服轻身不老。

1. 植株形态 (整体)

2. 花序 (顶生总状)

5. 叶片特征 (正面)

3. 花 (放大)

6. 叶片特征 (近景)

4. 花 (侧面)

7. 根部形态 (整体)

8. 根部形态 (近景)

9. 根部形态 (横切面)

10. 药材 (全体)

11. 药材 (近景)

12. 药材 (断面)

13. 果实 (蒴果)

14. 种子

15. 生境 (山坡草地)

16. 生境 (群丛)

17. 花期植株 (群生)

18. 花的形态 (特写)

19. 易混品种对比

远志 (本品)	葛缕子	补骨脂	狼毒
叶细长如松针，花蓝紫色，花瓣似小鸟。	叶线形，花白色小，果实椭圆形。	叶倒卵形，果实肾形，表面有网状纹。	叶厚实，花黄色，果实具刺。

20. 采收与加工

21. 药材性状 (规格)

远志

是远志科远志属的多年生草本植物，高大约 20-40 厘米。它长在北方干燥的山坡、草地上。

- 全景构图与株型 (Overall Habit) —— 【核心绘图抓手：针状线形叶与龙骨状紫蓝花】： 多年生小草本，株高仅 15~40 厘米。茎丛生，纤细直立或斜升。最核心的视觉抓手是它的叶片：叶片互生，极其狭窄呈线形或针状（长 1~3 厘米，宽仅 1~3 毫米），无叶柄，密生于茎上，看起来像一簇簇小松针。
- 地下部分与花果特写 (Underground & Flower/Fruit Morphology) —— 【核心抓手：长圆柱形弯曲根与紫蓝色总状花序】：
- 地下根系： 地下长有长圆柱形的肉质主根（即远志药材），淡黄褐色，弯曲，粗约 3~10 毫米。
- 花与果实： 春夏季（5~7 月），茎顶抽出稀疏的总状花序，开着极其精美的小花：花朵呈紫蓝色或蓝紫色，花瓣形似蝴蝶（最下面一片花瓣呈龙骨状，顶端带有流苏状的附属物）。结出的蒴果呈扁平倒心形。
- 生态环境背景 (Ecological Background)： 背景可设置为初夏时节，北方（如山西、陕西、河北）向阳的山坡、路旁或草丛中。在干燥的沙石土壤中，纤细丛生的线形叶间点缀着一串串深紫蓝色的精美花朵，泥土下隐约露出弯曲的黄棕色肉质根。

龙胆

(中药材)

别名：龙胆草、胆草、山龙胆

学名：Gentiana scabra Bunge

科属：龙胆科 (Gentianaceae)
龙胆属 (Gentiana)

药用部位：干燥根及根茎

采收期：秋季采挖，洗净泥土，
除去须根，晒干或低温干燥。

生态习性
多年生草本，喜冷凉湿润气候，耐寒，忌高温。
生于海拔500~2000米的高山草甸、灌丛边缘、山坡草地、林缘及湿润处。
主产于东北、华北、西北及西南等地。

特征概述
① 茎直立，单生或丛生，高30~60cm，常带紫红色。
② 叶对生，无柄，抱茎，叶片狭披针形至卵状披针形，具3条明显的主脉。
③ 秋季开花，花单生于茎顶或叶腋，花冠漏斗状，深蓝色或蓝紫色，内有斑点。
④ 地下有短根根茎，簇生须根，根细长如马尾，黄棕色。

药用价值
味苦，性寒。
归肝、胆经。
清热燥湿，泻肝胆火，
用于湿热黄疸、口苦咽干、目赤肿痛、耳聋耳鸣等。

主要分布
主产于东北（黑龙江、吉林）、华北（内蒙古、山西）、西北（甘肃、宁夏）、西南（四川、云南）等地。

1. 生境与分布

生于海拔500~2000米的高山草甸、灌丛边缘或湿润的山坡草地。
东北及华北等地广泛分布。

2. 植株全貌（盛花期）

3. 茎与叶特写（对生无柄）

- 茎直立，常带紫红色，表面有细条纹。
- 叶对生，无柄，抱茎而生。
- 叶片狭披针形，具3条明显主脉。

4. 花序特写（簇生）

- 花生于茎顶或叶腋，簇生成穗。
- 花冠漏斗状，深蓝色或蓝紫色。
- 花冠内侧有紫色斑点。

5. 花朵特写

- 花冠5裂，漏斗状。
- 裂片后折，边缘微波状。
- 花柱细长，柱头2裂。

6. 果实特写（蒴果）

- 蒴果长椭圆形，先端渐尖。
- 成熟后裂开，种子多数。
- 果期9~10月。

7. 地下部分及加工过程

① 挖出全株 ② 去除地上部分 ③ 清洗根茎 ④ 去除根余质 ⑤ 干燥 ⑥ 成品

药材性状（饮片）
根茎呈短粗块状，表面黄棕色，顶部残留茎基及芽痕。下簇生多数细长的须根，柔韧如马尾，根味极苦。

8. 显微特征（根横切面）

- 木栓层为数列细胞。
- 皮层宽广，薄壁细胞多。
- 维管束散生，形成层明显。
- 木质部导管单个或成群。

9. 主要成分

龙胆苦苷 (gentiopicoside) 獐牙菜苦苷 (amarogentin)

- 主要成分为龙胆苦苷、獐牙菜苦苷等。
- 具有显著的抗炎、保肝、利尿作用。

10. 主要产地

主产地：黑龙江、吉林、内蒙古、山西、甘肃、宁夏、四川、云南等地。

11. 性状鉴别要点

- 根茎短粗，顶端有茎基及芽痕。
- 下部簇生细长须根，质柔韧。
- 断面黄白色，味极苦，久嚼有麻感。

12. 易混品鉴别

柴胡	秦艽
根细长，分枝多。	根较粗壮，少分枝。
断面黄色，味苦。	断面黄白色，味微苦。
具香气。	具特殊气味。

《神农本草经》原文摘要

龙胆，味苦，寒。主骨间寒热，惊风，目赤，咽痛，慢性热病，久服，益气轻身。

来源

本品为龙胆科植物龙胆 Gentiana scabra Bunge 的干燥根及根茎。

性味归经

味苦，性寒。
归肝、胆经。

功效

清热燥湿，泻肝胆火。
凉血解毒。

主治

湿热黄疸，口苦咽干，目赤肿痛，耳聋耳鸣，肋痛口苦等。

用法用量

煎服：3~10g。
外用：适量，煎水洗患处或研末调敷。

龙胆

- 全景构图与株型（Overall Habit）——【核心绘图抓手：对生无柄叶与蓝紫色漏斗花】：多年生草本，株高约 30~60 厘米。茎直立，单生或丛生，常带紫红色。最核心的视觉抓手是它的叶片与花朵：叶片两两对生，抱茎而生（无叶柄），呈狭披针形至卵状披针形，有 3 条明显的主脉。秋季时，茎顶或叶腋会簇生出数朵极

醒目的深蓝色或蓝紫色花朵，花冠呈漏斗状（像一个个向上张开的精美小喇叭），内侧常有斑点。

- 地下部分特写（Underground Morphology）——【核心抓手：短粗根茎与马尾状丛生根】：
- 地下根系：地下有一个短粗的块状根茎（长约 0.5~3 厘米），顶端残留有茎基和芽。最关键的是，根茎下方簇生着数十条细长、柔韧的圆柱形根（宛如一束马尾），长可达 10~20 厘米，外皮呈黄棕色或棕褐色。
- 生态环境背景（Ecological Background）：背景可设置为深秋时节，东北或华北高山草甸、灌丛边缘或湿润的山坡草地上。在枯黄的野草衬托下，一簇簇深蓝紫色的漏斗花在秋风中盛开，泥土下隐约露出马尾般密集的黄棕色根系。

细辛（中品）

【别名】 小辛、少辛、华细辛、盆草细辛、独叶草。

【来源】 为马兜铃科植物细辛 *Asarum sieboldii* Miq. 或华细辛 *Asarum heterotropoides* Franch. 的干燥根及根茎。

【性味】 辛，温。

【归经】 归肺、肾、心、肝经。

【功效】 祛风散寒，通窍止痛，温肺化饮。

【主治】 用于风寒感冒，头痛，鼻塞流涕，鼻渊，牙痛，风湿痹痛，咳嗽痰多。

【用法用量】 1~3g，宜后下。

【注意事项】 孕妇慎用。不宜久服，虚热咳嗽及阴虚火旺者慎用。

【神农本草经】原文
细辛，味辛，温。主头痛，温中，寒热，鼠瘻，乳难，去邪气，久服明目，轻身不老。生山谷。

1. 植株形态（整株）

花（放大）

叶（放大）

根及根茎（放大）

2. 原药材（整体）

3. 原药材（近景）

4. 原药材（断面）

5. 原药材（表面特征）

6. 原药材（断面特征）

7. 原药材（质地）

8. 不同规格

9. 原产地与生境

10. 采收与加工

春、秋二季采挖，除去须根，洗净，晒干或低温干燥。

11. 易混品种对比

细辛（本品）

北细辛（近缘）

华细辛（同属近缘）

12. 《神农本草经》药材形态

细辛

是马兜铃科细辛属的多年生草本植物，高大约 10-30 厘米。它极度喜阴，喜欢生长在深山老林的阴湿山谷、溪边或茂密的树荫下

- **叶子（完美的心形）：** 细辛的地上部分非常低调，通常一个根头上只长出**2片叶子**。这两片叶子长得非常漂亮，呈**完美的爱心形或肾心形**，表面是深绿色的，有时顺着叶脉还会长有一层稀疏的白毛。
- **花朵（地下的黑喇叭）：** 它的开花方式极其奇特。**5-6月**开花时，它的花并不往高处长，而是**紧紧贴着地面、藏在泥土和枯叶堆里**（地花）。花朵呈暗紫色或紫褐色，像一个倒扣的钟或者肉质的小喇叭，不扒开叶子根本看不见。

巴戟天

(中药材)

别名: 巴戟、鸡肠风、鸡眼藤

学名: *Morinda officinalis* How

科属: 茜草科 (Rubiaceae)

巴戟天属 (*Morinda*)

用药部位: 干燥根

采收加工: 全年均可采挖，除去泥沙，晒至六七成干，轻击去扁，抽去木心（嫩木质部），晒干或烘干。入药部分即为剥去木心的肉质皮部（巴戟肉）。

生境与分布

- 喜温暖湿润气候，耐阴。
- 多生于海拔300-1500米的山坡、林缘、灌丛中。
- 主要分布于广东、广西、云南、福建、台湾等地。

形态特征

- 藤状灌木；嫩枝被长短不一的粗毛，老枝无毛，柱形，有明显纵棱。
- 叶对生；叶片长圆形或椭圆形，长6-13厘米，先端急尖，基部楔形或圆形，上面初被短粗毛，下面沿中脉被短粗毛；托叶干膜质，筒状。
- 5-7月开花，头状花序顶生成聚生；花萼杯状；花冠白色，肉质，4裂。
- 10-11月结果，近球形核果，成熟时呈红色。

头状花序 (白色或淡黄色)

嫩枝叶

嫩枝

嫩枝上有一排粗毛

托叶干膜质

植物体被有短粗毛

1. 植株全貌 (生长状态)

藤状灌木，攀援生长，多缠绕于他物上，高数米。多生于山坡、林缘或灌丛中。

2. 茎特写 (嫩枝)

嫩枝被长短不一的粗毛；老枝无毛，柱形，有明显纵棱。

3. 叶片特写 (正面)

叶对生；长圆形或椭圆形，长6-13厘米，先端急尖，基部楔形或圆形，上面初被短粗毛。

4. 叶片特写 (背面)

叶下面沿中脉被短粗毛，侧脉明显。

5. 托叶特写 (筒状)

托叶干膜质，筒状，包裹于茎节处。

6. 花序特写 (头状花序)

头状花序顶生成聚生；着生于枝顶或叶腋处。

7. 花特写 (白色肉质花冠)

花萼杯状，花冠白色，肉质，4裂。

8. 果实特写 (未熟)

果实近球形核果，初为绿色。

9. 果实特写 (成熟)

10-11月结果，成熟时呈红色。

10. 根部全貌 (鲜品)

根肉质厚实，呈不规则串珠状 (连珠状) 膨大，长短不一，表面淡黄褐色或棕色。

11. 根部特写 (鲜品)

"连珠状" 膨大明显，结节膨大，更突而宽能裂。

12. 加工过程 (去木心)

晒至六七成干，轻击去扁。

抽去木心 (嫩木质部)。

剥去木心层的肉质皮部 (巴戟肉)。

晒干或烘干入药。

注: 入药以剥去木心的肉质皮部 (巴戟肉) 为佳，质柔润，味微甘。

13. 药材性状 (干品)

呈不规则的圆柱形，表面灰黄褐色，有纵皱纹及横环纹；质柔韧，断面皮部类白色，木心淡黄色或棕色。

14. 生境环境

生于山坡、林缘、灌丛或岩石旁，喜温暖湿润、半阴的环境。

15. 产地分布

主要分布于广东、广西、云南、福建、台湾等地。

16. 主要功效

补胃壮阳，强筋健骨，祛风湿。

主治阳痿遗精，腰膝酸软。

风湿痹痛，肾虚不固等。

巴戟天

属于茜草科巴戟天属的藤本植物。它喜欢生长在南方（如广东、广西、福建等）温暖潮湿的山谷、溪边或灌木丛中。

- 茎 (Stem):** 藤状灌木。嫩枝被长短不一的粗毛，老枝无毛，柱形，有明显纵棱。

- **叶 (Leaves)：** 叶对生；叶片长圆形或椭圆形，长 6–13 厘米，先端急尖，基部楔形或圆形，上面初被短粗毛，下面沿中脉被短粗毛；托叶干膜质，筒状。
- **花 (Flowers)：** 5–7 月开花。**头状花序**顶生或腋生；花萼杯状；**花冠白色**，肉质，4 裂。
- **果实 (Fruits)：** 10–11 月结果。近球形核果，成熟时呈红色。
- **根部与用药部位 (Roots & Medicinal Part)：**
- **地下根形态：** 根肉质厚实，呈不规则断续链珠状（连珠状）膨大，长短不一。
- **用药部位：** 全年均可采挖，除去泥沙，晒至六七成干，轻轻击扁，抽去木心（硬木质部），晒干或烘干，入药部分即为剥去木心的肉质皮部（**巴戟肉**）



川芎

是伞形科藁本属的多年生草本植物，主要产于四川（以都江堰、彭州等地的“灌芎”最为地道）。茎叶（像芹菜）：川芎的地上部分长得很像芹菜，茎是直立且中空的。最有趣的特征是它的茎节，一节一节地膨大起来，像个小盘子，中医称之为“盘节”。地下部分（“大拳头”）：我们入药的部分就是它长在泥土里的根茎。它不像普通树根那样细长，而是长成一个硕大的、不规则的拳头状结节团块，表面凹凸不平。

- **茎 (Stem)：** 植株高 40–60 厘米。茎直立，圆柱形，中空，表面具纵条纹；**茎下部节膨大成盘状（形成小突起）。**
- **叶 (Leaves)：** 叶互生，柄基部扩大成鞘；叶片为 3–4 回三出羽状全裂，小叶片羽状深裂，边缘有锯齿，整体呈细碎羽毛状。
- **花 (Flowers)：** 7–8 月开花。**复伞形花序**顶生或侧生；小花白色，小巧密集。
- **根茎与用药部位 (Roots & Medicinal Part)：**
- **地下根茎：** 根茎呈不规则结节状拳形团块。

- **用药部位：**栽后第二年夏季（5月下旬至6月上旬）当茎上节盘显著变紫茶色时采挖，除去茎叶及须根，洗净晒干或烘干，再撞去残余须根入药。

黄连

（中药材）

别名：川连、味连、鸡爪连、雅连

学名：Coptis chinensis Franch.

科属：毛茛科（Ranunculaceae）
黄连属（Coptis）

用药部位：干燥根茎

采收期：秋季采挖，除去泥土，烘干，撞去须根及泥沙。

生境与分布

- 极度喜阴、喜湿，多生长在海拔一两千米的高山冷凉密林下。
- 四川、重庆、湖北交界的高山地区（如石柱、利川）最为地道，著名的“味连”。

形态特征

- 多年生草本，无地上主茎。地下根茎直立生长。
- 根茎黄褐色，密生须根，分枝常簇生呈鸡爪状。
- 基生叶，三全裂，中央裂片卵状三角形，羽状深裂，边缘有锐锯齿。
- 2—3月开花，花小，黄绿色；4—6月结果。

1. 植株全貌（生境）



多年生草本，生于高山冷凉密林下，极度喜阴、喜湿。

2. 基生叶（正面）



叶片三全裂，中央裂片卵状三角形，羽状深裂，边缘有锐锯齿；正面深绿色有光泽。

3. 基生叶（背面）



叶片背面淡绿色，叶柄细长，基部常带紫褐色。

4. 花（聚伞花序）



2—3月开花，抽出花葶；聚伞花序有3~8朵花。

5. 花（特写）



花小，黄绿色；萼片5枚，狭披针形；花瓣线形或匙形，比萼片短。

6. 果实（蓇葖果）



4—6月结果；蓇葖果具柄，长6—8mm，成熟时呈绿黄色或黄褐色，开裂。

7. 果实开裂（含种子）



内含多数细小的长椭圆形棕黑色种子。

8. 地下根茎（鲜品）



根茎肥厚，呈鸡爪状分枝或单条圆柱形，节密生，上留有残留的叶柄基。

9. 根茎断面（鲜品）



鲜采时外皮黄褐色或灰黄色，折断内部肉质呈极光鲜的亮黄色或橙黄色。

10. 生境环境



生于海拔一两千米的高山冷凉密林下，喜阴、喜湿。

11. 产地分布



主产于四川、重庆、湖北交界的高山地区（如石柱、利川），亦见于贵州、云南等地。

12. 采收与加工



采收（秋季）→ 除去泥土 → 烘干 → 撞去须根及泥沙

13. 药材性状（干品）



根茎多分枝呈鸡爪状，表面黄褐色或灰黄色，具密节；质硬而脆，折断面鲜亮黄色，气微，味极苦。

【功效主治】

清热燥湿，泻火解毒。

主治：湿热泻痢，黄疸，口舌生疮，目赤肿痛，心火亢盛，心烦不寐等。



黄连

是毛茛科黄连属的多年生草本植物。它极度喜阴、喜湿，多生长在海拔一两千米的高山阴凉密林下，在四川、重庆、湖北交界的高山地区（如石柱、利川）最为地道（著名的“味连”）。

原植物全貌形态（Plant Morphology）：

- **茎与根茎（Stem & Rhizome）**：无地上主茎，由地下根茎直立生长；地下根茎黄褐色，密生多数须根，分枝常簇生呈鸡爪状。
- **叶（Leaves）**：均为基生叶，坚纸质；叶片呈三全裂（像开叉的鸭掌），中央裂片呈卵状三角形，羽状深裂，边缘有锐利锯齿；叶片正面深绿色有光泽，背面淡绿色；叶柄细长，长 5-15 厘米，基部常带紫褐色。
- **花（Flowers）**：2-3 月开花。抽出一至数条花葶；聚伞花序有 3-8 朵花；花小，呈黄绿色；萼片 5 枚，呈黄绿色狭披针形；花瓣线形或匙形，比萼片短。
- **果实（Fruits）**：4-6 月结果。蓇葖果具柄，长 6-8 毫米，成熟时呈绿黄色或黄褐色，开裂；内含多数细小的长椭圆形棕黑色种子。

用药部位（Medicinal Part）：

- **地下根茎形态**：根茎生长于泥土浅层，呈肥厚的鸡爪状分枝或单条圆柱形，节密生，上留有残留的叶柄基。
- **根茎颜色**：鲜采时外皮呈黄褐色或灰黄色，折断内部肉质呈极光鲜的亮黄色或橙黄色。
- **用药部位**：以其秋季采挖的干燥根茎入药。采挖后除去泥沙，烘干，撞去须根及泥沙（俗称“撞连”）。

黄芪

(中药材)

【别名】绵芪、北芪、膜芪、黄耆。

【来源】为豆科植物蒙古黄芪 *Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bge. 的干燥根。

【性味】甘，微温。

【归经】归脾、肺经。

【功效】补气固表，利尿托毒，排脓，敛疮生肌。

【主治】用于气虚乏力，食少便溏，中气下陷，久泻脱肛，便血崩漏，表虚自汗，气虚水肿，痈疽难溃或久溃不敛，疮口不愈。

【用法用量】9～30g。

【注意事项】脾胃积滞及湿阻中满者慎服，表实邪盛，内有积滞者忌服。

《神农本草经》原文

黄芪，味甘，微温。主病久欠创，排脓止痛，补虚，小兒百病。

1. 植株全貌 (生长期)



多年生草本植物。根系发达，茎直立，丛生，多分枝。

2. 茎 (中空，有细柔毛)



茎直立，中空，有细柔毛，老茎木质化。

3. 奇数羽状复叶



叶互生，奇数羽状复叶，小叶10~26片，椭圆形。

4. 花序 (总状花序)



总状花序腋生，花冠蝶形，淡黄色或白色。

5. 花 (豆科蝶形花冠)



花冠蝶形，旗瓣淡黄色，翼瓣白色。

6. 根部全貌 (鲜品)



直根系。根长而圆柱形，有分枝，入土深。

7. 根部全貌 (干品)



干燥后呈黄棕色或淡棕色，有细皱纹及横长皮孔。

8. 根头 (芦头)



根头部有茎痕及须根痕，习称“芦头”。

9. 根身 (主根)



主根细长，呈鞭状，质坚实，不易折断。

10. 断面特征



断面皮部淡黄色，木部淡黄色，形成层环明显。

11. 纵剖面 (纵纹及菊花心)



纵剖面有纵纹，中心常有放射状纹理，似“菊花心”。

12. 饮片：黄芪片 (切片)



呈椭圆形或类圆形，切面淡黄色或淡棕色。

13. 饮片：黄芪段 (切段)



呈圆柱形短段，表面黄棕色，有纵皱纹。

14. 饮片：黄芪节子



芦头及其下部的短段，习称“节子”或“芦头节”。

15. 饮片大小对比 (cm刻度尺)



长度对比，主根可达数十厘米至1米以上。

16. 产地对比 (道地药材)



山西 (正红芪) 内蒙古 (绵芪) 甘肃 (岷县芪)

不同产地黄芪在根形、色泽、质地略有差异。

17. 生长环境 (北方干旱地带)



喜凉爽干燥气候，耐寒，耐旱，怕涝，忌积水。

18. 根系深度 (示意图)



主根可深入地下1~2米，吸收深层矿物质和水分。

19. 药材性状总结



形状：根长圆柱形，下部较粗，上部较细，常有分枝，似长鞭状。

表面：黄棕色至淡棕色，有纵皱纹及横长皮孔。

质地：质坚实，不易折断。

断面：皮部淡黄色，木部淡黄色，形成层环明显。

气味：微弱，味微甜，嚼之微有豆腥味。

黄芪

- 全景构图与株型 (Overall Habit) ——【核心绘图抓手：奇数羽状复叶与淡黄蝶形花】：多年生草本，株高约 50~100 厘米。茎直立，上部有多分枝，被白色柔毛。最核心的视觉抓手是它的叶片：奇数羽状复叶，小叶 13~27 片，呈椭圆形或长圆状披针形，两面被白色柔毛。

- **地下部分与花果特写（Underground & Flower/Fruit Morphology）——【核心抓手：直立粗长黄棕色主根与下垂膨大豆荚】：**
- **地下根系：** 长有极其粗壮、垂直下伸的**长圆柱形主根**（即黄芪药材），长可达50~100 厘米，外皮淡黄棕色或灰黄色。
- **花与果实：** 夏秋季（6~8 月），叶腋抽出**总状花序**，开着蝶形的**淡黄色或浅黄白色花朵**；结出的荚果呈膜质膨大、半卵形，成熟时下垂。
- **生态环境背景（Ecological Background）：** 背景可设置为**盛夏时节，华北或西北地区（如山西浑源、内蒙古）向阳的山坡、草地或沙质丘陵**。在干燥充沛的阳光下，绿色的羽状复叶与淡黄色的花序交相辉映，地表疏松的土壤下隐约露出粗壮顺直的黄棕色主根。

野外一秒辨别口诀：

- “**紫花刺毛荚**” —► 甘草
- “**偶数六片叶，长镰刀荚**” —► 决明（决明子）
- “**膨大空心囊**” —► 黄芪
- “**串珠一串串**” —► 苦参

肉苁蓉

(中药材)

【别名】苁蓉、大芸、寸芸、疆芸。
【来源】为列当科植物肉苁蓉 *Cistanche deserticola* Y.C.Ma 的带鳞片肉质茎。
【性味】甘、咸、温。
【归经】归肾、大肠经。
【功效】补肾阳，益精血，润肠通便。
【主治】用于肾阳不足，精血亏虚所致的阳痿不举，宫冷不孕，腰膝酸软，筋骨无力，肠燥便秘。
【用法用量】9~15g。
【注意事项】脾胃虚弱及便溏者慎用。

《神农本草经》原文

肉苁蓉，味甘、温。主五劳七伤，补中，除茎中寒痛，补五脏，强阴益精，久服轻身益气，不饥延年。

1. 生境与寄主（沙漠梭梭林）



肉苁蓉寄生于沙漠地区梭梭（或红柳）根部，深埋地下生长。

2. 寄主植物：梭梭



主要寄生在梭梭（*Haloxylon ammodendron*）根部。

3. 寄主植物：红柳



也可寄生于红柳（*Tamarix* spp.）根部。

4. 地下寄生状态（未出土）



大部分时间深埋地下，吸取宿主根部的营养和水分。

5. 春季出土（初露头角）



春季气温回升，积蓄能量后破土而出。

6. 出土植株（整体）



肉质茎圆柱形，下部肥厚，表面密被鳞片。

7. 表面特征（鳞片状叶）



鳞片呈瓦片状排列，肉质，呈橘色至深褐色。

8. 不同生长阶段对比



随生长增大，颜色由浅变深，鳞片逐渐增厚。

9. 开花期（紫花型）



出土后迅速开花，花呈淡紫色，多轮生排列。

10. 开花期（黄花型）



亦有黄花品种，花冠喇叭状，密集着生。

11. 结果期



花冠结实，蒴果卵圆形，内含多数细小种子。

12. 地上部分枯萎（生命周期结束）



完成生殖后，地上部分逐渐枯萎死土，养分回流地下。

13. 采收（药材来源）



春季采收，除去泥沙，晒干或烘干入药。

14. 药材饮片（切片）



切片呈类圆形或椭圆形，表面灰棕色，切面淡黄棕色。

15. 药材性状（干品）



干品呈长圆柱形，表面鳞片状突起，质硬而韧。

16. 产地分布（主要产区）



主要分布于中国西北干旱、半干旱沙漠地区。

17. 主要鉴别特征

- 寄生草本，无叶绿素，靠寄生梭梭或红柳根部生存。
- 肉质茎圆柱形，肥厚多肉，表面密被瓦片状鳞片（退化叶）。
- 花序穗状，花冠喇叭形，紫色或黄色。
- 质硬而韧，断面皮部有多数点状维管束排列成环。



18. 药用与功效

- 味甘咸，性温，归肾、大肠经。
- 功效：补肾阳，益精血，润肠通便。
- 主治：阳痿不举，宫冷不孕，腰膝酸软，筋骨无力，肠燥便秘。
- 常与锁阳、巴戟天等配伍使用，增强补益之效。



肉苁蓉

属于列当科肉苁蓉属的多年生寄生草本植物。它自己没有叶绿素，无法进行光合作用，一生中绝大多数时间都深埋在干旱的沙漠地底。

- **寄生关系：** 它主要寄生在沙漠固沙植物梭梭树或红柳的根部，靠吸取宿主的营养和水分存活。

- **外形（“长满鳞片的肉质茎”）**：每年春天，当它积蓄了足够的能量，就会像竹笋一样从沙地里钻出来。露出来的肉质茎呈圆柱形，下部肥厚。最标志性的特征是，它的表面密密麻麻地覆盖着一层呈瓦片状排列的肉质鳞片（退化的叶子），看起来非常像一根长满鳞片的巨型褐色松果或“狼牙棒”。
- **开花**：钻出地面后，它会迅速开出淡紫色或黄色的喇叭状小花，花落结实后，地上的部分就会枯萎，再次等待下一轮的生长。

防风

（中药材）

别名：铜芸、屏风、百枝

学名：Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk.

科属：伞形科 (Apiaceae)
防风属 (Saposhnikovia)

用药部位：干燥根

采收加工：春、秋二季采挖未抽花茎或开花初期的根，除去须根及泥沙，晒至八成干，捆成小把，晒干入药。

生境与分布

- 喜凉爽、耐寒，耐旱，忌湿热。
- 多生于海拔200-2500米的山地、林缘、灌丛及向阳草坡。
- 主要分布于中国东北、华北、西北及内蒙古等地。

形态特征

- 多年生草本，高30-80厘米。
- 茎单生，自基部分枝较多，斜上升，表面有细棱脊。
- 叶三角状卵形，2-3回羽状深裂，顶端裂片披针形或线状披针形。
- 8-9月开花，复伞形花序顶生；花根小，白色，倒卵形。
- 9-10月结果，双悬果椭圆形，背面有5条明显棱脊。

1. 植株全貌（生境）

多年生草本，植株高30-80厘米，基部分枝多，斜上升。

2. 茎的特写

茎圆柱形，表面有细棱脊，基部分枝较多。

3. 基生叶（叶丛）

基生叶丛生，有扁平长柄；叶片三角状卵形，2-3回羽状深裂。

4. 叶片特写（正面）

2-3回羽状深裂，顶端裂片披针形或线状披针形。

5. 叶片特写（背面）

背面淡绿色，沿脉略被短柔毛。

6. 花序特写（复伞形）

复伞形花序顶生，花根小，花瓣白色，倒卵形。

7. 花的特写

花白色，花瓣倒卵形，根小，花柱基部略增厚。

8. 果实特写（未成熟→成熟）

双悬果，椭圆形，背面有5条明显棱脊。

9. 成熟果实（剖面）

果实剖面可见2分果具5条棱脊，内含油室。

10. 地下根（鲜品）

根呈长圆柱形或长圆锥形，下部渐细，微弯曲，长15-30厘米。

11. 根的特写

表面灰黄色或淡棕色，具横纹及细根痕，质地坚实。

12. 根的加工（过程展示）

鲜根采挖 → 除去须根、泥沙，洗净 → 晒至八成干 → 捆成小把 → 晒干入药

13. 药材性状（干品）

根条多弯曲，表面黄棕色或棕褐色，有纵皱纹及横向环纹。

14. 切片特写（干品）

切面皮部淡棕色，木部淡黄色，可见放射状纹理及油室点。

15. 生境环境

生于山地、林缘、灌丛及向阳草坡，喜凉爽、干燥环境。

16. 功效与主治

祛风解表，胜湿止痛，止痉。

主治：风邪感冒，头痛身痛，风溼痹痛，肢体拘挛，破伤风等。

防风

是伞形科防风属的多年生草本植物，主要产于我国东北及内蒙古地区（其中以黑龙江泰来、吉林等地出产的“关防风”最为地道，品质最佳）。

- **茎（Stem）：** 植株高 30–80 厘米。茎单生，自基部分枝较多，斜上升，表面有细棱脊。
- **叶（Leaves）：** 基生叶丛生，有扁平长柄；叶片三角状卵形，2–3 回羽状深裂，顶端裂片披针形或线状披针形。
- **花（Flowers）：** 8–9 月开花。**复伞形花序**顶生；花极小，花瓣白色，倒卵形。
- **果实（Fruits）：** 9–10 月结果。双悬果成熟时椭圆形，背面有 5 条明显棱脊。
- **根部与用药部位（Roots & Medicinal Part）：**
- **地下根形态：** 根呈长圆柱形或长圆锥形，下部渐细，微弯曲，长 15–30 厘米。
- **用药部位：** 春、秋二季采挖未抽花茎或开花初期的根，除去须根及泥沙，晒至八成干，捆成小把，晒干入药。

续断

(中药材)

别名：接骨草、续接骨、川续断

学名：Dipsacus asper Wall.ex C.B.Clarke

科属：川续断科 (Dipsacaceae)
续断属 (Dipsacus)

用药部位：干燥根

采收期：秋季茎叶枯萎后采挖根。
除去泥沙和根头，
微炕或半干后堆置“发汗”
至内部变绿色或淡褐色，
再烘干或晒干入药。

生境与分布

- 喜温暖、阳光充足的环境，耐寒、耐旱，忌水涝。
- 多生于海拔500-3000米的山坡、山谷、林缘、草地及路旁等地。
- 主要分布于中国四川、贵州、云南、西藏等地。

形态特征

- 二年生或多年生草本，高100-200厘米。
- 茎直立，具棱角与倒生小刺，分枝较多。
- 叶对生；茎生叶羽状深裂或全裂，裂片披针形，边缘有粗锯齿，两面被硬毛，基部结合抱茎。
- 7-9月开花，头状花序球形或卵球形。顶生；总苞片叶状，具刺毛；花冠淡紫色或白色。
- 9-10月结果，瘦果倒金字塔形，有棱角。

头状花序 (顶生)

茎具棱角与倒生小刺

叶对生

叶基部结合抱茎

叶基部结合抱茎

1. 植株全貌 (生境)



生长于山坡、林缘、草地等地，植株高100-200厘米。

2. 茎特写 (有棱刺毛)



茎直立，四棱形，具棱角与倒生小刺，分枝较多。

3. 叶片特写 (对生叶)



叶对生；羽状深裂，裂片披针形，边缘有粗锯齿，两面被硬毛。

4. 叶片特写 (基部抱茎)



叶基部扩大并结合抱茎，形成翼状。

5. 花序特写 (头状花序)



头状花序球形或卵球形，顶生，总苞片叶状，具刺毛。

6. 花特写 (小花)



花冠淡紫色或白色，二唇形，小巧紧密。

7. 果实特写 (瘦果)



瘦果倒金字塔形，有棱角。

8. 果实特写 (瘦果放大)



瘦果表面有纵棱和细毛。

9. 果实剖面 (瘦果内部)



内部有胚乳和胚。

10. 地下根 (新鲜)



根呈长圆柱形，微弯曲，常散生须根，表面灰褐色或黄褐色，有纵皱纹。

11. 根横切面 (鲜品)



切面皮部黄白色，木部淡黄绿色，形成层环明显。

12. 根横切面 (发汗后)



“发汗”后内部变绿色或淡褐色。

13. 生境环境



生于海拔500-3000米的山坡、林缘、草地及路旁等地。

14. 产地分布



主要分布于四川、贵州、云南、西藏等地。

15. 采收与加工过程



秋季采挖 → 除去泥沙和根头 → 微炕或半干 → 堆置“发汗”至内部变色 → 烘干或晒干入药

16. 功效与主治

补肝肾，强筋骨，续折伤，止崩漏。
主治：腰腿酸软，脚膝疼痛，跌扑损伤，骨折瘀伤，肝胃不足，崩漏下血。



续断

是忍冬科（或川续断科）川续断属的多年生草本植物。它极度喜肥、喜湿，多野生于山坡、草丛或灌木丛中，以四川、湖北、云南所产的“川续断”最为地道。

原植物全貌形态（Plant Morphology）：

- **茎 (Stem)**：植株高可达 100-200 厘米。茎直立，具棱角与倒生小刺，分枝较多。

- **叶（Leaves）：**叶对生；茎生叶呈羽状深裂或全裂，裂片披针形，边缘有粗锯齿，两面被硬毛，基部结合抱茎。
- **花（Flowers）：**7-9 月开花。头状花序球形或卵球形，顶生；总苞片叶状，具刺毛；花冠淡紫色或白色，小巧紧密。
- **果实（Fruits）：**9-10 月结果。瘦果呈倒金字塔形，有棱角。
- **根部与用药部位（Roots & Medicinal Part）：**
 - **地下根形态：**根呈长圆柱形，微弯曲，常数条簇生，表面灰褐色或黄褐色，有明显的纵皱纹及浅沟痕。
 - **用药部位：**秋季采挖地下根，除去泥沙和根头，微炕或半干后堆置“发汗”至内部变绿色或淡褐色，再烘干或晒干入药。



决明子

属于豆科决明属的一年生亚灌木状草本植物。它生命力极强，多生长在山坡、旷野或路旁。

- **叶子（倒卵形双生叶）：** 它的叶子是羽状复叶，小叶通常有 3 对，呈**倒卵形**（一头大一头小，像倒过来的鸡蛋），表面光滑。
- **花与果荚（“长长的豆荚”）：** 夏秋季节，它会开出金黄色的小花。花落后，会长出**细长、微弯的圆柱形荚果**，长可达 15 厘米。成熟后，荚果变成深褐色，里面整整齐齐地排列着几十颗种子，这便是决明子。

丹参

(中药材)

【来源】为唇形科植物丹参 *Salvia miltiorrhiza* Bge. 的干燥根和根茎。

【性味】苦，微寒。

【归经】归心、心包、肝经。

【功效】活血祛瘀，通经止痛，清心除烦，凉血消痈。

【主治】用于胸痹心痛，脘腹胁痛，癰疽积聚，热病心烦，不眠，肝郁胁痛，热病疮痈，癰瘡痰核。

《神农本草经》原文
丹参，味苦，微寒。主心腹肠鸣幽幽如走水，寒热积聚，破症除癰，止痛，利小便，益气。

【用法用量】3～10g。
【注意事项】脾胃虚寒者慎用。

轮伞花序排列成穗状

花冠紫蓝色唇形

茎四棱形密被柔毛

叶对生奇数羽状复叶小叶边缘有锯齿

根数条丛生细长圆柱形外皮砖红色或朱红色

1. 生境与植株

多生于山坡、路旁、向阳灌丛中。

2. 叶 (奇数羽状复叶)

小叶5~9对，卵形或卵状披针形，边缘有锯齿。

3. 花 (轮伞花序)

夏季开花，花冠紫蓝色，唇形，上唇2裂，下唇3裂。

4. 鲜根 (刚挖出)

根数条丛生，细长圆柱形，外皮砖红色，颜色鲜艳。

5. 干燥根及根茎

干燥后表面红棕色或朱红色，具纵皱纹。

6. 根头 (根茎部位)

根茎短粗，残存茎基及叶柄残基，呈类圆形突起。

7. 横切面特征

木栓层
皮层
韧皮部
形成层环明显
木质部放射纹
髓部

皮部红棕色，木部淡黄色，形成层环呈类圆形，木质部具放射状纹理。

8. 纵切面特征

皮部
形成层环
木质部
髓部

纵切面可见形成层环明显，木质部呈放射状纹理。

9. 饮片 (丹参片)

切片呈圆形或类圆形。表面红棕色，切面淡黄色或棕黄色，气微，味微苦。

10. 粉末特征

石细胞
木栓细胞
导管
纤维
韧皮细胞含红棕色分泌物 (丹参酮)

粉末红棕色，石细胞多呈类圆形或长圆形，壁厚；导管多为螺旋导管。

11. 性状鉴别要点

- 表面红棕色或朱红色，具纵皱纹及支根痕。
- 质坚硬，不易折断，断面平坦，粉性。
- 切面皮部红棕色，木部淡黄色，形成层环明显，木质部具放射状纹理。
- 气微，味微苦。

12. 易混品比较

丹参
表面红棕色，质坚硬，断面皮部红棕色，木部淡黄色。

红根
表面棕褐色，质较松，断面皮部黄白色，木部不呈放射状纹理。

13. 主产地分布

主产于山东莒县 (鲁丹参)、四川中江 (川丹参)、中条山等地。

丹参

是唇形科鼠尾草属的多年生草本植物。它喜欢温暖湿润的气候，多生长在山坡、路旁或向阳的灌木丛中。以山东莒县、四川中江、中条山等地出产的“川丹参”、“鲁丹参”最为地道。

- **茎叶（开紫花的小草）：** 它的地上茎是方形的（典型的唇形科特征），上面长满了密密的柔毛。叶子是奇数羽状复叶。夏天时，它会开出一串串深紫蓝色的小花，在野外非常漂亮，远看像一小片薰衣草。
- **地下部分（“赤色朱砂根”）：** 我们入药的是它的干燥根和根茎。把泥土洗净后，它的根通常数条丛生在根茎上，呈细长圆柱形。最惊艳的是它的颜色，外皮呈现出极其鲜艳的砖红色、红棕色或朱红色，在中药根类药材里红得非常纯粹。

茜草

（中药材）

【别名】 茜根、红茜、血见愁、地血、红根草、过山藤、四棱草

【学名】 *Rubia cordifolia* L.

【科属】 茜草科 茜草属

【性味归经】 苦、寒。
归肝、心经。

【功效】 凉血止血，祛瘀通经，清熱解毒。

【主治】
用于血热出血，吐血，便血，尿血，崩漏，月经过多；
瘀滞腹痛，风湿痹痛，疮痈肿毒，
痛疽发背，筋骨损伤。

【用法用量】 6～15g。

【采收加工】 秋、冬二季采挖根部，
除去泥沙，晒干或切片晒干。

攀援状态：依附于灌木、藤本或岩石上生长

1. 生境与分布

生于山坡灌丛、林缘、路旁、沟边及草地等。
分布极广，全国大部分地区均有产出；
主产于河南、陕西、山西、河北、山东等地。

2. 茎的特征

多年生攀援草本。茎呈四棱形，棱上有小刺，触之易划伤手，故俗称“血见愁”。

3. 叶的特征

叶4～6片轮生，卵形或狭卵形，基部心形。叶柄及叶片背面的主脉上均有倒生的小刺，叶缘及叶面均粗糙。

4. 花的特征

8～9月开花。聚伞花序顶生或腋生；花小，淡黄色或白色，花冠5裂。

5. 果实的特征

9～10月结果。浆果状果实球形，成熟时变成黑色。

6. 根部特征（原植物）

根茎粗短，丛生多数细长的圆柱形根，根皮红棕色或暗红色。

7. 药材加工过程

① 生长明植株（夏、秋季）
② 割取地上部分
③ 晒干地上部分
④ 采挖根部
⑤ 除去泥沙杂质
⑥ 晒干或切片晒干

8. 饮片性状

茜草段	茜草片	茜草粉
圆柱形短段，表面红棕色或暗红色，有纵皱纹及细根痕，质坚硬，断面皮部红棕色，木部黄色。	切片呈圆形或椭圆形，表面红棕色，切面皮部红棕色，木部黄色。	红棕色或暗红色粉末，气微，味淡。

9. 显微鉴别

① 木栓细胞 ② 初皮部 ③ 木质部导管 ④ 草酸钙簇晶 ⑤ 非腺毛

10. 易混品比较

项目	茜草（本品）	鸡矢藤	忍冬藤
茎	四棱形，有倒生小刺	圆柱形，无棱及小刺	圆柱形，无棱及小刺
叶轮生片数	4～6片轮生	通常4片轮生	通常2片轮生
叶形	卵形或狭卵形，基部心形	卵形，基部圆形	卵形或长卵形
花	淡黄色或白色，聚伞花序	白色，聚伞花序	白色或淡黄色，腋生
果实	浆果球形，熟时黑色	浆果卵圆形，黑色	浆果卵圆形，蓝黑色
根部（药材）	根皮红棕色，富含茜草素	根皮黄棕色	根皮灰棕色

11. 主要产地

全国大部分地区均有产出，
主产于河南、陕西、山西、河北、山东等地。

12. 性状鉴别要点

① 茎四棱形，棱上及叶柄、叶背主脉均有倒生小刺。
② 叶4～6片轮生，基部心形，叶背主脉有倒生小刺。
③ 根茎粗短，丛生多数细长根，根皮红棕色或暗红色。
④ 断面皮部红棕色或暗红色，木部黄色。
⑤ 味淡，微苦，久嚼有粘性。

13. 常见主治应用

- 凉血止血：吐血、咯血、便血、尿血、崩漏等。
- 祛瘀通经：瘀滞腹痛、经闭、月经过多。
- 清熱解毒：疮痈肿毒、痛疽发背。
- 筋骨损伤：跌打损伤。

茜草

茜草在我国分布极广，全国大部分地区均有产出，主产于河南、陕西、山西、河北、山东等地：

- **茎 (Stem)：** 多年生攀援草本。茎呈**四棱形**，棱上有**倒生的小刺**（触之易划伤手，故俗称“血见愁”）。
- **叶 (Leaves)：** **4-6 片轮生 (Whorled)**，呈卵形或狭卵形，基部心形，**叶柄及叶片背面的主脉上也有倒生的小刺**。
- **花 (Flowers)：** 8-9 月开花。**聚伞花序**顶生或腋生；花小，**淡黄色或白色**，花冠 5 裂。
- **果实与根部 (Fruits & Roots)：**
 - **果实：** 浆果状果实球形，成熟时变成**黑色**。
 - **根部 (入药部位)：** 根茎粗短，丛生多数细长的圆柱形根。**根皮呈红棕色或暗红色**，富含茜草素等红黄色素（古代亦作为重要的天然红色染料）。

五味子

(中药材)

Schisandrae Chinensis Fructus

(木兰科) 五味子属

藤茎

木质藤本，暗褐色，缠绕攀援

叶

倒卵形或宽椭圆形，边缘有稀疏小锯齿

果实

穗状下垂的浆果，秋季成熟时红艳晶莹似红宝石

1. 生境与植株

多生于密林、山谷或溪流旁，攀援于大树上生长。

2. 叶片特征

叶互生，倒卵形或宽椭圆形，先端短尖，边缘有稀疏小锯齿。

3. 花 (雄花、雌花)

雄花

雌花

花小，黄绿色，单性，雌雄异株，5~6月开花。

4. 果实 (未成熟)

果实初为绿色，逐渐变为淡红色。

5. 果实 (成熟)

果实成熟时红艳晶莹，似红宝石，8~9月成熟。

6. 果穗特征

果实呈穗状下垂排列，单个为肉质浆果。

【来源】 为木兰科植物五味子 *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. 的干燥成熟果实。

【性味】 酸、甘、温。

【归经】 归肺、心、肾经。

【功效】 收敛固涩，益气生津，补肾宁心。

【主治】 用于久咳虚喘，梦遗滑精，自汗盗汗，津伤口渴，内热消渴，心悸失眠。

【用法用量】 3~10g。

【注意事项】 外感咳嗽及有实邪者忌服。

7. 药材 (干燥果实)

呈类球形，表面皱缩，红棕色至暗红色。

8. 药材特征 (放大)

表面皱缩，有光泽

内有种子 1~2粒

表面皱缩有光泽，内有1~2粒种子，气微，味酸、甜、辛、苦、咸。

9. 纵切面

果皮

种子

果肉 (中果皮)

果皮柔软，种子肾形，淡黄色，外有白色种皮。

10. 粉末特征

棕红色粉末，具特异香气，味酸、甜而微苦。

11. 鉴别特征

- 果皮表皮细胞呈多角形，其外壁角质层纹理明显。
- 中果皮细胞含草酸钙砂晶。
- 种子表面有网状纹理。

表皮细胞

草酸钙砂晶

种子表面

12. 易混品比较

五味子

南五味子

五味子颗粒较大，表面红紫色或暗红色，有光泽，味酸、甜、辛、苦、咸。

南五味子颗粒较小，表面紫红色，味酸、辛、苦。

13. 产地分布

主产于东北三省 (黑龙江、吉林、辽宁)，以及内蒙古东部、河北、山西等地。

《神农本草经》原文


五味子，味酸，平。主益气，咳逆上气，补五劳七伤，久嗽，久渴，止泻，益精，强阴。

五味子






是木兰科五味子属的多年生落叶木质藤本植物。它喜欢冷凉湿润的气候，多野生于密林、山谷或溪流旁。

- **藤蔓与叶片：** 它的藤茎坚韧，表面呈暗褐色，常常缠绕在其它大树上向上攀爬。叶子呈倒卵形或宽椭圆形，边缘有稀疏的小锯齿。
- **果实（“丛林红宝石”）：** 到了秋天，五味子会结出一串串穗状下垂的肉质浆果。成熟时的果实红艳欲滴、晶莹剔透，远看极其像一串串精美的红提子或野葡萄。

Inulae Flos
(菊科) 旋覆花属



旋覆花，味辛，温。主咳逆上气，消痰热结气，鼻息奔豚，胸中痞热，惊痫，女子乳闭。



- **花序：**属于典型的**头状花序**，形似一个微缩的太阳。外圈长着一轮金黄色的**舌状花**，像放射状的光芒；内圈则是密密麻麻的**管状花**，聚拢成一个圆盘。
- **名字的浪漫生动：**古人称其“旋覆”，一说形容它外圈金黄的花瓣带有**向内微微旋转**之势；另一说是因为它下方的总苞片**层层环绕重叠**，恰似一个小碗倒扣（覆）在花盘下方。

蛇床子

(中药材)

【别名】
蛇床实、野胡萝卜、野芜荑、蛇床子实等。

【学名】
Cnidium monnieri (L.) Cusson

【科属】
伞形科 (Apiaceae)
蛇床属 (Cnidium)

【用药部位】
成熟果实 (双悬果)

【采收加工】
8~9月果实成熟呈黄褐色时
采制植株，晒干，打下果实，
除去杂质。

【性味归经】
辛、苦，温。
归肾、脾经。

【功效主治】
燥湿祛风，杀虫止痒。
用于湿疹疮癣，阴痒带下，
风疹瘙痒。

1. 全株植物 (花圃)

约 30 ~ 80 cm

2. 叶片特征 (放大)

3. 花序特征 (复伞形花序)

4. 花特征 (放大)

5. 果实特征 (成熟双悬果)

6. 果实放大

7. 根部特征 (非入药部位)

主根细长，圆柱形，下部有分枝；
表面黄白色或淡褐色。

8. 药材 (蛇床子)

呈长椭圆形，两端稍尖，表面黄褐色或棕褐色，
有5条明显棱线，中间二棱较大。

1 cm

9. 与防风、川芎、独活、白芷的主要区别

蛇床子	防风	川芎	独活	白芷
植株较矮小，叶细碎如羽毛；入药部位为成熟果实。	叶片较宽，二至三回羽裂；入药部位为长圆柱形根。	叶片细碎，茎有膨大盘节；入药部位为拳状结节根茎。	植株高大，二回或三回羽状复叶；入药部位为粗大根。	叶片大，茎紫色；入药部位为长圆锥形根。

★ 蛇床子以成熟果实入药，防风以根入药，二者功效及临床应用不同，注意鉴别使用。

蛇床子

是伞形科蛇床属的一年生草本植物。它在我国分布极广，多野生于田边、路旁、草地或河滩。它的长相是典型的伞形科家族面孔（和防风、芹菜是远亲）：

- **茎 (Stem)**：植株高 30-80 厘米。茎直立，具纵条棱，分枝较多，中空。
- **叶 (Leaves)**：叶互生，2-3 回羽状全裂，小叶片线状披针形，边缘深裂，外观细碎如茴香叶。

- 花（Flowers）： 4-7 月开花。复伞形花序顶生或侧生；小花白色，花瓣 5 块，倒心形。
- 果实与用药部位（Fruits & Medicinal Part）：
- 果实形态： 双悬果，椭圆形，长 2-4 毫米，直径约 2 毫米。
- 用药部位： 8-9 月果实成熟呈黄绿色时采收割取全株，晒干，打下果实，筛净杂质即得蛇床子。

茵陈

（中药材）
Artemisiae scopariae Herba
（菊科）蒿属

秋季植株（茵陈蒿）
茎高可达1米以上，绿色，无白毛，多分枝。

早春幼苗（绵茵陈）
植株矮小，全株密被银白色绒毛，蜷缩成团状。

叶
二回羽状深裂，裂片线形或线状披针形，两面有毛。

根
主根明显，侧根多。

【来源】 为菊科植物茵陈蒿 *Artemisiae scopariae* Waldst. et Kit. 的干燥幼嫩全草。

【性味】 苦、辛，微寒。

【归经】 归脾、胃、肝、胆经。

【功效】 清热利湿，退黄疸。

【主治】 用于湿热黄疸，尿黄便干，湿疹瘙痒。

【用法用量】 3~15g。

【注意事项】 脾胃虚寒者慎用。

《神农本草经》原文

茵陈，味苦，寒。主五脏邪气，胃中热气，利水道，杀三虫。久服轻身，耐老不饥。

1. 早春幼苗（绵茵陈）——药用精华

刚出土的幼苗，密被银白色绒毛，蜷缩成团，极其娇嫩。

植株高6~10厘米，幼嫩，全身银白色绒毛。

叶片二回羽状深裂，密被绒毛，呈银灰色。

采收提示

公历3~4月份采挖，以幼嫩、绒毛多、色银白者为佳。

过迟则长成绿色植株，药效大减。

2. 秋季植株（茵陈蒿）——失去药效

夏秋季节，植株长高，可达1米以上，成片生长。

叶片绿色，无白毛，裂片狭长，质地较硬。

头状花序，排列成圆锥花序，花小，黄色。

茎直立，多分枝，木质化，失去药用价值。

辨别要点

早春“绵茵陈”：矮小、银白色、毛茸茸，柔软。

秋季“茵陈蒿”：高大、绿色、无毛，硬梗，开黄花。

3. 药材（干燥全草）

呈团状或乱团状，灰白色或灰绿色，密被绒毛，质脆，易折断。

4. 药材（纵切面）

茎中空，表面有纵棱，密被绒毛。

5. 药材（横切面）

茎中空，周边有棱，密被绒毛。

6. 饮片（茵陈）

切段生用，保留白色绒毛。

7. 粉末特征

灰绿色或黄绿色粉末，遇水润湿后黏滑。

8. 显微特征

叶表面观
表皮细胞及气孔

叶横切面
非腺毛多细胞

茎横切面
中空，具棱角

9. 易混品比较

茵陈（正品）
全株密被银白色绒毛，质脆，易折断。

青蒿（易混品）
绿色或灰绿色，无白毛，质硬，气味特殊。

10. 主要产地

主产于河北、山东、河南、陕西、山西、江苏、安徽等地。

11. 性状鉴别要点

- 幼嫩植株，密被银白色绒毛。
- 茎中空，表面有纵棱。
- 味苦，微辛，微寒。
- 以色灰白、绒毛多、质脆者为佳。

茵陈

是菊科蒿属的多年生草本植物。它极度耐旱、耐寒，多野生于向阳的山坡、路旁或沙质荒地上。

- **早春的“绵茵陈”（药用精华）：** 刚开春（公历 3、4 月份）时，它的幼苗刚刚从土里钻出来，高不过 6~10 厘米。这时候的幼苗长得**极其娇嫩，全身蜷缩在一起，表面密密麻麻地包裹着一层银白色的绢毛**。在野外看，就像一团团银灰色、毛茸茸的小棉球。
- **秋天的“茵陈蒿”：** 如果到了夏天和秋天，它会长到一米多高，开出密集的小花，全身的白毛褪去，变成绿色、长满硬梗的普通野草。这时候它已经失去了退黄的药效，只能拿来当柴烧了。



王不留行

是石竹科麦蓝菜属的一年生或二年生草本植物（其中药正名为**麦蓝菜**）。它生命力顽强，多野生于草地、路旁或麦田间。

- **茎（Stem）**：植株高 30~70 厘米。茎直立，单生，上部分枝，全株光滑无毛，表面被白粉呈粉绿色。
- **叶（Leaves）**：叶对生；叶片卵状披针形或披针形，基部合生而**抱茎**，全缘，表面同样被白粉。
- **花（Flowers）**：5~7 月开花。二歧聚伞花序顶生；花萼卵状圆筒形，具 5 条绿色宽翅；花瓣 5 块，粉红色或淡红色。
- **果实与用药部位（Fruits & Medicinal Part）**：

- **果实形态：** 蒴果包于宿存萼内，成熟时顶端 4 齿裂。
- **用药部位：** 6-7 月果实成熟、果皮呈黄褐色而种子变黑色时采割全株，晒干，打下种子，除去杂质，晒干入药。

肉桂

(中药材)

Cinnamomum Cassia

(樟科) 肉桂属



花序
圆锥花序，花小，黄绿色或淡黄色。

叶
椭圆形或长椭圆形，革质，全缘，表面深绿色，有光泽。

树皮(桂皮)
树皮灰褐色，内皮剥开后呈红褐色，香气浓郁。

枝条
嫩枝紫褐色，具纵棱。

1. 植株全貌



常绿乔木，高可达10~15米，树冠圆整，枝叶茂密，分布于南方山地。

2. 树皮特征



树皮灰褐色，纵裂；内皮红棕色，剥开后有浓郁香气。

3. 叶片特征



叶互生，革质，椭圆形或长椭圆形，全缘，离基三出脉，基部圆形或钝。

4. 花序与花



圆锥花序腋生，花小，黄绿色或淡黄色，花被片6枚，雄蕊9枚。

5. 果实特征



核果近球形，成熟时紫黑色，果托杯状，宿存。

6. 枝条特征



嫩枝紫褐色，具纵棱，皮孔小而稀，具香气。

7. 树皮剥离(桂皮)



剥去外皮后，内皮呈红褐色，油性大，香气浓烈。

8. 肉桂/桂皮卷筒



干燥树皮卷成圆筒状或槽状，外表灰褐色，内表面红棕色。

9. 桂皮断面(横切面)




断面呈层状结构，栓皮层散列，石细胞层明显，韧皮部红棕色。

10. 桂皮断面(纵切面)



纵切面可见石细胞呈长方形或多角形，排列成数列。

11. 桂皮显微特征




石细胞类圆形或长圆形，壁厚；分泌细胞含桂皮油等。

12. 桂皮粉末特征



棕黄色或棕褐色粉末，具香气，味辛辣，微甜，并有清凉感。

13. 显微特征(粉末)



石细胞多角形，壁纤维长梭形，壁薄，草酸钙结晶成柱状，厚膜状孔明显。有的具壁孔。图块状。

14. 易混品比较



肉桂(正品) 官桂 阴香
肉桂卷筒紧密，官桂卷筒较松，阴香表面黑褐色，薄均匀，香气浓烈。外表灰黑色。味淡，香气弱。

15. 主要产地



主产于广西、广东、云南、福建、江西等地，以广西产量最多，质量最佳。

16. 性状鉴别要点

- 呈卷筒状或槽状，长短不一。
- 外表灰褐色，粗糙，有细纵皱纹。
- 内表面红棕色，有细纵纹。
- 质脆，易折断，断面层状。
- 气香浓烈，味辛辣微甜，稍有麻舌感。

【来源】 为樟科植物肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl 的干燥树皮。

【性味】 辛、甘，大热。

【归经】 归肾、脾、心、肝经。

【功效】 补火助阳，引火归源，散寒止痛，温经通脉。

【主治】 用于肾阳不足，命门火衰，阳痿宫冷，腰膝冷痛，虚阳上浮，眩晕耳鸣，心腹冷痛，寒凝血滞，经闭痛经，寒湿痹痛。

【用法用量】 2~6g，宜后下。

【注意事项】 阴虚火旺及热病忌服。

《神农本草经》原文

肉桂，味辛，大热。主五脏沉冷，邪气结积，心腹冷痛，霍乱，腹中雷鸣，干霍悸痛，出汗，止泻，通利血脉，止痛，温中，补不足，益精气，坚筋骨。

肉桂树

- **独一无二的“离基三出脉”叶片：** 它的叶子是厚硬的革质长椭圆形，表面有光泽。翻到背面可以看到非常清晰、隆起的三条纵向主脉（从叶片基部上方不远处同时分出，直达叶尖）。
- **自带浓郁香气的“肉红内衬”树皮：** 它的树皮外表呈灰褐色，但如果剥开外皮，里面会露出肉红色或红棕色的厚实皮层。

- **一揉即散的灵魂嗅觉：** 摘一片肉桂叶用手大力揉碎，会立刻释放出非常浓郁、强烈且特异的肉桂醛香气（混合了樟脑和甜辣的传统肉桂香）。
- **形似“小墨水豆”的果实：** 它的果实成熟后是深紫黑色的椭圆形浆果，基部包裹着一个杯状果托，看起来就像一粒粒插在底座上的微型墨水豆。

松脂

(中药材)

Pini Resina
(松科) 松属植物

叶
Pine Needles

花序(雄球花)
Male & Female
Cones

采脂口
Tapping Cut

叶(针叶)
Pinus densiflora

树干
Bark

采脂口
Tapping Cut

粗松脂
(Raw Resin)

- 生壤与植株**
多干种植。林下疏垦中，分有于我商前方各署，又以阴南、西商、自南特等常急。
- 采脂工序**
霍通植株稀枝大小小木、采伐立V工序。聚着在丁面肌聚上、预知、精能绿色遇透今。
- 收集粗松脂**
收集集粗脂脂脂，假脂脂脂脂脂脂按脂交脂脂脂，预知脂脂脂脂脂脂脂脂脂。
- 针叶与球果时节**
假生生伞甲平半。花粉、白色丝线、针叶闻耶。先叶输聚聚聚、花、色花花，花期6-6月。
- 粗松脂外观**
粗松脂外观，脂脂、生熟、按致脂脂，生物不致脂用。
- 提炼工序**
提纯工序的熬热炭炭出炭。投入脂脂，进传蒸灼脂脂加重。
- 松节油收集**
松节油 - Turpentine oil
- 过滤残渣**
过滤残渣竹管干干可中的白色残液。
- 松香(原药材)**
鲜至酷白色，松胶干片，较轻，核富含水分。
- 断面特征**
断面面白白色，孔聚唇，中空或夹式或波面白白色。
- 炮制松香**
炮制松香，推散炭屑脂脂脂，消速脂有调聚脂的脂脂，配用脂脂的致香，并用无脂脂脂脂脂。
- 饮片(切片/颗粒)**
丝成丝，建建图形小片，枚升，切片并颗粒。

【来源】为五加科植物**Terrapana papyrifera** (Hook.) K.Koch ex Koidz.的干燥茎髓。

【性味】甘、淡、微寒。

【归经】肺、胃、肾经。

【功效】清热、利尿、通乳。

【主治】小便不利，水肿腹满，乳汁不通。

【用法用量】4~10g。

【注意事项】脾胃虚寒及气虚无津者慎用。

《神农本草经》原文
松脂，味苦，温。主疽，恶疮，疗肿，恶肉。生肌肉，止痛，除风湿。利耳目，强筋骨。

13. 易混品种对比

松香(本品)	松节油(蒸馏液)	琥珀(化石树脂)
松香，半透明，琥珀色，质脆，断面无。	松节油，透明液，质脆，指捻粘手。	琥珀，棕黄、棕褐色，气特异，味微苦。

14. 主要产地

主要产于贵州、广西、四川、福建、广东等地。
云南市、广东、福建省产产地。

15. 性状鉴别要点

- 透明或半透明，琥珀色，质脆，
- 断面有玻璃光泽。
- 指捻粘手。
- 气特异，味微苦。

松脂

来源于松科松属多种植物（如马尾松、油松等）的渗出树脂。

- **大自然的创可贴：**当松树的树干受到刀砍或虫咬受到损伤时，为了保护伤口、防止木质腐烂，树皮的导管里就会分泌出一种黏稠的、黄白色的液体，这就是原始的松脂。
- **药材加工：**药工将这种黏稠的液体收集起来，经过蒸馏（分离出松节油），剩下的熔融物冷却凝固后，就变成了坚硬的固体——**松香**。

辛夷花

(中药材)

Magnolia flos (辛夷)

(木兰科) 玉兰属



花蕾
茸毛
plumier flout
花梗
dormant bud
花瓣
花梗

【来源】为五加科植物通脱木 *Tetrapanax papyriferus* (Hook.) K.Kooch ex Koidz. 的干燥花蕾。

【性味】甘、淡、微寒。

【归经】肺、胃、肾经。

【功效】宣肺通窍、散风止痛。

【主治】小便利、水腫脹滿、乳汁不通。

【用法用量】4~10g。

【注意事项】脾胃虛寒及氣虛津液者慎用。

《神農本草經》原文

通草、味甘、微寒。主溫症、身熱、寒汗、利小便、除水氣、通乳汁。

1. 生境与植株



多生于山谷、林下或灌丛中，分布于我国南方各省，又以贵州、广西、云南、边陲等省。

2. 植株特征



常绿灌木或小乔木，高可达3~6米，茎秆直立，偶有丛生大叶，厚如一册。

3. 花蕾细节



花蕾细长，呈圆锥形，具鳞片。

4. 开花过程



遇水复生形花序，花小，白色或淡黄，花梗。花期4~6月。

5. 花序特征



花序特征，聚伞花序，花中半生，花序~6月。

6. 采收季节



秋季或冬季，选取健壮植株，切取新蕾，泡出嫩芽。

7. 鲜花蕾外观



鲜花蕾花蕾干，发硬时何色，具等子外观。

8. 干燥花蕾



干燥花蕾，鳞片、瘦弱、质脆、干燥花蕾。

9. 断面特征




鲜茎髓白色，截断多孔，质轻，富含水分。

10. 饮片特征



断面特征，切维连切片，微而收缩，富含水分。

11. 鉴别点



通草胚形样花，微灰厚，乳白色，中空或近中空。

12. 包装与切段



切或段，呈圆柱形小段，质轻，易折断。

13. 易混品种对比

辛夷 (本品)



孔较大，质轻，断面白色，薄而脆。

竹笋 (禾本科植物笋)



孔眼较小，断面呈白色，有竹节。

木通 (木通科)



孔眼小，断面不平整，味苦。

14. 主要产地



主要产于贵州、云南、四川、福建、台湾等地，生于山谷、林下或灌丛中。

15. 性状鉴别要点

- 全体类白色或淡黄白色，质轻，易折断。
- 断面白色，海绵状，孔眼多，中空或半中空。
- 气微，味淡。
- 以个大、质轻、孔眼多者为佳。

辛夷花

来源于木兰科木兰属植物望春玉兰、玉兰或武当玉兰的干燥花蕾。它其实就是我们日常生活中非常熟悉的玉兰花的花骨朵。

- **没有叶子先开花：**它是落叶乔木。在早春冬末、叶子还没长出来的时候，光秃秃的树枝上就会挺立着一个个饱满的花蕾。
- **严冬里的“羽绒服”：**辛夷花蕾在寒冬里孕育，为了不被冻坏，它的外苞片上密密麻麻地长满了长茸毛。远远看去，就像每个花骨朵都穿上了一件厚厚的灰绿色羽绒大衣。
- **采收时机（核心）：**必须在**早春花蕾未开放时**采收。如果等花瓣完全盛开，挥发油散尽，它就变成了供人观赏的玉兰花，不再具备药用价值了。

杜仲

（中药材）
Eucommiae Cortex
（杜仲科）杜仲属
植物杜仲
Eucommia ulmoides Oliv.

植物形态

落叶乔木，高10~20米。
树皮灰褐色，纵裂。
小枝有皮孔。喜生于山地林中，分布于四川、贵州、云南、湖南等地。

叶
卵形或椭圆形，边缘有细齿，叶面光滑。

花与果实
花小，淡黄绿色，成腋生聚伞花序。果实为翅果，淡褐色，具翅。

【来源】为杜仲科植物杜仲 *Eucommia ulmoides* Oliv. 的干燥树皮。

【性味】甘，温。

【归经】归肝、肾经。

【功效】补肝肾，强筋骨，安胎。

【主治】用于肝肾不足，腰膝酸软，筋骨无力，高血压，胎动不安等。

【用法用量】6~15g。

【注意事项】湿热内盛及阴虚火旺者慎服。

《神农本草经》原文

杜仲，味甘，温。主腰背痛，补中益精气，坚筋骨，强志，除阴下湿痒，小便余沥。

1. 叶片特征

叶对生，卵形或椭圆形，先端钝或具短尖，基部楔形或广楔形，边缘具细锯齿，上面深绿色，下面深绿色，叶面光滑。

2. 拉丝特征（杜仲胶）

叶片拉丝
摘下一片叶子，轻轻拉断，可见断面间连着白色胶丝。

嫩枝拉丝
折断一根嫩枝，断面之间有密密麻麻、极具弹性的白丝。

3. 树皮特征（药用部位）

外皮：灰褐色，粗糙，有纵裂纹。

内皮：紫褐色，有银白色胶丝相连。

药用部位为干燥树皮，厚而韧，断面可见银白色细丝状胶膜。

4. 采收与保护（环状剥皮）

在树干距地面1.3~1.5米处，环状剥去树皮（切至木质部）。

剥取环状树皮，既可获得药材，又能促进树皮再生。

经过一段时间，树皮可再生，不致使树木枯死。

剥下的树皮，除去粗皮，晒干或阴干。

5. 药材性状

(1) 原药材（整皮）
呈板片状或筒状，外表面灰褐色或灰黑色，有纵裂纹及皮孔。

(2) 内表面
内表面紫褐色，有细纵纹，密布银白色细丝状胶膜。

(3) 断面特写
断面有无数银白色细丝相连，拉伸不断，富有弹性。

(4) 拉丝状态
将树皮断面拉开，可见白色胶丝成网状相连，弹性极强。

(5) 切片
切片呈长方形或板片状，厚薄不一，断面紫褐色，有细丝。

6. 显微特征（横切面）

栓皮层、皮层、韧皮部、形成层、木质部、导管。

韧皮部中散在分布胶丝细胞，含胶丝。（草酸钙针晶束亦可见）

7. 主要成分

主要含杜仲胶（橡胶类物质）、桃叶珊瑚苷、绿原酸、木脂素等。

8. 主要产地

主产于四川、贵州、云南、湖南、湖北等地，其中以四川、贵州所产质量最佳。

9. 性状鉴别要点

- 板片状或筒状，外表面灰褐色，纵裂，有皮孔。
- 内表面紫褐色，有细纵纹，密布银白色胶丝。
- 断面有银白色细丝相连，拉伸不断，弹性极强。
- 气微，味微苦。

杜仲

来源于杜仲科杜仲属植物**杜仲**的**干燥树皮**。它是我国特有的名贵落叶乔木，野生或栽培于四川、贵州、云南、湖南等地的山林中。

- **看似普通的乔木：** 它的树干挺拔，叶子呈卵形，边缘有锯齿。如果只看外表，它和普通的绿化树木没有太大区别。
- **拉丝的“黑科技”：** 杜仲最神奇的地方在于，如果你随手摘下一片它的叶子轻轻扯断，或者折断一根小嫩枝，你会发现断面之间竟然连着一层**密密麻麻、极具弹性的白丝**。这其实是它体内富含的**杜仲胶**。
- **采收保护（环状剥皮）：** 药用部位是它的老树皮。现代采剥时多采用局部环状剥皮技术，既能拿到药材，又能让树皮再生，不至于让树木枯死。

在古代，由于缺乏现代地质学知识，古人看到地下挖出的巨大骨骼化石，便浪漫地认为这是传说中“龙”死后留下的遗骨。

- **真正的来源：** 现代科学早已揭开了它的神秘面纱——龙骨实际上是远古时期（如第三纪、第四纪）的**哺乳动物（如古代三趾马、犀牛、鹿、象等）骨骼的化石**。
- **采挖圣地：** 它们多埋藏于黄土层或山洞的红土层中，主要产于我国的山西、陕西、甘肃、内蒙古等北方省份

阿胶

来源于马科动物**驴**的**干燥皮**，经依法煎熬而成的固体胶。

- **道地药材的执念：** 真正的阿胶以山东**东阿县**所产最为道地。古人认为，东阿县的地下水（阿井水）水质清冽，密度大、矿物质丰富，在熬制过程中能完美地将驴皮中的杂质提炼出来，使胶质纯净。
- **漫长的炼制工艺：** 制作阿胶需要将纯正的整张驴皮历经漂洗、去毛、切块，再经过多轮的煎熬、浓缩，最后加入冰糖、黄酒、豆油等辅料，倒入模具中冷却、切块、晾干，整个过程往往长达数十天。

牡蛎

(中药材)

Concha Ostreae

(牡蛎科) 动物

长牡蛎

Crassostrea gigas (Thunberg)

肉(可食用部分)
软体部, 富含蛋白质等
营养成分。

壳(药用部分)
坚硬, 多层结构, 主要
由碳酸钙组成。

【来源】为牡蛎科动物长牡蛎 *Crassostrea gigas* (Thunberg)、大连湾牡蛎 *Crassostrea talien* (Wang) 或近江牡蛎 *Crassostrea rivularis* (Gould) 的干燥贝壳。

【性味】咸、涩, 微寒。

【归经】归肝、胆、肾经。

【功效】平肝潜阳, 重镇安神, 软坚散结, 收敛固涩。

【主治】用于肝阳上亢, 头晕目眩, 烦躁易怒;
心神不宁, 惊悸失眠; 瘰癧痰核, 瘰癧瘰癧;
自汗盗汗, 遗精滑精, 崩漏带下。

【用法用量】10~30g, 先煎。

【注意事项】脾胃虚寒者慎用。

1. 生物来源



常年栖息在潮间带或浅海的礁石、砾石、码头等坚硬物体上。

2. 形态特征



壳呈不规则形, 左壳厚而隆起, 右壳较平坦。壳层叠叠, 质坚硬。

3. 内部结构



内面银白色或灰白色, 有珍珠光泽, 呈瓷样光滑。

4. 生长环境(海气淬炼)



吸收海水咸寒之气, 历经泥沙激撞, 风吹日晒, 壳质坚硬厚重。

中医理论
咸能软坚,
重能镇潜。
牡蛎壳吸收了
极重的海水
咸寒之气,
故能平肝潜
阳, 软坚散
结, 重镇安
神。

5. 炮制过程(净制)



原料: 收集新鲜牡蛎壳。



清洗: 去除泥沙、杂质及附着物。



晒干: 沥干水分, 晒干。



打碎: 敲碎成小块或粗粒。



成品: 牡蛎壳(生用),
洗净干燥, 质坚硬。


6. 药材性状



不规则片状, 大小不一, 表面灰白、灰褐色, 粗糙, 层状隆起。



内面银白色或灰白色, 具珍珠光泽, 光滑如瓷。



断面层次明显: 外层粗糙, 棱柱层呈放射状, 内层为珍珠层, 质坚硬。



呈不规则小块, 白色或灰白色, 质硬, 敲击有清脆声。



煅后质地酥脆, 色白, 微显收敛固涩作用。

《神农本草经》原文


牡蛎, 味咸, 平。主癭瘤, 坚结, 留热在胸, 病惊痫, 寒热邪气, 除烦满, 益气, 久服轻身, 不老。

7. 显微特征(壳体结构)



壳体由碳酸钙组成, 结构致密, 层次分明。珍珠层呈片状结构, 排列紧密(偏光显微镜下)。

8. 主要成分



碳酸钙(CaCO_3)为主
并含少量磷酸钙、镁盐及有机质等。

9. 主要产地



主要产于辽宁、山东、浙江、福建、广东、浙江等沿海地区, 以渤海、黄海和东海沿岸为主。

10. 性状鉴别要点

- 壳片不规则, 层层叠叠, 外表粗糙。
- 内表面银白或灰白, 具珍珠光泽。
- 断面层次明显, 质坚硬, 敲击有清脆声。
- 打碎后呈不规则小块, 白色或灰白色。

牡蛎

来源于牡蛎科动物长牡蛎、大连湾牡蛎或近江牡蛎的干燥贝壳。

- 生蚝的壳:** 没错, 它就是我们在夜市或海鲜餐厅里大快朵颐的“生蚝”的外壳。吃完生蚝肉后, 其坚硬的贝壳经过洗净、晒干、打碎, 便化身为中医手里的治病良药。
- 海气淬炼:** 常年生活在潮汐激荡的沿海礁石上, 牡蛎壳吸收了极重的海水咸寒之气。中医讲“咸能软坚”、“重能镇潜”, 这赋予了它独特的药理药性。

茯苓
(中品)

【别名】茯苓、云苓、松苓、松茯苓、
万灵桂、茯松、松雪、茯兔。
【来源】为多孔菌科真菌茯苓
Poria cocos (Schw.) Wolf 的干
菌核。
【性味】甘、淡、平。
【归经】心、肺、脾、肾经。
【功效】利水渗湿，健脾，宁心。
【主治】用于水肿尿少，湿痹泄泻，
健忘，惊悸，失眠。
【用法用量】9～15g。
【注意事项】孕妇慎用。

《神农本草经》原文
茯苓，味甘，平。主胸胁逆气，
忧悸，惊恐，心下结痛，寒热
烦满，咳逆，口焦舌干，利小便，
久服安魂养神，不饥延年。



生长于采伐后，枯死或濒临脱土的松树根周围，深藏地下寄生松树根部。



鲜茯苓呈不规则的块状、球形或扁圆形。表面黑褐色或棕褐色，皱缩巴巴。



表面坚硬粗糙，皱缩多，常附着泥土及松根残迹。



内部为肉质菌体，鲜时呈粉肉色或白色，质地致密致实。



内部地无树木年轮或纹理，质地均一，无明显分层。



质地坚硬，手捏沉重，用刀不易切开。



皮壳附着松根和泥土，颜色深棕至黑褐，粗糙不平。



寄生于松树根部，深藏地下，仅靠松树残存养分生长。



采挖出土的鲜苓，表面多带泥土，形态不规则。



断面呈白色或粉白色，粉质细腻，无年轮。



去皮后切块或加工成茯苓丁，外白内白，质地坚实。



切片后呈白色或黄白色，断面致密均匀。



形态多样，大小不一，表面均为黑褐色粗糙皮壳。



外皮：黑褐色，粗糙坚硬
内内：粉肉色/白色，致密坚硬

外黑内白或粉肉色，内部无年轮或纹理。



鲜茯苓（未去皮）
白茯苓（去皮加工）

鲜茯苓外皮黑褐，内内白或粉；白茯苓去皮后全白，质地坚实。

茯苓

不是高等植物，而是一种寄生在淡黄新月松或马尾松根部的多孔菌科真菌 生长环境：茯苓最喜欢生长在采伐后、已经枯死或濒临死亡的松树桩周围。因为它是真菌，不需要光合作用，常年深藏在地下，完全依赖松树的残存养分。

外形（“黑泥球”）： 采挖出来的鲜茯苓呈不规则的块状、球形或扁圆形。表面是一层皱皱巴巴、坚硬且粗糙的黑褐色或棕褐色皮壳，看起来非常像一块刚从地里刨出来的黑土豆或烂泥球。

内部（粉肉色泥）： 将黑皮壳砸开，内部是肉质的真菌体。鲜时呈粉肉色或纯白色，质地非常坚硬、致密，用刀切开，里面绝对没有树木那样的年轮纹理。

覆盆子

中药材

(中药材)

蔷薇科 悬钩子属

华东覆盆子

Rubus chingii Hu
(Rosaceae)

叶

奇数羽状复叶，
小叶3~5，卵形或卵状披针形，
边缘有锯齿，背面有腺毛。



野生环境

果实

聚合果，
由许多小核果组成，
成熟后红色或紫红色，
可食用（树莓、红树莓）。
多生干山坡、林缘、溪边、
路旁的阴处或阳处。

- 【来源】 为蔷薇科植物华东覆盆子 *Rubus chingii* Hu 的干燥未成熟果实。
- 【性味】 酸、甘、平。
- 【归经】 归肝、肾、膀胱经。
- 【功效】 固精缩尿、益肾固精、养肝明目。
- 【主治】 遗精滑精、遗尿尿频、肝肾不足之目暗昏花。
- 【用法用量】 6~15g。
- 【注意事项】 脾虚有湿及小便短赤者慎用。

《神农本草经》原文

覆盆子，味酸，寒。主益气轻身，
令人寿，补肾明目。

1. 植物与果实生长过程



花期 (4~5月)
白色花



果实初期 (青绿色)
6~7成成熟 (入药最佳期)



接近成熟 (淡黄)
已可食用



成熟 (红色)
为水果树莓

防坑提示

中药覆盆子必须在
果实尚绿时采收，
红透后药效下降！

2. 核心采收时机 (绿时采收)



✓ 在初夏，果实尚绿、
成熟度六七成时采收
此时酸涩收敛之性最强，
具有固精缩尿的药效。
等红透变软，药效大打折扣。

3. 药工加工过程



采收后的鲜果
(绿色)



沸水略浸 (杀青)
防止继续成熟、腐烂



晒干或烘干



成品药材
覆盆子

4. 药材性状识别



(1) 整体

多呈半球形或圆锥状聚合果，
表面由多个小核果聚合而成。



(2) 表面

表面棕褐色或紫褐色，
有细小突起，稍有光泽。



(3) 中空 (从蒂端看)

中空如小杯状，
中央有宿萼。



(4) 断面


断面可见多数小核，
内含淡黄色小种子。



(5) 种子

小种子多数，淡黄色，
坚硬。

5. 显微特征 (粉末)



表皮细胞

表皮细胞

草酸钙晶体

腺毛、单晶

腺毛

6. 主要成分



主要含鞣质、黄酮类
有机酸、氨基酸等。

7. 主要产地



主产浙江、江西、安徽、福建、
湖南、湖北、广东等地。

8. 性状鉴别要点

- ✓ 半球形，中空，表面由
多个小核果聚合而成；
- ✓ 表面紫褐色，突起小核；
- ✓ 中空如小杯，具宿萼；
- ✓ 味酸涩，微苦。

9. 与混淆品比较



覆盆子 (药用)

绿时采收

红树莓 (果用)

红熟可食

覆盆子

来源于蔷薇科悬钩子属植物华东覆盆子的干燥未成熟果实。它其实就是我们日常生活中常说的野树莓、红树莓。和菟丝子的功效差不多，经方上可以做替换使用。

- **绿时采收 (核心)：** 这是一个非常关键的防坑点。我们在水果店买的树莓是红透、熟软的，吃起来酸甜多汁；但入药的覆盆子必须在初夏果实尚绿、成熟度大约为六七成时采收。因为此时它的酸涩收敛之性最强，一旦等它红透变软，其固精缩尿的药效就会大打折扣。
- **药工加工：** 采收后，需要将其投入沸水中略烫一下（杀青，防止其继续成熟和腐烂），然后晒干或烘干，便成了中药房里的药材。

天麻

(中药材)

别名：赤箭、明天麻、定风草
学名：Gastrodia elata Bl.
科属：兰科 (Orchidaceae)
天麻属 (Gastrodia)

药用部位：干燥块茎

采收期：秋、冬季茎叶枯萎后
挖出块茎，除去根须和泥沙，蒸透或煮透，晒干或烘干。

生态习性
多年生寄生草本，无叶绿素，全株不含叶绿素。
寄生于蜜环菌等真菌的菌丝体上。
腐生植物。
生于海拔500~2200米的阴湿山地林下腐殖土中，多见于阔叶林、针阔混交林。主产于陕西、云南、贵州、四川等地。

特征概述
① 块茎直立，高30~150cm。
② 全株无叶，茎肉质，赤红色或黄褐色，有少量膜质鳞片状叶鞘。
③ 顶端总状花序，花下垂，呈黄褐色、淡黄绿色或橙红色。花被合生成管状。
④ 地下块茎肥大肉质，横圆形或长条形，横卧地下，表面有环状节。

药用价值
味甘，性平。
归肝经。
息风止痉，平抑肝阳，祛风通络，止痛。
用于肝风内动、惊痫抽搐、头痛眩晕、肢体麻木、风湿痹痛。

1. 生境与分布

生于海拔500~2200米的阴湿山地林下腐殖土中，寄生于蜜环菌等真菌菌丝上。

2. 植株全貌 (开花期)

3. 茎特写 (无叶特征)

- 全株无叶，仅有膜质鳞片状叶鞘包裹茎。
- 茎肉质，直立，表面光滑，赤红色或黄褐色。
- 茎上有环状节。

4. 花序特写 (穗状花序)

- 总状花序，长可达30cm以上。
- 花朵下垂，排列紧密。
- 花色黄褐色、淡黄或橙红色。

5. 花朵特写

- 花被片合生成管状，先端微裂。
- 花向下垂吊，似小铃铛或小口袋。
- 花柱和雄蕊包藏于花被内。

6. 鳞片状叶鞘特写

- 膜质鳞片状叶鞘，抱茎而生。
- 呈三角形，边缘薄膜质。
- 留下环状痕迹。

7. 地下块茎及加工过程

① 挖出块茎 ② 去除根须和泥沙 ③ 洗净 ④ 蒸透或煮透 ⑤ 干燥 ⑥ 成品

药材性状 (饮片)
呈扁椭圆形或长条形，稍弯曲，表面黄白色或淡棕色，有环状节，质坚硬，不易折断。

8. 显微特征 (块茎横切面)

- 皮层宽广，薄壁细胞多。
- 具内皮层，凯氏带明显。
- 维管束散生。

9. 主要成分

- 主要成分为天麻素 (Gastrodin)。
- 对羟基苯酚、香荚兰醇等。
- 具有镇静、抗惊厥、降压等等作用。

10. 主要产地

主产地：四川、云南、贵州、陕西、湖北、重庆、安徽、浙江等地。

11. 性状鉴别要点

- 表面黄白色或淡棕色，有明显环状节。
- 体轻，质坚硬，不易折断。
- 断面角质样，灰白色。

12. 易混品鉴别

白及	何首乌
- 块茎不规则球形。 - 表面灰白色，具须根。	- 块茎不规则团块。 - 表面黑褐色。

《神农本草经》原文摘要

天麻，味甘，平。主风湿痹痛，四肢拘挛不能屈伸，惊风，寒热，风痹偏枯，明目，益气，久服轻身，不老延年。

来源

本品为兰科植物天麻 Gastrodia elata Bl. 的干燥块茎。

性味归经

味甘，性平。归肝经。

功效

息风止痉，平抑肝阳，祛风通络。

主治

肝风内动，惊痫抽搐，头痛眩晕，肢体麻木，风湿痹痛。

用法用量

煎服：3~10g。
外用：适量，研末调敷或入丸散。

天麻（赤箭）

- 全景构图与株型（Overall Habit）——【核心绘图抓手：直立赤红花茎与无叶特征】：独茎直立草本，高约 30~150 厘米。最震撼的视觉抓手是：它全株没有一片绿叶！只有直立的、呈肉质的赤红色、黄褐色或橙黄色花茎（故古称“赤箭”），茎上仅有少量的膜质鳞片状叶鞘包裹。

- **地下部分与花序特写（Underground & Flower Morphology）——【核心抓手：块茎与穗状花序】：**
- **地下块茎：** 地下埋着肉质肥大的**椭圆形或长条形块茎**（即天麻药材），横卧在土中，表面有明显的环状节。
- **花序：** 顶端抽出一长串**总状花序**，长可达 30 厘米以上。花朵呈**黄褐色、淡绿黄或橙红色**，花被片合合成管状，像一个个向下垂吊的小铃铛或小口袋。
- **生态环境背景（Ecological Background）：** 背景可设置为**初夏时节，秦岭、大巴山或西南高山阴湿森林的腐殖土中**。在枯枝落叶和密林阴影下，一根挺拔的**赤红色花茎**拔地而起，展示着它作为寄生兰科植物的奇幻生命力。

玄参

(中药材)

别名：元参、黑参、鬼藏

学名：Scrophularia ningpoensis Hemsl.

科属：玄参科 (Scrophulariaceae)

玄参属 (Scrophularia)

用药部位：干燥根

采收期：秋、冬季植株枯萎时采收。

除去须根和泥沙，

反复堆闷“发汗”至

内部变黑，晒干。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

1. 植株全貌 (生境)

高大草本，高可达100-170厘米。

2. 茎特写 (四棱形)

茎直立，四棱形，有沟槽，绿色或微带紫红色，光滑或微毛。

3. 叶片特写 (对生叶)

叶对生，卵形或卵状椭圆形，边缘有细锯齿；上表面深绿色，下表面淡绿色。

4. 花序特写 (圆锥花序)

6-8月开花；聚伞花序排成狭长圆锥状，花萼顶生。

5. 花朵特写 (壶状)

花冠紫红或暗紫色，筒状，下唇反卷；花萼5深裂。

6. 果实特写 (蒴果)

8-9月结果；蒴果卵形，长8-9毫米，棕褐色，顶端有细尖喙。成熟时开裂。

7. 地下根全貌 (鲜品)

内质根，纺锤形或条状，中部膨大。长10-20厘米，直径2-3厘米，常数条簇生于根茎部。

8. 根部纵切面 (鲜品)

鲜品剖开内部肉质黄白色，富含黏液。

9. 发汗后根部切面 (干品)

经堆闷“发汗”后，内部肉质变为乌黑色，质地坚实。

10. 生境环境

多生于山坡草地、路旁、林缘等湿润环境。

11. 产地分布

主产于东北、华北、华东、中南及陕西、甘肃、四川、贵州等地。

12. 采收与加工 (发汗工艺)

采挖 (秋冬) → 除去须根和泥沙 → 堆闷“发汗” (数日) → 反复堆闷至内部变黑 → 晒干 (成品)

13. 功效与主治

清热凉血，滋阴降火，解毒散结。

主治：温病热入营血，身热夜甚，斑疹发热，阴虚发热，骨蒸劳热，咽喉肿痛，痈疮疔毒，瘰疬痔瘡。

玄参

原植物全貌形态 (Plant Morphology)：

- 茎 (Stem)：植株高大，可达 100-170 厘米。茎直立，呈非常标准的四棱方柱形，有沟槽，表面呈绿色或微带紫红色，光滑或被有微毛。

- **叶 (Leaves) :** 叶对生，叶片呈卵形或卵状椭圆形，长 8-18 厘米，边缘有细锯齿；叶片正面深绿色，背面淡绿色，叶柄长 0.5-3 厘米。
- **花 (Flowers) :** 6-8 月开花。聚伞花序排成狭长的圆锥状，花葶顶生；花冠呈紫红或暗紫色，小巧呈壶状（下唇反卷）；花萼 5 深裂。
- **果实 (Fruits) :** 8-9 月结果。蒴果呈卵形，长 8-9 毫米，成熟时呈棕褐色，顶端有细尖喙，开裂。

根部与用药部位 (Roots & Medicinal Part) :

- **地下根形态:** 根为肉质纺锤形或条状，中部膨大，长 10-20 厘米，直径 2-3 厘米，常数条簇生于根茎部。
- **根部颜色:** 鲜采时外皮呈淡黄色或土黄色，切开内部肉质为黄白色。经加工“发汗”堆闷后，内部肉质会变为乌黑色。
- **用药部位:** 以其冬季茎叶枯萎时采挖的干燥肉质根入药。采挖后除去须根和泥沙，反复堆闷发汗至内部变黑、晒干。

