
complete
trapped
stalled
unresolved
binary4, $\chi = 3$, fan-in (80 runs)
binary4, $\chi = 3$, bal. (30 runs)
binary4, $\chi = 6$, fan-in (80 runs)
binary4, $\chi = 6$, bal. (30 runs)
MPS4, $\chi = 3$, fan-in (80 runs)
MPS4, $\chi = 3$, bal. (30 runs)
MPS4, $\chi = 6$, fan-in (80 runs)
MPS4, $\chi = 6$, bal. (30 runs)
binary8, $\chi = 3$, fan-in (30 runs)
binary8, $\chi = 3$, bal. (30 runs)
binary8, $\chi = 6$, fan-in (50 runs)
HT4, $\chi = 3$, fan-in (30 runs)
HT4, $\chi = 3$, bal. (30 runs)
HT4, $\chi = 6$, fan-in (50 runs)
MPS8, $\chi = 3$, fan-in (30 runs)
MPS8, $\chi = 3$, bal. (30 runs)
MPS8, $\chi = 6$, fan-in (50 runs)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
fraction of runs (separated teacher, all σ)
MPS4, $\chi = 3$, trapped runs
(one line per seed and teacher)
10^0
10^{-1}
end-slice decay rate / σ^2
separated teacher
close teacher
10^{-2}
10^{-1}
σ