

<A2 solution analyze>

Exercise 1~6,11,12번의 답안은 전 학생 동일하였습니다. (사칙연산 실수 제외)

일부 증명과정에서 디테일의 차이만 있을 뿐 모두 동일한 답안을 보였습니다.

그러나 8,9,10은 인원들 모두 상이한 답안을 제출하여 보고를 드립니다. (일부 사칙연산 과정에서 실수를 한 답안도 보여 이는 제외시켰습니다.)

#1번

Exercise 1

Show that $P(A|B \cap C)P(B|C) = P(A \cap B|C)$.

$$\begin{aligned} & P(A|B \cap C) \cdot P(B|C) \\ &= \frac{P(A \cap (B \cap C))}{P(B \cap C)} \cdot \frac{P(B \cap C)}{P(C)} \\ &= \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(C)} \end{aligned}$$

$$\therefore P(A|B \cap C) \cdot P(B|C) = P(A \cap B|C)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{P((A \cap B) \cap C)}{P(C)} \\ &= P(A \cap B|C) \end{aligned}$$

ok.

#2번

Exercise 2
 $X \sim U(10, 20)$, then what is $F(10)$? and $F(15)$?

$X \sim U(10, 20)$


$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{10}, & \text{if } 10 \leq x \leq 20 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{if } x < 10 \\ \frac{x-10}{10}, & \text{if } 10 \leq x \leq 20 \\ 1, & \text{if } x > 20 \end{cases}$$

$$F(10) = \frac{10-10}{10} = 0$$

$$F(15) = \frac{15-10}{10} = \frac{1}{2}$$

diagram 371



#3번

Exercise 3
 Prove that pdf \rightarrow cdf

~~$F(0) = 0$~~

~~$\int f(x) dx = F(x) + C$~~

~~$\int \lambda e^{-\lambda x} dx = -e^{-\lambda x} + C = F(x)$~~

~~$F(0) = 0 \Rightarrow \underbrace{-e^{-\lambda \cdot 0}}_{=1} + C = 0 \Rightarrow C = 1$~~

$\therefore F(x) = 1 - e^{-\lambda x} = \boxed{\text{cdf}}$

$\therefore \text{pdf} \xrightarrow{\uparrow} \text{cdf}$

이것이 정답이다

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx$$

i) if $x < 0$, then $f(x) = 0$, so $F(x) = 0$

ii) if $x \geq 0$, then $F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx$

$$= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^x \lambda e^{-\lambda x} dx$$

$$= -e^{-\lambda x} \Big|_0^x$$

$$= -e^{-\lambda x} + 1 \quad \square$$

$$EX = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx = \int_{-\infty}^0 xf(x) dx + \int_0^{\infty} xf(x) dx \\ = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx$$

#4번

Exercise 4

Show that $EX = 1/\lambda$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0$$

~~$$\int_0^{\infty} xf(x) dx = EX = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx$$~~

$$= \int_0^{\infty} \lambda x e^{-\lambda x} dx$$

$$\int uv' = uv - \int u'v$$

$$= \left[-\frac{x}{\lambda} e^{-\lambda x} \right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} dx$$

$$= (0 - 0) + \int_0^{\infty} \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} dx$$

$$= \left[-\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} \right]_0^{\infty} = (0 - (-\frac{1}{\lambda})) = \frac{1}{\lambda}$$

ok.

#5번

Exercise 5

Show that $\text{Var}(X) = 1/\lambda^2$. (Hint: need to do EX^2 first)

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 \Rightarrow \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \left(\frac{1}{\lambda^2}\right)$$

$$\int_0^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{\infty} \lambda x^2 e^{-\lambda x} dx = E(X^2)$$

$$= \left[-\frac{x^2}{\lambda} e^{-\lambda x} \right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} -2x e^{-\lambda x} dx$$

$$= (0 - 0) + \int_0^{\infty} 2x e^{-\lambda x} dx$$

$$= 2 \int_0^{\infty} x e^{-\lambda x} dx = 2 \left\{ \left[-\frac{x e^{-\lambda x}}{\lambda} \right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} -\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} dx \right\}$$

$$= 2 \left\{ (0 - 0) - \int_0^{\infty} \frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} dx \right\}$$

$$= 2 \left\{ - \left[\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda^2} \right]_0^{\infty} \right\} = 2 \left(0 - \left(-\frac{1}{\lambda^2} \right) \right) = 2 \times \frac{1}{\lambda^2} = \frac{2}{\lambda^2}$$

4번과 마찬가지로.

$EX^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx$ 2번
한번.

#6번

Exercise 6

Prove the previous theorem.

Claim, $P(X > s+t | X > t) = P(X > s)$

$$P(X > s+t | X > t) = \frac{P(X > s+t)}{P(X > t)}$$

$$P(X > s+t) = \int_{s+t}^{\infty} f(x) dx$$

$$= \left[1 - e^{-x/\lambda} \right]_{s+t}^{\infty}$$

$$= 1 - (1 - e^{-t/\lambda})$$

$$= e^{-t/\lambda}$$

$$= e^{-t/\lambda}$$

$$P(X > s+t) = e^{-(s+t)/\lambda}$$

$$\therefore \frac{e^{-(s+t)/\lambda}}{e^{-t/\lambda}} = e^{-s/\lambda}$$

$$P(X > s) = e^{-s/\lambda}$$

$$\therefore P(X > s+t | X > t) = P(X > s)$$

Ans) 2번과 마찬가지로

3번과 마찬가지로

$$P(X > s+t | X > t)$$

$$= \frac{P(X > s+t, X > t)}{P(X > t)}$$

$$= \frac{P(X > s+t)}{P(X > t)}$$

$$= \frac{P(X > s+t)}{P(X > t)}$$

$$= \frac{1 - P(X \leq s+t)}{1 - P(X \leq t)}$$

$$= \frac{1 - F(s+t)}{1 - F(t)}$$

$$= \frac{1 - F(s+t)}{1 - F(t)}$$

#7번

Exercise 7

For $X \sim \text{poi}(\lambda)$, prove that $\mathbb{E}X = \lambda$.

- cf) $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$
- pf) We have $\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ for $k = 0, 1, 2, \dots$, and

$$\mathbb{E}X = \sum_{x=-\infty}^{\infty} xp(x) \text{ (this is common for all discrete r.v.)}$$

$$= \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x e^{-\lambda} \cdot x}{x!}$$

$$= \lambda \sum_{x=1}^{\infty} \frac{\lambda^{x-1} e^{-\lambda}}{(x-1)!}$$

Let, $k = x-1$

$\left\{ \begin{array}{l} x: 1 \rightarrow \infty \\ k: 0 \rightarrow \infty \end{array} \right\}$

$$= \lambda \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

$$= \lambda e^{-\lambda} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \right) = e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \times e^{\lambda} = \lambda$$

good

#8번

(아래와 동일한 방법으로 계산하여 동일한 답안이 나온 인원은 3명이었습니다. 나머지 인원은 문제에 교수님이 알려주신 방법과는 다른 방법으로 계산하거나 사칙연산에서 실수가 있었던 인원으로 제외시켰습니다.)

I. Probability 00000000
II. Random Variables 00000000
III. Uniform 0000
IV. Exponential 00000000000000
V. Poisson 0000
VI. Some Exercises 00●00000000

Exercise 8
 For $X \sim U(20, 40)$ evaluate $\mathbb{E}[X \wedge 25]$ and $\mathbb{E}[(25 - X)^+]$.

$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{20} & (20 \leq x \leq 40) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$

① $\mathbb{E}[X \wedge 25] = \int_{-\infty}^{\infty} (x \wedge 25) \frac{1}{20} dx = \int_{20}^{25} \frac{x}{20} dx + \int_{25}^{40} 25 \frac{1}{20} dx$

② $\mathbb{E}[(25 - X)^+] = \int_{-\infty}^{\infty} (25 - x)^+ \frac{1}{20} dx = \int_{20}^{25} (25 - x) \frac{1}{20} dx + \int_{25}^{40} 0 \times \frac{1}{20} dx$

Stochastic Processes and Simulation, 2021 Spring
42 / 50
Lecture A2. Probability Review

CamScanner로 스캔하기

① $\left[\frac{1}{40} x^2 \right]_{20}^{25} + \left[\frac{5}{4} x \right]_{25}^{40} = \frac{625 - 400}{40} + \frac{5}{4} (40 - 25)$

$= \frac{225}{40} + \frac{75}{4}$

$= \frac{975}{40} = \boxed{\frac{195}{8}}$

② $\left[\frac{5}{4} x - \frac{1}{40} x^2 \right]_{20}^{25} + 0$

$\left(\frac{125}{4} - \frac{625}{40} \right) - \left(\frac{100}{4} - \frac{400}{40} \right)$

$= \frac{25}{4} - \frac{225}{40} = \frac{250 - 225}{40} = \frac{25}{40} = \boxed{\frac{5}{8}}$

Stochastic Processes and Simulation, 2021 Spring
43 / 50
Lecture A2. Probability Review

CamScanner로 스캔하기

#9번

(9번은 2번3번 문제를 해결할 때 2가지 방법의 답안이 나왔습니다)

correct 4. 2번문제 $P(2 \leq x \leq 4) = p(x=2) + p(x=3) + p(x=4)$ 로 계산하고, 3번 문제 또한 $(1 - P(x=0) + P(x=1) + P(x=2))$ 로 계산하는 방법

X 2번문제 $P(2 \leq x \leq 4) = P(x=4) - P(x=2)$ 로 계산하며, 3번 문제 또한 $(1 - P(x \leq 2))$ 로 계산하는 방법

X 2번문제 $P(2 \leq x \leq 4) = F(4) - F(2) = f(3) + f(4)$ 로 계산하고, 3번은 1번방법과 동일하게 계산하는 방법

*대다수의 학생이 Exercise 9의 1번 문제는 맞추었고, 2번문제는 상이했으며, 3번문제는 몇몇의 학생이 1번 3번과 방법과 같은 답안이 도출되었습니다.

note

$$P(2 \leq x \leq 4) = P(x \leq 4) - P(x < 2)$$

$$= P(x \leq 4) - P(x \leq 2)$$

$$\neq P(x \leq 4) - P(x \leq 2)$$

<1번 방법>

I. Probability ○○○○○○○○	II. Random Variables ○○○○○○○○	III. Uniform ○○○○	IV. Exponential ○○○○○○○○○○○○○○	V. Poisson ○○○○	VI. Some Exercises ○○○○●○○○○○
<p>Exercise 9</p> <p>For $X \sim Poi(8)$, $\lambda=8$</p> <p>① $P(X=0) = e^{-8}$</p> <p>② $P(2 \leq X \leq 4) = e^{-8} (32 + 8^3/3 + 8^4/24)$</p> <p>③ $P(X > 2) = (1 - 41e^{-8})$</p>					
<p>이제 계산</p> <p>$\frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$ $\frac{8^x e^{-8}}{x!}$</p> <p>$e^{-8} (\frac{8^2}{2} + \frac{8^3}{6} + \frac{8^4}{24})$</p> <p>$P(x=0) = e^{-8}$ $P(x=1) = 8 \cdot e^{-8}$ $P(x=2) = 32 \cdot e^{-8}$</p> <p>③ $P(X > 2) = 1 - (P(x=0) + P(x=1) + P(x=2))$</p> <p>$P(x=0) = \frac{8^0 e^{-8}}{0!} = e^{-8}$ $P(x=1) = \frac{8^1 e^{-8}}{1!} = 8e^{-8}$ $P(x=2) = \frac{8^2 e^{-8}}{2!} = 32e^{-8}$</p>					

$$P(x=2) = \frac{8^2 e^{-8}}{2!} = 32e^{-8}$$

<2번 방법>

Exercise 9

For $X \sim \text{Poi}(8)$,

- 1. $\mathbb{P}(X=0) =$
- 2. $\mathbb{P}(2 \leq X \leq 4) =$
- 3. $\mathbb{P}(X > 2) =$

$$\mathbb{P}(X=0) = \frac{e^{-8} \cdot 8^0}{0!} = \frac{1}{e^8}$$

$$\mathbb{P}(2 \leq X \leq 4) = \frac{e^{-8} \cdot 8^4}{4!} - \frac{e^{-8} \cdot 8^2}{2!} = \frac{5 \times 29}{3} \times e^{-8}$$

$$\mathbb{P}(X > 2) = 1 - \frac{e^{-8} \times 64}{2!} = 1 - \frac{32}{e^4}$$

e⁴

<3번 방법>

I. Probability ○○○○○○○○	II. Random Variables ○○○○○○○○	III. Uniform ○○○○	IV. Exponential ○○○○○○○○○○○○○○	V. Poisson ○○○○	VI. Some Exercises ○○○○●○○○○○
----------------------------	----------------------------------	----------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------------

Exercise 9 $\rightarrow \mathbb{P}(X=k) = \frac{8^k e^{-8}}{k!} \quad (k=1, 2, 3, \dots)$

For $X \sim \text{Poi}(8)$,

- 1. $\mathbb{P}(X=0) = \frac{8^0 e^{-8}}{0!} = 1$
- 2. $\mathbb{P}(2 \leq X \leq 4) = \xrightarrow{F(4) - F(1)} \mathbb{P}(2) + \mathbb{P}(3) + \mathbb{P}(4) = \frac{8^2 e^{-8}}{2!} + \frac{8^3 e^{-8}}{3!} + \frac{8^4 e^{-8}}{4!}$
- 3. $\mathbb{P}(X > 2) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 2)$

$$= 1 - F(2) = 1 - (\mathbb{P}(0) + \mathbb{P}(1) + \mathbb{P}(2))$$

$$= 1 - \left(\frac{8^0 e^{-8}}{0!} + \frac{8^1 e^{-8}}{1!} + \frac{8^2 e^{-8}}{2!} \right)$$

0.17029

#10번

(10번문제는 특정구간의 적분과정에서 상이한 점을 발견했고, 다른 답안이 나왔습니다.)

<case 1>

$$\begin{aligned}
 E[\max(X, 7)] &= \int_{-\infty}^{\infty} \max(X, 7) \cdot f(x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^0 \max(X, 7) f(x) dx + \int_0^7 \max(X, 7) f(x) dx + \int_7^{\infty} \max(X, 7) f(x) dx \\
 &= 0 + \int_0^7 7 f(x) dx + \int_7^{\infty} x \cdot f(x) dx \\
 &= 7 \int_0^7 7 e^{-7x} dx + \int_7^{\infty} x \cdot 7 e^{-7x} dx \\
 &= 49 \int_0^7 e^{-7x} dx + \int_7^{\infty} x \cdot 7 e^{-7x} dx \\
 &= 49 \left[-\frac{1}{7} e^{-7x} \right]_0^7 + 7 \left(\left[-\frac{1}{7} x e^{-7x} \right]_7^{\infty} - \int_7^{\infty} -\frac{1}{7} e^{-7x} dx \right) \\
 &= -7 [e^{-7x}]_0^7 + 7 \left(e^{-49} + \frac{1}{7} \int_7^{\infty} e^{-7x} dx \right) \\
 &= -7(e^{-49} - 1) + 7e^{-49} + \int_7^{\infty} e^{-7x} dx \\
 &= 7 + \int_7^{\infty} e^{-7x} dx \\
 &= 7 + \left[-\frac{1}{7} e^{-7x} \right]_7^{\infty} \\
 &= 7 + (0 + e^{-49}) \\
 &= 7 + e^{-49}
 \end{aligned}$$

↓ 여기 틀림

<case 2>

Exercise 10

For $X \sim \exp(7)$, evaluate $E[\max(X, 7)]$.

이거 잘못했음.

$$f(x) = 7e^{-7x}$$

$$\int_{-\infty}^7 7x \cdot 7e^{-7x} dx + \int_7^{\infty} x \cdot 7e^{-7x} dx$$

$$= \int_0^7 49e^{-7x} dx + \int_7^{\infty} 7xe^{-7x} dx$$

$$[-7e^{-7x}]_0^7 + [-xe^{-7x}]_7^{\infty} - \int_7^{\infty} e^{-7x} dx$$

$$\begin{aligned}
 & (-7e^{-49} - (-7)) + (0 - (-7e^{-49})) + \int_7^{\infty} e^{-7x} dx \\
 &= -7e^{-49} + 7 + 7e^{-49} + \left[-\frac{e^{-7x}}{7} \right]_7^{\infty} \\
 &= 7 + \left(0 - \left(-\frac{e^{-49}}{7} \right) \right) \\
 &= \boxed{7 + \frac{e^{-49}}{7}}
 \end{aligned}$$

<case 3>

Exercise 10

For $X \sim \exp(7)$, evaluate $\mathbb{E}[\max(X, 7)]$.

$$f(x) = 7e^{-7x} (x \geq 0)$$

0 (otherwise)

$$\mathbb{E}[\max(X, 7)] = \int_{-\infty}^{\infty} \max(X, 7) f(x) dx$$

$$= \int_{-\infty}^0 \max(X, 7) \cdot 0 dx + \int_0^7 7 \cdot 7e^{-7x} dx + \int_7^{\infty} X \cdot 7e^{-7x} dx$$

$$= 49 \left[-\frac{1}{7} e^{-7x} \right]_0^7 + 7 \left(\left[-\frac{1}{7} x e^{-7x} \right]_7^{\infty} - \int_7^{\infty} e^{-7x} dx \right)$$

$$= -7e^{-49} + 7 + 7e^{-49} - 7 \left[-\frac{1}{7} e^{-7x} \right]_7^{\infty}$$

$$= 7 - e^{-49}$$

$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{7}$
 $\mathbb{E}[\max(X, 7)] \geq \mathbb{E}[7]$
 $\therefore \max(X, 7) \geq 7$ always

#11번

Exercise 11

For $X \sim \text{exp}(8)$, find x^* such that $F(x^*) = 0.6$.

$$\text{pdf } f(x) = \begin{cases} 8e^{-8x} & \text{if } x \geq 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\text{cdf } F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-8x} & \text{if } x \geq 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$F(x^*) = \frac{1 - e^{-8x^*}}{1} = 0.6 \quad \text{Equation}$$

$$e^{-8x^*} = 0.4$$

$$\frac{1}{e^{8x^*}} = \frac{2}{5}$$

$$e^{8x^*} = \frac{5}{2}$$

$$\ln x \left($$

$$8x^* = \ln\left(\frac{5}{2}\right) = \ln 5 - \ln 2$$

$$\therefore x^* = \frac{\ln 5 - \ln 2}{8}$$

#12번

Exercise 12

For $X \sim U(10, 20)$, find x^* such that $F(x^*) = 0.7$.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } x < 10 \\ \frac{x-10}{10} & \text{if } 10 \leq x \leq 20 \\ 1 & \text{if } x > 20 \end{cases}$$

$$F(x^*) = 0.7$$

$$F(\max(x, 0)) = 0.7$$

$$F(0) = 0 \neq 0.7$$

$$\therefore F(x^*) = F(x) = 0.7$$

For getting the value 0.7, x should be between 10 and 20

$$\therefore F(x) = \frac{x-10}{10} = 0.7$$

$$\frac{x-10}{10} = \frac{7}{10}$$

$$\therefore x = 17$$

$$x^* = \max(0, 17) = 17$$