

# Résolution de récurrences

Il arrive souvent que pour analyser la complexité d'un algorithme on doive résoudre une récurrence.

**Exemple:** Dans le cas du produit de deux entiers de  $n$  chiffres et de l'algorithme diviser-pour-régner, on avait:

$$T(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 3T(\lceil \frac{n}{2} \rceil) + n & \text{sinon} \end{cases}$$

Comment résoudre?

# Résolution de récurrences

## Solution 1: Intuition ou conjecture

Étape 1: Calculer les premières valeurs de la récurrence

Étape 2: Regarder pour des “patterns” ou régularités

Étape 3: Trouver une forme générale

Étape 4: Démontrer que cette forme est correcte

# Résolution de récurrences

## Récurrences linéaires homogènes à coefficients constants:

Soit la récurrence  $R$

$$a_0 t_n + a_1 t_{n-1} + \dots + a_k t_{n-k} = 0$$

Voici les étapes de la résolution:

- 1) Trouver le polynôme caractéristique  $P(x)$  de la récurrence  $R$
- 2) Trouver les racines de  $P(x)$

Si ces racines sont distinctes

- 3) La solution générale est de la forme  $t_n = \sum_{i=1}^k c_i r_i^n$
- 4) Résoudre le système d'équations linéaires donné par les conditions initiales pour trouver la valeur des constantes  $c_1, c_2, \dots, c_k$
- 5) Écrire la solution  $t_n$  en fonction de ces constantes  $c_i$

# Résolution de récurrences

## Récurrences linéaires homogènes à coefficients constants:

Soit la récurrence  $R$

$$a_0 t_n + a_1 t_{n-1} + \dots + a_k t_{n-k} = 0$$

Voici les étapes de la résolution:

- 1) Trouver le polynôme caractéristique  $P(x)$  de la récurrence  $R$
- 2) Trouver les racines de  $P(x)$

Si ces racines ne sont pas toutes distinctes

- 3) La solution générale est de la forme  $t_n = \sum_{i=1}^{\ell} \sum_{j=0}^{m_i-1} c_{ij} n^j r_i^n$

où on a  $\ell$  racines  $r_i$  de multiplicité  $m_i$

- 4) Résoudre le système d'équations linéaires donné par les conditions initiales pour trouver la valeur des constantes  $c_1, c_2, \dots, c_k$
- 5) Écrire la solution  $t_n$  en fonction de ces constantes  $c_i$

# Résolution de récurrences

Récurrences linéaires non-homogènes à coefficients constants (cas particulier):

Soit la récurrence  $R$

$$a_0 t_n + a_1 t_{n-1} + \dots + a_k t_{n-k} = b^n$$

où  $b$  est une constante.

Voici les étapes de la résolution:

1) On commence par transformer cette récurrence en une récurrence homogène

Pour ce cas particulier, on peut multiplier la récurrence  $R$  par  $b$  et ensuite remplacer  $n$  par  $n - 1$  dans l'équation obtenue

Si on soustrait de la récurrence initiale, cette nouvelle récurrence, nous obtenons une récurrence homogène  $R^*$

2) Résoudre  $R^*$  (cas homogène) comme d'habitude mais en s'assurant que les conditions initiales satisfont aussi l'équation de départ

$$a_0 t_n + a_1 t_{n-1} + \dots + a_k t_{n-k} = b^n$$