
grouped and measured on the same positions (biased)
grouped on one half, measured on the other
protein20 (20) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
uniprot18 (18) 0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 0.91 0.91 0.91 0.92 0.93
hsdm17 (17) 1.16 0.99 0.93 0.89 0.86 1.02 0.97 0.93 0.90 0.87
wass14 (14) 0.75 0.77 0.79 0.81 0.84 0.78 0.79 0.80 0.82 0.84
mmseqs12 (12) 1.13 1.00 0.96 0.92 0.86 1.01 0.99 0.96 0.93 0.88
sdm12 (12) 1.24 0.99 0.89 0.82 0.76 1.03 0.96 0.90 0.84 0.77
funcgroups8 (8) 0.80 0.69 0.65 0.64 0.63 0.70 0.68 0.67 0.66 0.65
gbmr7 (7) 0.31 0.27 0.26 0.27 0.29 0.30 0.28 0.28 0.28 0.30
dayhoff6 (6) 1.20 0.91 0.80 0.72 0.64 0.96 0.87 0.81 0.74 0.66
wwmj5 (5) 1.13 0.80 0.68 0.61 0.57 0.88 0.77 0.69 0.63 0.58
gbmr4 (4) 1.14 0.73 0.57 0.47 0.39 0.84 0.69 0.59 0.49 0.40
polarity4 (4) 0.57 0.44 0.41 0.41 0.42 0.48 0.44 0.43 0.42 0.43
hp_lehninger_hpc3 (3) 0.81 0.51 0.40 0.33 0.29 0.60 0.49 0.41 0.35 0.31
hp_kyte_doolittle2 (2) 0.90 0.53 0.40 0.32 0.26 0.65 0.50 0.41 0.33 0.28
hp_lehninger2 (2) 0.77 0.48 0.37 0.31 0.28 0.57 0.46 0.39 0.33 0.29
hp_lehninger_c_nonpolar2 (2) 0.81 0.49 0.38 0.32 0.27 0.59 0.47 0.39 0.33 0.29
hp_pbotc_1st_ed2 (2) 1.01 0.59 0.44 0.35 0.29 0.72 0.56 0.45 0.37 0.31
hp_thomas_dill2 (2) 1.13 0.64 0.47 0.36 0.29 0.79 0.61 0.48 0.38 0.30
hp_thomas_dill_no_c2 (2) 1.07 0.61 0.45 0.35 0.28 0.75 0.58 0.46 0.37 0.30
<=20% >20-30% >30-40% >40-60% >60%
<=20% >20-30% >30-40% >40-60% >60%
Identity (20 amino acids) of the positions used for grouping
Identity (20 amino acids) of the positions used for grouping
4.00
2.83
2.00
1.41
1.11
0.90
0.71
0.50
0.35
0.25
I(alphabet) / I(20 aa)