



# 重症医学主治医师考试精选习题与解析

## 重症医学主治医师考试模拟试题单选题(一)

一、单选题（每题1个得分点）：以下每道考题有五个备选答案，请选择一个最佳答案。

1. 下列说法不正确的是（ ）
- A. 口咽通气道可诱发喉痉挛
  - B. 浅麻醉时拔除气管导管易诱发喉痉挛
  - C. 伤口疼痛是全麻后通气量减少的主要原因
  - D. 病人出现哮鸣音、荨麻疹、低血压时，应考虑过敏反应
  - E. 任何一种抗胆碱酯酶药均能诱发窦性心律不齐

正确答案:C

2. 呼吸支持的主要指征是（ ）
- A. 通气功能障碍
  - B. 呼吸停止
  - C. 低氧血症
  - D. 低氧血症和通气功能障碍
  - E. 窒息

正确答案:D

3. 一般认为在服毒后多少时间内洗胃有效（ ）
- A. 1小时
  - B. 3小时
  - C. 6小时
  - D. 12小时
  - E. 24小时

正确答案:C

4. 患者，女，20岁。作静脉胆道造影检查时，出现神志淡漠，心悸、出冷汗，口唇发绀，面色苍白，HR110次/分，RR25次/分，BP60/45mmHg，最可能的诊断是（ ）
- A. 心源性休克
  - B. 过敏性休克
  - C. 脓毒性休克
  - D. 低血容量性休克
  - E. 神经源性休克

正确答案:B

5. 患者，男，72岁。神志不清，大动脉搏动消失，瞳孔散大；急救人员开始进行心肺复苏时，胸外心脏按压的推荐频率是（ ）
- A. 60~80次/分
  - B. 60~100次/分



## 重症医学主治医师考试精选习题与解析

- C. 50~80次/分
- D. 60~120次/分
- E. 80~100次/分

正确答案:E

6. 关于酒精中毒的实验室检查不正确的是 ( )

- A. 代谢性酸中毒
- B. 低血钾
- C. 低血镁
- D. 低血钙
- E. 高血糖

正确答案:E

7. 患者,男,17岁。在郊外活动时,不慎被蛇咬伤。PE:左腕部可见牙痕,错误的做法为 ( )

- A. 清洗伤口
- B. 结扎咬伤部位
- C. 射抗蛇毒血清
- D. 服中药蛇药片
- E. 跑到就近诊疗所

正确答案:E

8. 患者,男,20岁。郊游时,右足疼痛,30min后无力行走,体检示:牙关紧闭,足背可见I双点状,牙痕,伴红肿。BP90/60mmHg,最好的解毒方法是 ( )

- A. 抗蛇毒血清
- B. 抗生素
- C. 破伤风抗毒素
- D. 止血带结扎伤口上方近心端
- E. 止血带结扎伤口上方离心端

正确答案:A

9. 下列哪一种药物中毒最不易引起精神障碍 ( )

- A. 阿司匹林
- B. 阿托品
- C. 异烟肼
- D. 抗组胺药
- E. 肾上腺皮质激素

正确答案:A

10. 每日使用胺碘酮的最大剂量为 ( )

- A. 1.0g
- B. 1.5g
- C. 2.0g
- D. 2.5g
- E. 3.0g

正确答案:B

11. 关于催吐, 下列说法不正确的是 ( )

- A. 空腹服毒者要先饮水500ml
- B. 可用药物吐根糖浆催吐
- C. 吞服腐蚀性毒物时, 不宜催吐
- D. 吞服石油蒸馏物应立即进行催吐
- E. 催吐应直到胃内容物完全呕出为止

正确答案:D

12. 下列有机磷杀虫药毒性最高的是 ( )

- A. 锌硫磷
- B. 氧尔朱
- C. 对硫磷
- D. 敌百虫
- E. 敌敌畏

正确答案:C

13. 患者, 女, 68岁、胸痛、出冷汗, 神志淡漠, 口唇发绀、面色苍白, 脉搏50次/分, BP74/56mmHg, ECG示: 窦性心动过缓, II、III、aVF导联可见S-T段抬高, CK-MB为40ng/ml, 在补充血容量基础上, 中剂量多巴胺治疗的常用剂量是 ( )

- A. 1~2ug/(kg·min)
- B. 2~6ug/(kg·min)
- C. 1~5ug/(kg·min)
- D. 3~10ug/(kg·min)
- E. 6~10ug/(kg·min)

正确答案:D

14. 接触下列哪一种物质或工作环境不可能引起铅中毒 ( )

- A. 轮船修造和焊接
- B. 口服过量的铅笔芯粉
- C. 蓄电池安装
- D. 长期用锡壶饮酒
- E. 服用过量的樟丹、黑锡丹

正确答案:B

15. 下列哪项是危重患者的静态营养检测内容 ( )

- A. 机体的蛋白质状态
- B. 机体脂肪的储存状态
- C. 机体免疫状态
- D. 机体细胞的总数
- E. 以上都是

正确答案:E

16. 呋塞米治疗急性肺水肿时的常用剂量为 ( )

- A. 0.1~0.5mg/kg
- B. 1.0~1.5mg/kg
- C. 1.5~2.0mg/kg
- D. 2.0~2.5mg/kg
- E. 0.5~1.0mg/kg

正确答案:E

17. 有机磷农药中毒烟碱样症状表现为 ( )

- A. 多汗、流涎
- B. 尿失禁
- C. 头晕、头痛
- D. 肌肉颤动
- E. 肺水肿

正确答案:D

18. 理化因素所致疾病的诊断原则除外 ( )

- A. 病因
- B. 靶部位
- C. 剂量与效应关系
- D. 流行病学调查分析
- E. 侵害的途径与方法

正确答案:E

19. 休克临床表现错误的是 ( )

- A. 中心静脉压增高至12cmH<sub>2</sub>O 以上
- B. 脉压降至4kPa 以下
- C. 尿量不足30ml/h
- D. 神志烦躁或淡漠
- E. 血压下降至12kPa 以下



## 重症医学主治医师考试精选习题与解析

正确答案:A

20. 下列哪一种化学物质可引起瘫痪 ( )

- A. 硫酸钡
- B. 氯化钴
- C. 亚甲蓝(美蓝)
- D. 亚硝酸异戊酯
- E. 氯化钡

正确答案:E

21. 患者出现下列哪种情况应立即准备行气管插管 ( )

- A. 深快而大的呼吸
- B. 高热抽搐的患儿
- C. 心包大量积液
- D. 大咯血窒息
- E. 间停呼吸

正确答案:E

22. 下列哪项是清醒期血流动力学紊乱的原因 ( )

- A. 高血压、低血压
- B. 低氧和高 CO<sub>2</sub> 血症
- C. 体温变化
- D. 药物效应
- E. 以上都是

正确答案:E

23. 心血管功能的监护内容除外 ( )

- A. 24小时的尿量
- B. 心律
- C. 组织供血供氧状态
- D. 中心静脉压
- E. 心率

正确答案:A

24. 在医院任何地方或救护车内发生的心脏停搏, 从发病至电除颤的时间在多少分钟内最佳 ( )

- A. 1分钟
- B. 2分钟
- C. 3分钟

- D. 4分钟
- E. 5分钟

正确答案:C

25. 为了及时治疗急性中毒，应以下列哪项作为中毒诊断的主要依据 ( )
- A. 毒物接触史
  - B. 临床表现
  - C. 毒物分析
  - D. 毒物接触史+毒物分析
  - E. 毒物接触史+临床表现

正确答案:E

26. 有机磷杀虫药中毒发生肺水肿，首选措施是 ( )
- A. 碘解磷定
  - B. 强心苷
  - C. 吗啡
  - D. 阿托品
  - E. 反复洗胃

正确答案:D

27. 重度出血性休克的失血量一般为 ( )
- A. >2100ml
  - B. 2100~1700ml
  - C. 1700~1200ml
  - D. 1200~800ml
  - E. <75ml

正确答案:B

28. 汽油属于哪种有机溶剂 ( )
- A. 芳香烃类
  - B. 醇类
  - C. 卤代烃类
  - D. 脂肪开链烃类
  - E. 脂肪族环烃类

正确答案:D

29. 喉痉挛时，首先应采取的措施是 ( )
- A. 糖皮质激素
  - B. 雾化吸入混悬麻黄碱



- C. 静注琥珀胆碱
- D. 托下颌，面罩吸氧，或持续正压辅助呼吸
- E. 放置口咽通气道

正确答案:D

30. 消化道大出血导致的休克为 ( )

- A. 心源性休克
- B. 低血容量性休克
- C. 脓毒性休克
- D. 过敏性休克
- E. 神经性休克

正确答案:B

31. 对缺氧耐受最低的是 ( )

- A. 肺
- B. 肾脏
- C. 心肌
- D. 大脑皮质
- E. 肝脏

正确答案:D

32. 男，20岁，服敌百虫2小时入院。查体：皮肤湿冷，呈昏迷状态，双瞳孔直径2mm，双肺中下部湿性啰音，心率80次/分，律齐，无杂音。下列哪项处理是错误的 ( )

- A. 给氧
- B. 2%碳酸氢钠洗胃
- C. 静脉注射阿托品
- D. 静脉滴注双复磷
- E. 静脉注射呋塞米

正确答案:B

33. 多巴胺主要起 B 受体激动作用时的用药剂量是 ( )

- A. 1~5  $\mu$ g/(kg·min)
- B. 5~10  $\mu$ g/(kg·min)
- C. 10~15  $\mu$ g/(kg·min)
- D. 15~20  $\mu$ g/(kg·min)
- E. 20~25  $\mu$ g/(kg·min)

正确答案:B

34. 哪一种食物中毒以中枢神经系统症状为主要临床表现，且病死率高 ( )

- A. 沙氏菌食物中毒
- B. 嗜盐菌食物中毒
- C. 葡萄球菌食物中毒
- D. 变形杆菌食物中毒
- E. 肉毒中毒

正确答案:C

35. 非心源性肺水肿与呼吸衰竭引起的血气变化不同之处在于前者是 ( )

- A. 代谢性酸中毒
- B. 代谢性碱中毒
- C. 代谢性酸中毒和代谢性碱中毒
- D. 呼吸性碱中毒
- E. 呼吸性酸中毒

正确答案:D

36. 男, 68岁, 因一氧化碳中毒2天入院。查体: 深昏迷, 呼吸尚规则, 余无异常。为了加快一氧化碳的排出, 宜采用的最佳疗法是 ( )

- A. 持续低流量给氧
- B. 高浓度给氧
- C. 高压氧治疗
- D. 上呼吸机
- E. 呼吸兴奋剂静脉滴注

正确答案:C

37. 对于慢性酒精中毒所致 Wernicke 脑病, 治疗首选 ( )

- A. 氧疗
- B. VitB1
- C. VitB2
- D. 甘露醇
- E. 纳洛酮

正确答案:B

38. 急性 CO 中毒的抢救, 下列哪一项一般不用 ( )

- A. 纠正缺氧
- B. 防治脑水肿
- C. 促进脑细胞功能恢复
- D. 防治并发症
- E. 血液透析

正确答案:E





## 重症医学主治医师考试精选习题与解析

39. 治疗冻僵，复温速度最快的是 ( )

- A. 厚棉被包裹复温
- B. 电热毯复温
- C. 40℃灌流液进行体内灌流复温
- D. 40℃温水浴复温
- E. 体外循环复温

正确答案:E

40. 患者呼出气中，下列哪一项气味有助于判断硫化氢中毒 ( )

- A. 蒜味
- B. 水果香味
- C. 苦杏仁味
- D. 鞋油味
- E. 臭鸡蛋味

正确答案:E

41. 关于吗啡中毒的临床表现，下列哪项不正确 ( )

- A. 便秘
- B. 呼吸浅慢
- C. 恶心、呕吐
- D. 瞳孔扩大
- E. 心动过缓

正确答案:D

42. 降低颅内压最迅速、最有效的方法是 ( )

- A. 脱水
- B. 控制躁动
- C. 降低动脉 CO<sub>2</sub> 分压
- D. 止痛
- E. 降低动脉血 O<sub>2</sub> 分压

正确答案:C

43. 男、56岁，突发晕厥收入 ICU，心率39次/分，血压100/70mmHg，诊断为 SSS 综合征哪项监测最合适 ( )

- A. EEG
- B. NBP
- C. CO
- D. CVP
- E. ECG

正确答案:E

44. 急性失血时, 下列哪项关于机体的早期代偿反应错误的是 ( )

- A. 交感-肾上腺髓质兴奋
- B. 贮血器官(肝、脾)和皮肤血管收缩
- C. 血管升压素和醛固酮分泌增加
- D. 组织间液移向血管内
- E. 细胞内液移向血管内

正确答案:E

45. 下列哪项不是 MODS 的发生机制 ( )

- A. 肠道屏障功能障碍
- B. 急性肺部感染伴发心、肾功能不全
- C. 脏器细胞凋亡增加
- D. SIRS
- E. 血管内皮细胞损伤和炎性介质影响细胞内氧利用

正确答案:B

46. 下列哪一项不是清醒期间低血压的原因 ( )

- A. 前负荷降低
- B. 寒战
- C. 高热
- D. 外周阻力下降
- E. 心功能受抑制

正确答案:B

47. 女, 30岁, 与人发生口角后服敌敌畏, 昏迷2小时入院。查体: 血压8. 0/5. 3kPa(60/40mmHg), 昏迷, 多汗, 小便失禁, 双侧瞳孔小如针尖, 全身肌肉震颤, 心率100次/分, 律齐, 双肺底可闻湿性啰音。应用阿托品治疗时下列哪项是错误的 ( )

- A. 早期给予足量阿托品
- B. 静脉给药, 尽快阿托品化
- C. 达阿托品化后立即停药
- D. 与胆碱酯酶复能剂合用时, 阿托品剂量应减少
- E. 根据病情调整阿托品剂量

正确答案:C

48. 不属于缩血管活性药的是 ( )

- A. 多巴胺
- B. 东莨菪碱

- C. 阿拉明
- D. 新福林
- E. 肾上腺素

正确答案:B

49. 下列哪项指标可预示6个月内急性冠状动脉综合征发生的恶性心脏事件 ( )

- A. C 反应蛋白 (CRP)
- B. 心肌钙蛋白 T (CTn-T)
- C. 乳酸脱氢酶 (LDH)
- D. 肌酸磷酸激酶同工酶 (CK-MB)
- E. 肌红蛋白 (Mb)

正确答案:A

50. 利多卡因连续静脉滴注多少小时后应减量 ( )

- A. 12小时
- B. 24小时
- C. 36小时
- D. 48小时
- E. 60小时

正确答案:B

51. 下列哪种急性心肌梗死常合并窦性心动过缓 ( )

- A. 前间壁心肌梗死
- B. 下壁心肌梗死
- C. 后壁心急梗死
- D. 高侧壁心肌梗死
- E. 局限前壁心肌梗死

正确答案:B

52. 下列哪种情况应减慢补液的速度 ( )

- A. 甲亢患者
- B. 高热患者
- C. 休克
- D. 一般的贫血患者
- E. 严重主动脉瓣关闭不全的患者

正确答案:E

53. 损伤的现场急救不包括 ( )

- A. 心肺复苏

- B. 控制外出血
- C. 内脏复位
- D. 骨折固定
- E. 解救窒息

正确答案:C

54. 现场需要心肺复苏抢救的特危重患者通常 ( )

- A. 小于1%
- B. 5%~10%
- C. 10%~15%
- D. 小于5%
- E. 以上都不是

正确答案:D

55. 心源性休克最常见的病因为 ( )

- A. 重症心肌炎
- B. 急性广泛心肌梗死
- C. 严重心功能不全
- D. 急性心脏压塞
- E. 心房黏液瘤

正确答案:B

56. 下列哪一项不是呼吸监测的主要指征 ( )

- A. 神志不清
- B. 少尿
- C. 血气状况进行性恶化
- D. 心肺复苏术后
- E. 休克

正确答案:B

57. 用作生物恐怖的生物剂为 ( )

- A. 细菌
- B. 病毒
- C. 立克次氏体
- D. 毒素
- E. 以上都是

正确答案:E

58. 一次使用维拉帕米的最大剂量为 ( )

- A. 10mg
- B. 15mg
- C. 20mg
- D. 25mg
- E. 30mg

正确答案:C

59. 恢复室内病人拔除气管导管的潮气量是 ( )

- A. >3ml/kg
- B. >5ml/kg
- C. >7ml/kg
- D. >8ml/kg
- E. >6.5ml/kg

正确答案:B

60. 开放性损伤的特点除外哪项 ( )

- A. 创伤处皮肤粘膜破损
- B. 体腔或骨面与体外相通
- C. 感染机会多
- D. 外出血
- E. 不需要清创

正确答案:E

61. 休克时, 监测尿量的主要目的是了解 ( )

- A. 肾皮质功能
- B. 血压
- C. 酸中毒
- D. 心功能
- E. 器官血液灌注状态

正确答案:E

62. 最严重的急性高原病是 ( )

- A. 高原心脏病
- B. 高原脑水肿
- C. 急性高原反应
- D. 高原肺水肿
- E. 高原红细胞增多症

正确答案:B

63. 重症监护治疗病房 (ICU) 的主要临床任务是 ( )

- A. 危重患者的监护与救治
- B. 危重患者的集中监护
- C. 对危重患者进行特种检查
- D. 对危重患者进行各种监测
- E. 手术后患者无创监测

正确答案:A

64. 双侧瞳孔缩小的病因除外 ( )

- A. 有机磷杀虫剂中毒
- B. 吗啡类药物中毒
- C. 杀虫脒中毒
- D. 巴比妥类药物中毒
- E. 苯二氮<sup>䄂</sup>类药物中毒

正确答案:C

65. 颤动或无脉性室性心动过速经电击除颤或肾上腺素治疗无效时, 可给予大剂量的利多卡因, 其剂量是 ( )

- A. 2mg/kg
- B. 3mg/kg
- C. 1.5mg/kg
- D. 2.5mg/kg
- E. 3.5mg/kg

正确答案:C

66. 下列哪种农药中毒可出现肌颤 ( )

- A. 有机氮杀虫剂
- B. 有机氯杀虫剂
- C. 有机氟杀虫剂
- D. 有机磷杀虫剂
- E. 拟除虫菊酯类杀虫剂

正确答案:D


67. 由于汽车尾气等城市污染, 最可能造成对儿童的伤害是 ( )

- A. 苯中毒
- B. 铅中毒
- C. 一氧化碳中毒
- D. 钴中毒
- E. 锰中毒



正确答案:B

68. 男, 62岁, 8小时前患者突发右侧肢体瘫痪1天, 构音不清, CT 检查如图, 最可能的诊断是 ( )



- A. 脑梗死
- B. 星形胶质瘤
- C. 脑脓肿
- D. 少突胶质细胞瘤
- E. 血管母细胞瘤

正确答案:A

69. 心肺复苏时重复使用肾上腺素的间隔时间为 ( )

- A. 1~3分钟
- B. 3~5分钟
- C. 5~7分钟
- D. 7~10分钟
- E. 5~10分钟

正确答案:B

70. 口服毒物中毒后, 最常用的吸附剂是 ( )

- A. 氢氧化铝
- B. 牛奶
- C. 鸡蛋清
- D. 活性炭
- E. 吐根糖浆

正确答案:D

71. 急性苯中毒主要表现为 ( )

- A. 中枢神经系统损害症状
- B. 中毒性肝损害
- C. 肾衰竭
- D. 贫血
- E. 中毒性肺炎

正确答案:A

72. 心搏骤停最常见的原因 ( )

- A. 心房颤动
- B. 心动过速
- C. 心室颤动
- D. 肺炎
- E. 心衰

正确答案:C

73. 哪一种中毒最易引起出血 ( )

- A. 阿司匹林中毒
- B. 敌鼠钠盐中毒
- C. 安妥中毒
- D. 磷化锌中毒
- E. 灭鼠优中毒

正确答案:B

74. 患者，男，67岁。胸痛10小时，伴冷汗淋漓，以往有高血压和主动脉夹层分离病史，体检：口唇发绀，脉搏细速，P110次/分，BP70/50mmHg，ECG示心肌缺血，血清淀粉酶正常，血糖正常。下列哪一项是最可能的诊断 ( )

- A. 急性出血性坏死性胰腺炎
- B. 肾上腺危像
- C. 糖尿病酮症酸中毒
- D. 脓毒性休克
- E. 心源性休克

正确答案:E

75. 阿片类中毒的药物治疗 ( )

- A. 尼可刹米
- B. 洛贝林

- C. 氟马西尼
- D. 纳洛酮
- E. 二巯丙醇(BAL)


正确答案:D

76. 应在启动急救医疗服务系统后多少分钟内完成电除颤 ( )

- A. 3分钟
- B. 5分钟
- C. 4分钟
- D. 6分钟
- E. 8分钟

正确答案:B

77. 43岁女性患者，突发左手疼痛伴多个指头麻木就诊，行左上肢动脉造影，示左侧桡动脉广泛的充盈缺损，结合临床考虑左侧桡动脉病变为 ( )





- A. 桡动脉夹层
- B. 桡动脉炎
- C. 桡动脉真性动脉瘤
- D. 桡动脉血栓形成
- E. 桡动脉假性动脉瘤

正确答案:D

78. 女, 38岁, 今晨被家人发现昏迷即送来院。过去体健。查体: 体温 $36.7^{\circ}\text{C}$ , 血压 $12.0/8.0\text{kPa}$  ( $90/60\text{mmHg}$ ), 脉搏106次/分, 深昏迷, 呼吸时无蒜臭, 皮肤多汗, 瞳孔如针尖大小, 对称, 心率106次/分, 律齐, 双肺可闻及湿性啰音, 神经系统检查无异常。最可能的诊断是 ( )

- A. 低血糖昏迷
- B. 安眠药中毒
- C. 脑血管意外
- D. 糖尿病酮症酸中毒昏迷
- E. 有机磷农药中毒

正确答案:E

79. 夫妇二人冬季在房内睡眠, 次日上午被人发现均呈昏迷状态, 身边有呕吐物。查体: 均面色红润, 瞳孔 $2\sim 3\text{mm}$ , 对光反应弱, 心、肺未发现异常, 尿失禁。最可能的诊断是 ( )

- A. 脑出血
- B. 脑血栓形成
- C. 镇静催眠药中毒
- D. 流行性脑炎
- E. CO中毒

正确答案:E

80. 正常成人肺活量约为 ( )

- A.  $50\text{ml/kg}$
- B.  $60\text{ml/kg}$

- C. 55ml/kg
- D. 70ml/kg
- E. 45ml/kg

正确答案:D

81. 重金属中毒时应该用哪种解毒剂 ( )

- A. 依地酸二钠钙
- B. 二巯丁二钠
- C. 二巯丙醇
- D. 二巯基丙磺酸钠
- E. 二乙烯三胺三五乙酸

正确答案:B

82. 对肾后性尿路梗阻的诊断,除外哪项 ( )

- A. 突然发生完全性无尿或间歇性无尿
- B. 有泌尿系结石、盆腔早期肿瘤或手术史
- C. 有肾绞痛与肾区叩击痛
- D. B超或X线泌尿系检查对诊断帮助不大
- E. 尿常规检查无明显改变

正确答案:D

83. 女, 25岁, 劳动后4h 出现头痛、头晕, 恶心、呕吐, 多汗, 视物模糊, 瞳孔缩小, 2h 后到医院就诊。查体: 意识模糊, 两肺听诊可闻及较多湿啰音, 可见肌纤维颤动。全血胆碱酯酶活力为16%。该患者最可能的诊断是 ( )

- A. 急性有机磷杀虫药中毒
- B. 急性氨基甲酸酯类杀虫药中毒
- C. 拟除虫菊类杀虫药中毒
- D. 杀虫脒中毒
- E. 中暑

正确答案:D


84. 男, 35岁, 口服敌百虫300ml 后昏迷2小时, 入院时给予高锰酸钾液洗胃, 并用阿托品2mg, 静脉注射, 每30分钟重复1次; 解磷定 0.5g, 静脉注射, 每1小时重复1次。中毒后8小时出现气促、发绀、呼吸不规则, 率136次/分, 双肺满布干湿性啰音。其病情变化的原因是 ( )

- A. 阿托品中毒
- B. 解磷定中毒
- C. 脑水肿
- D. 迟发性神经病
- E. 解毒剂剂量不足



正确答案:E

85. 女, 10岁, 右下腹痛, 腹部包块一月余, 站立时突出明显, 平卧时消失, 表面光滑, 影像检查如图, 最可能的诊断是 ( )



- A. 腹壁囊肿
- B. 右侧腹股沟疝
- C. 小肠梗阻
- D. 腹壁纤维瘤
- E. 腹壁血肿

正确答案:B

86. 休克患者使用低分子右旋糖酐, 可发生出血倾向的剂量是 ( )

- A. >250ml/24h



- B. >500ml/24h
- C. >750ml/24h
- D. >1000ml/24h
- E. >1500ml/24h

正确答案:D

87. 临床上最常见的引起中毒的杀虫剂为 ( )

- A. 有机氮类
- B. 有机磷类
- C. 有机氯类
- D. 除草剂
- E. 杀菌剂

正确答案:B

88. “生存链”的环节中, 哪个环节为抢救患者生命的关键一环 ( )

- A. 早期识别
- B. 早期电除颤
- C. 早期心肺复苏
- D. 早期启动急救医疗服务体系
- E. 早期高级心血管生命支持

正确答案:B

89. 一般在服毒后几小时内洗胃有效 ( )

- A. 48小时内
- B. 24小时内
- C. 4~6小时
- D. 12小时
- E. 11小时

正确答案:C

90. 休克时, 最关键的环节是 ( )

- A. 低血压
- B. 心功能不全
- C. 代谢性酸中毒
- D. 低血容量
- E. 组织细胞缺血缺氧

正确答案:E

91. 男性患者, 62岁, 咳嗽发热两天, 痰中带血, 胸片检查如图, 最合理的诊断是 ( )



- A. 左下肺炎症
- B. 左肺癌伴阻塞性肺炎
- C. 细支气管肺泡癌
- D. 左侧胸膜炎
- E. 左侧胸腔积液

正确答案:B

92. 关于溺水治疗错误的是 ( )

- A. 迅速清除口鼻内的污物
- B. 采取头低腹卧位进行引流
- C. 心肺复苏应该最先进行
- D. 有条件气管插管
- E. 防止呕吐物进入气道

正确答案:C

93. 正常体温时,一旦心脏停搏,脑组织储备的糖原和 ATP 逐渐耗尽的时间是 ( )

- A. 15~20 分钟
- B. 2~4 分钟
- C. 10~15 分钟
- D. 4~6 分钟
- E. 5~10 分钟

正确答案:D

94. 心肺复苏(CPR)时按压/通气比为 ( )

- A. 10:1
- B. 5:1
- C. 30:2
- D. 15:1
- E. 10:2

正确答案:C

95. 下列哪条与动脉压无关 ( )

- A. 心排出量
- B. 呼吸频率
- C. 血管阻力
- D. 血管升压素
- E. 组织缺氧、酸中毒

正确答案:B

96. 中度有机磷杀虫药中毒血胆碱酯酶活力值 ( )

- A. 80%
- B. 70%~50%
- C. 50%~30%
- D. 70%以上
- E. 30%以下

正确答案:C

97. 静脉滴注利多卡因维持用药的剂量 ( )

- A. 1~4mg/kg
- B. 2~6mg/kg
- C. 6~8mg/kg
- D. 6~10mg/kg
- E. 8~12mg/kg

正确答案:A

98. 双侧瞳孔扩大的病因可能是 ( )

- A. 乙醇中毒
- B. 氰化物中毒
- C. 氨基甲酸酯农药中毒
- D. 莨菪类药物中毒
- E. 亚硝酸异戊酯中毒

正确答案:D

99. 下列哪种药物中毒, 其临床表现主要为锥体外系反应 ( )

- A. 苯二氮<sub>䜀</sub>类
- B. 巴比妥类
- C. 非巴比妥非苯二氮<sub>䜀</sub>类

- D. 阿片类
- E. 吩噻嗪类

正确答案:E

100. 正在接受机械通气的患者,其呼吸系统有效顺应性的大小,取决于下列哪一项 ( )

- A. 气道阻力
- B. 肺顺应性
- C. 胸壁顺应性
- D. 气道阻力和肺胸壁顺应性
- E. 呼吸频率

正确答案:D

更多2011年重症医学主治医师考试资料、历年真题、习题精讲  
考试大纲 请联系绿网先锋

绿网先锋 整理收藏

联系方式: QQ 541881646

Q 群①65323773

②71907104

③109698971

网站: 淘宝网店 <http://shop60023270.taobao.com/>

交流论坛 <http://5a6a.5d6d.com>