Devoir Libre 9

Exercice 1: Développement Eulérien et Fonction périodique

Partie 1: Etude de φ

1. Symétrie et prériode

(a) $D = \mathbb{R} - \mathbb{Z}$ Pour $x \in D$, on a :

$$\varphi(x) = \frac{1}{x} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2x}{n^2 - x^2} = \frac{1}{x} - \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$$

Soit x un réel.

Pour que $\varphi(x)$ existe, x doit respecter les conditions : $\begin{cases} x \neq 0 \\ x \neq \pm n \in \mathbb{N} \end{cases}$.

Autrement dit $x \neq a \in \mathbb{Z} \iff x \in D$ Soit $x \in D$

$$\varphi(-x) = \frac{1}{-x} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(-x)}{n^2 - x^2}$$

$$\iff \varphi(-x) = -\frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2x}{n^2 - x^2}$$

$$\iff \varphi(-x) = -\left(\frac{1}{x} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2x}{n^2 - x^2}\right)$$

$$\iff \varphi(-x) = -\varphi(x)$$

Ainsi:

 φ est bien définie sur D et φ est **impaire**.

(b) Soit $x \in D$. Calculons $\varphi(x+1)$:

$$\varphi(x+1) = \frac{1}{x+1} - \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x+1)$$

$$\iff \varphi(x+1) = \frac{1}{x+1} - \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n-(x+1)} - \frac{1}{n+(x+1)}\right)$$

$$\iff \varphi(x+1) = \frac{1}{x+1} - \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n-1-x}\right) + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n+1+x}\right)$$

$$\iff \varphi(x+1) = \frac{1}{x+1} - \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{n-x}\right) + \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{n+x}\right)$$

$$\iff \varphi(x+1) = \frac{1}{x+1} - \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n-x}\right) + \frac{1}{-x}\right) + \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n+x}\right) - \frac{1}{1+x}\right)$$

$$\iff \varphi(x+1) = \frac{1}{x} - \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n-x} - \frac{1}{n+x}\right)$$

$$\iff \varphi(x+1) = \varphi(x)$$

Ainsi:

 φ est 1-préiodique.

Remarque : j'ai noté "1-préiodique" comme on note " π -périodique".

- (c) D n'est pas un intervalle mais une union infinie d'intervalles ouverts. De plus, φ est une somme infinie de fonctions continues, donc je ne pense pas que l'argument "en tant que somme de fonctions continues" marche ici.
- 2. Continuité
 - (a) Soit $x \in [0, 1]$ Soit $h \in]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}[$

$$g(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{2x}{n^2 - x^2}$$

$$\Rightarrow g(x+h) - g(x) = 2 \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{x+h}{n^2 - (x+h)^2} - \frac{x}{n^2 - x^2} \right)$$

- (b) question b
- (c) question c
- (d) question d

Partie 2: Etude d'un endomorphisme de E

- 1. question 1
- 2. question 2
- 3. Etude de l'espace propre de T associé à 2
 - (a) question a
 - (b) question b
 - (c) question c
 - (d) question d
 - (e) question e
 - (f) question f

Partie 3: Etude de cotan

- 1. question 1
- 2. question 2
- 3. question 3
- 4. question 4
- 5. question 5

Partie 4: Développement eulérien

- 1. question 1
- 2. question 2
- 3. question 3
- 4. Application et généralisation
 - (a) question a
 - (b) question b
 - (c) question c

Partie 5: Calcul d'un intégrale à paramètre

- 1. (a) question a
 - (b) question b
 - (c) question c
- 2. question 2
- 3. question 3
- 4. question 4
- 5. question 5
- 6. question 6

Exercice 2: Temps d'attente d'une séquence dans un automate

Partie 1: Etude d'un cas simple

- 1. question 1
- 2. question 2
- 3. question 3
- 4. question 4

Partie 2: Etude d'un cas intermédiaire

- 1. question a
- 2. question a
- 3. question a
- 4. question a
- 5. question a
- 6. question a
- 7. question a
- 8. question a
- 9. question a
- 10. question a
- 11. question a