

Finanzas en R

Optimization

Sebasti n Ega a Santib ez 

Nicol s Leiva D az 

Enlaces del profesor

 <https://sevana.netlify.app>

 <https://github.com/sebaegana>

 <https://www.linkedin.com/in/sebastian-egana-santibanez/>

Regresi n Lineal

En t rminos simples, una regresi n lineal corresponde al intento matem tico y estad stico de analizar como un conjunto de datos se adapta o no a un comportamiento lineal, ya sea esta relaci n directa o no.

Por ejemplo la oferta en donde el precio depende de la cantidad demandada:

$$Precio = \alpha + \beta * Cantidad \quad (1)$$

Se asum a que la relaci n pod a ser de la siguiente manera:

$$Precio = 2 + 2 * Cantidad \quad (2)$$

La regresi n lineal, corresponde al intento de estimar los valores del intercepto o constante y de la pendiente utilizando un metodo matem tico, en base a una muestra para extrapolar el comportamiento de una poblaci n y con esto haciendo uso de principios estad sticos.

Por ejemplo, pretendemos saber si la muestra utilizada nos permite confirmar el signo de la pendiente y el valor de la misma.

Proyección de demanda

Se tiene un proyecto para una empresa de exportación, en donde se pretende realizar una estimación del Tipo de cambio nominal (TCN de ahora en adelante).

- Pregunta ¿por qué podría ser relevante el TCN para un proyecto como este? ¿Existe otro tipo de proyectos en donde también podría ser relevante?

Para esto, el especialista económico plantea que el TCN posee una relación con variables como el precio del cobre (P_{cu}) y el dolar index (DXY).

- ¿Cuál es la razón de pensar en que existe una relación entre el TCN y el PCU? ¿Para el DXY ?

Esto corresponde a una parte importante de la modelación; plantear la relación teórica entre las variables.

Se plantea el siguiente modelo:

$$TCN = \alpha - \beta * P_{cu} \quad (3)$$

Por otra parte, también podría ser:

$$TCN = \alpha + \beta * DXY \quad (4)$$

¿Cuál debería ser la relación entre cada variable y el TCN?, esto corresponde a un paso previo de la estimación económica.

Estimación del modelo

Vemos los modelos por separado:

```
library(tidyverse)
library(readxl)

ejemplo <- read_excel("ejemplo.xlsx")

data <- ejemplo %>%
```

```
mutate(year = substring(fecha, 1, 4),
       ln_tcn = log(TCN),
       ln_dxy = log(`DXY Index`),
       ln_pcu = log(Pcu))

data_subset <- data %>%
  filter(year >= 2014)

modelo_01 <- lm(TCN ~ `DXY Index`, data = data_subset)

summary(modelo_01)
```

Call:

```
lm(formula = TCN ~ `DXY Index`, data = data_subset)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-78.329	-24.316	-7.695	11.964	150.390

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-124.5077	92.0229	-1.353	0.18
`DXY Index`	8.3562	0.9744	8.575	7.9e-13 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 47.88 on 77 degrees of freedom

(1 observation deleted due to missingness)

Multiple R-squared: 0.4885, Adjusted R-squared: 0.4819

F-statistic: 73.54 on 1 and 77 DF, p-value: 7.904e-13

```
modelo_02 <- lm(TCN ~ Pcu, data = data_subset)

summary(modelo_02)
```

Call:

```
lm(formula = TCN ~ Pcu, data = data_subset)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-70.99	-36.83	-11.43	23.39	142.63

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	975.5807	49.1646	19.843	< 2e-16 ***
Pcu	-1.1565	0.1807	-6.402	1.1e-08 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 54.08 on 77 degrees of freedom

(1 observation deleted due to missingness)


Multiple R-squared: 0.3473, Adjusted R-squared: 0.3389

F-statistic: 40.98 on 1 and 77 DF, p-value: 1.103e-08

Observamos la relación en un gráfico de dispersión:

```
plot(data_subset$Pcu, data_subset$TCN,
     pch = 16, cex = 1.3, col = "blue",
     main = "Relación TCN y Pcu",
     xlab = "Pcu", ylab = "TCN")

abline(lm(TCN ~ Pcu, data = data_subset))
```



¿Cómo interpretarÅ usted estos valores?

¿Existe alguna particularidad en los valores de la estimaci3n? Los valores asociados a los parÅmetros estimados son particularmente grandes (especialmente el valor de la constante).

Una soluci3n a esto, muy utilizada en la prÅctica, es la utilizaci3n de los logaritmos de las variables. Esto tiene dos ventajas:

1. Soluciona problemas de escala.
2. Permite la interpretaci3n en porcentajes.

Con la regresi3n logaritmos:

```
modelo_03 <- lm(ln_tcn ~ ln_pcu, data = data_subset)
summary(modelo_03)
```

Call:

```
lm(formula = ln_tcn ~ ln_pcu, data = data_subset)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-0.11939	-0.05259	-0.01125	0.04046	0.20579

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	8.99887	0.39263	22.919	< 2e-16 ***
ln_pcu	-0.44835	0.07021	-6.386	1.18e-08 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1


Residual standard error: 0.08006 on 77 degrees of freedom

(1 observation deleted due to missingness)

Multiple R-squared: 0.3462, Adjusted R-squared: 0.3377

F-statistic: 40.78 on 1 and 77 DF, p-value: 1.181e-08

```
plot(data_subset$ln_pcu, data_subset$ln_tcn,
     pch = 16, cex = 1.3, col = "blue",
     main = "Relaci3n TCN y Pcu",
     xlab = "Ln Pcu", ylab = "Ln TCN")
abline(lm(ln_tcn ~ ln_pcu, data = data_subset))
```



¿Cómo analizar una regresión?

- Significancia individual

Por ejemplo para la constante, se evalúa la siguiente hipótesis:

Hipótesis Nula o H_0

$$\beta_1 = 0 \quad (5)$$

Hipótesis Alternativa o H_1

$$\beta_1 \neq 0 \quad (6)$$

Se busca el poder rechazar la hipótesis nula, ¿pero por qué?

Este proceso se puede realizar de dos maneras (hay más):

- Estadístico calculado

Por ejemplo para el caso de la constante, este valor corresponde a 2,081 segÃºn la siguiente fórmula:

$$t_{calculado} = \frac{Coeficiente}{error estándar del coeficiente} \quad (7)$$

lo que debe contrastarse con valores de tabla, segÃºn el siguiente detalle:

$$t_{tabla} = t - student_{10\%, n-1} \quad (8)$$

Este valor de probabilidad se evalúa generalmente al 10%, al 5% y al 1%, y se le denomina valor significativo.

- P-Valor

Corresponde a la probabilidad acumulada por el valor t calculado, considerando el espacio desde el estadístico hacia el final o inicio de la distribución.

Se contrasta contra el valor de significancia. En caso de P-valor sea menor que el nivel de significancia, ya sea (1%, 5% o 10%), se rechaza la hipótesis nula.

- Significancia global

Se aplica lo mismo, pero considerando el siguiente test:

Hipótesis Nula o H_0

$$\beta_2 = \beta_3 \dots \beta_n = 0 \quad (9)$$

Hipótesis Alternativa o H_1

$$\beta_2 = \beta_3 \dots \beta_n \neq 0 \quad (10)$$

No se considera la constante con una distribución F.

- Bondad del Ajuste

Se relaciona con el valor del R cuadrado y R cuadrado ajustado. Nos habla del ajuste lineal del modelo. El segundo considera el ajuste por el número de variables independientes.

Veamos esto en relación al último modelo calculado:

```
modelo_03 <- lm(ln_tcn ~ ln_pcu, data = data_subset)
summary(modelo_03)
```

```

Call:
lm(formula = ln_tcn ~ ln_pcu, data = data_subset)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.11939 -0.05259 -0.01125  0.04046  0.20579

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  8.99887     0.39263  22.919  < 2e-16 ***
ln_pcu       -0.44835     0.07021  -6.386 1.18e-08 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.08006 on 77 degrees of freedom
(1 observation deleted due to missingness)
Multiple R-squared:  0.3462,    Adjusted R-squared:  0.3377
F-statistic: 40.78 on 1 and 77 DF,  p-value: 1.181e-08

```

¿Cómo aplicamos esto?

Teniendo las estimaciones del tipo de cambio, deberíamos poder generar las estimaciones de las cantidades a vender. Conociendo el precio, podríamos multiplicar todos los factores y obtenemos nuestro valor inicial.

Por ejemplo:

$$Ventas_{year1} = TCN_{year1} * Cantidad_{year1} = 720 * 1.000 = 720.000 \quad (11)$$

- ¿Ve algún problema en esto?

Desde este punto, solo queda poder aplicar un crecimiento a estas ventas para los otros años a estimar.

Esto podemos explicarlo partiendo desde una pregunta:

- Tiene dos modelos de estimación de sus ventas: el primero, en base a un modelo económico y el segundo en base a una pregunta realizada a sus propios vendedores, sobre cuánto esperan vender ellos. ¿En cuál estimación o proyección confía más?
- Por lo demás, existe un problema práctico sobre dichos modelos, si lo vemos en su especificación estimamos el siguiente modelo:

$$TCN = \alpha + \beta * Pcu \quad (12)$$

¿Cuál es la temporalidad de la estimación? ¿Qué implica esto?

Modelo CAPM

Debemos ahora aplicar los contenidos vistos relacionados con regresión simple. Un caso conocido en finanzas corresponde al modelo CAPM, que relaciona los retornos de un activo o portafolio con los retornos del mercado.

En base a esto, sabemos que la regresión simple posee la siguiente especificación teórica:

$$y = \alpha + \beta * x$$

donde y corresponde a la variable dependiente, x corresponde a la variable independiente, α corresponde al intercepto y β corresponde a la pendiente.

Dicho ejercicio corresponde al intento de estimar de manera empírica los valores para una ecuación lineal; anteriormente los ejercicios que utilizan ecuaciones de este tipo asumen los valores dados y no ahondaban en el análisis estadístico que hay detrás de su estimación.

En base a esto CAPM en términos estimados corresponde a lo siguiente:

$$r_{activo} = \hat{\alpha} + \hat{\beta} * r_{mercado}$$

Librerías a utilizar

Se especifican a continuación las librerías que serán utilizados en dicha sesión

```
library(tidyquant)
library(tidyverse)
library(quantmod)
library(timetk)
library(broom)
library(highcharter)
library(ggpmisc)
library(knitr)
library(kableExtra)
```

Acciones a utilizar

Para este ejemplo, utilizaremos acciones del mercado de EE.UU.

```
# Tickers a descargar

symbols <- c("SPY", "EFA", "IJS", "EEM", "AGG")

prices <-
  getSymbols(symbols,
    src = 'yahoo',
    from = "2012-12-31",
    to = "2021-12-31",
    auto.assign = TRUE,
    warnings = FALSE) %>%
  map(~Ad(get(.))) %>%
  reduce(merge) %>%
  `colnames<-`(symbols)
```

Precios mensuales

Por lo general, el modelo CAPM se calcula utilizando ya sea precios semanales o mensuales. En este caso utilizaremos precios mensuales.

```
# Conversi3n a precios mensuales

prices_monthly <- to.monthly(prices,
  indexAt = "lastof",
  OHLC = FALSE)

head(prices_monthly, 3)
```

	SPY	EFA	IJS	EEM	AGG
2012-12-31	112.8141	37.99404	32.78265	33.05045	76.59810
2013-01-31	118.5891	39.41063	34.53704	32.95357	76.12236
2013-02-28	120.1022	38.90279	35.10022	32.20089	76.57207

Conversi3n a retornos

Por lo general los retornos se calculan como la variaci3n porcentual entre dos fechas, en este caso mensuales. Una alternativa es calcularlo utilizando variaciones en logaritmo lo que es muy utilizado por profesionales de economíaa y finanzas.

Esto se puede cambiar variando el `method` entre "discrete", "log", "difference".

```
# Cálculo del retorno usando logaritmos

asset_returns_xts <-
  Return.calculate(prices_monthly,
                   method = "log") %>%
  na.omit()

head(asset_returns_xts, 3)
```

	SPY	EFA	IJS	EEM	AGG
2013-01-31	0.04992313	0.03660632	0.05213299	-0.002935522	-0.006230207
2013-02-28	0.01267866	-0.01296959	0.01617500	-0.023105446	0.005890404
2013-03-31	0.03726816	0.01296959	0.04025865	-0.010234908	0.000984823

Modificación y estructuración del data frame

```
# Generación de data frame desde archivo xts

asset_returns_dplyr_byhand <-
  prices %>%
  to.monthly(indexAt = "lastof", OHLC = FALSE) %>%
  # convert the index to a date
  data.frame(date = index()) %>%
  # now remove the index because it got converted to row names
  remove_rownames() %>%
  gather(asset, prices, -date) %>%
  group_by(asset) %>%
  mutate(returns = (log(prices) - log(lag(prices)))) %>%
  select(-prices) %>%
  spread(asset, returns) %>%
  select(date, all_of(symbols)) %>%
  na.omit()
```

Datos en formato long

```
# Orientaci3n del data frame en formato long
```

```
asset_returns_long <-  
  asset_returns_dplyr_byhand %>%  
  gather(asset, returns, -date) %>%  
  group_by(asset)  
  
head(asset_returns_long, 3)
```

```
# A tibble: 3 x 3  
# Groups:   asset [1]  
  date      asset returns  
  <date>    <chr>   <dbl>  
1 2013-01-31 SPY     0.0499  
2 2013-02-28 SPY     0.0127  
3 2013-03-31 SPY     0.0373
```

Pesos de los activos dentro del portafolio

En este caso, calcular3mos el modelo CAPM para un portafolio de activos. Para esto, debemos calcular el retorno ponderado del portafolio en base a las distintas ponderaciones de cada activos en el portafolio. Especificamos las ponderaciones:

```
# Pesos para c3lculo de portafolio  
  
w <- c(0.25,  
       0.25,  
       0.20,  
       0.20,  
       0.10)
```

C3lculo del retorno del portafolio

```
# C3lculo del retorno ponderado del portafolio  
  
portfolio_returns_tq_rebalanced_monthly <-  
  asset_returns_long %>%  
  tq_portfolio(assets_col = asset,
```

```

returns_col = returns,
weights = w,
col_rename = "returns",
rebalance_on = "months")

```


Histograma de los retornos

```

# Histograma de los retornos del portafolio

portfolio_returns_tq_rebalanced_monthly %>%
  ggplot(aes(x = returns)) +
  geom_histogram(alpha = 0.45, binwidth = .005) +
  ggtitle("Monthly Returns Since 2013")

```




Histograma por activo

```

# Histograma de los retornos por activos

asset_returns_long %>%
  ggplot(aes(x = returns, fill = asset)) +
  geom_histogram(alpha = 0.45, binwidth = .01) +
  facet_wrap(~asset) +
  ggtitle("Monthly Returns Since 2013") +
  theme_update(plot.title = element_text(hjust = 0.5))

```



Histograma por activo (variación)

```
# Histograma de los retornos por activos
```

```
asset_returns_long %>%
  ggplot(aes(x = returns)) +
  geom_density(aes(color = asset), alpha = 1) +
  geom_histogram(aes(fill = asset), alpha = 0.45, binwidth = .01) +
  guides(fill = FALSE) +
  facet_wrap(~asset) +
  ggtitle("Monthly Returns Since 2013") +
  xlab("monthly returns") +
  ylab("distribution") +
  theme_update(plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  guides(scale = "none")
```




Gráfico de densidad

```
# Densidad

portfolio_density_plot <-
  asset_returns_long %>%
  ggplot(aes(x = returns)) +
  stat_density(geom = "line",
               alpha = 1,
               colour = "cornflowerblue")

portfolio_density_plot
```





Grafico de densidad con Área sombreada

```
shaded_area_data <-
  ggplot_build(portfolio_density_plot)$data[[1]] %>%
  filter(x < mean(asset_returns_long$returns))

portfolio_density_plot_shaded <-
  portfolio_density_plot +
  geom_area(data = shaded_area_data,
            aes(x = x, y = y),
            fill="pink",
            alpha = 0.5)

portfolio_density_plot_shaded
```



Retorno de Mercado

El retorno del mercado será aproximado desde el retorno del SPY

```
## CAPM

market_returns_xts <-
  getSymbols("SPY",
    src = 'yahoo',
    from = "2012-12-31",
    to = "2021-12-31",
    auto.assign = TRUE,
    warnings = FALSE) %>%
  map(~Ad(get(.))) %>%
  reduce(merge) %>%
  `colnames<-`("SPY") %>%
  to.monthly(indexAt = "lastof",
    OHLC = FALSE) %>%
  Return.calculate(.,
    method = "log") %>%
  na.omit

market_returns_tidy <-
  market_returns_xts %>%
  tk_tbl(preserve_index = TRUE,
    rename_index = "date") %>%
  na.omit() %>%
  select(date, returns = SPY)
```

Retorno de Mercado

```
portfolio_returns_xts_rebalanced_monthly <-  
  Return.portfolio(asset_returns_xts,  
                    weights = w,  
                    rebalance_on = "months") %>%  
  `colnames<-`("returns")  
  
head(portfolio_returns_xts_rebalanced_monthly, 3)
```

```
              returns  
2013-01-31  0.0308488323  
2013-02-28 -0.0008697807  
2013-03-31  0.0186626666
```

Calculo de los β

Desarrollamos el modelo especificado al principio pero considerando cada activo que compone al portafolio

```
beta_assets <-  
  asset_returns_long %>%  
  nest(-asset) %>%  
  mutate(model =  
    map(data, ~  
      lm(returns ~ market_returns_tidy$returns,  
          data = .))) %>%  
  mutate(model = map(model, tidy)) %>%  
  unnest(model) %>%  
  mutate_if(is.numeric, list(~ round(., 4)))  
  
beta_assets_show <- beta_assets %>%  
  select(-data)
```

```
beta_assets_show
```

```
# A tibble: 10 x 6  
# Groups:   asset [5]  
  asset term estimate std.error statistic p.value
```

	<chr>	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	SPY	(Intercept)	0	0	-0.631	0.530
2	SPY	market_returns_tidy\$returns	1	0	1258384.	0
3	EFA	(Intercept)	-0.0057	0.0021	-2.77	0.0066
4	EFA	market_returns_tidy\$returns	0.879	0.0513	17.1	0
5	IJS	(Intercept)	-0.006	0.0033	-1.81	0.0735
6	IJS	market_returns_tidy\$returns	1.25	0.0816	15.4	0
7	EEM	(Intercept)	-0.0081	0.0035	-2.33	0.0218
8	EEM	market_returns_tidy\$returns	0.844	0.0857	9.85	0
9	AGG	(Intercept)	0.0022	0.0009	2.40	0.0183
10	AGG	market_returns_tidy\$returns	-0.0009	0.0232	-0.0409	0.968

Tabla con los coeficientes

```
knitr::kable(
  beta_assets_show,
  format = "latex",           # or omit this if rendering to HTML
  booktabs = TRUE,
  digits = 2
)
```

asset	term	estimate	std.error	statistic	p.value
SPY	(Intercept)	0.00	0.00	-0.63	0.53
SPY	market_returns_tidy\$returns	1.00	0.00	1258383.85	0.00
EFA	(Intercept)	-0.01	0.00	-2.77	0.01
EFA	market_returns_tidy\$returns	0.88	0.05	17.14	0.00
IJS	(Intercept)	-0.01	0.00	-1.81	0.07
IJS	market_returns_tidy\$returns	1.25	0.08	15.37	0.00
EEM	(Intercept)	-0.01	0.00	-2.33	0.02
EEM	market_returns_tidy\$returns	0.84	0.09	9.85	0.00
AGG	(Intercept)	0.00	0.00	2.40	0.02
AGG	market_returns_tidy\$returns	0.00	0.02	-0.04	0.97

Análisis

Debemos realizar el análisis en base a los valores obtenidos para los coeficientes. Cabe mencionar, que tenemos un mayor interés en encontrar significancia en el parámetro relacionado con la pendiente y no en el relacionado con el intercepto.

Por otra parte, $\hat{\beta}_1 \neq 0$ significa que el parámetro sea mayor o menor que 1?

Análisis gráfico

Podemos generar una regresión considerando que corresponde a la línea que atraviesa entre los puntos de ambas variables. Para esto generamos un gráfico de puntos entre X e Y, considerando la relación entre los retornos del portafolio y los retornos del mercado.

```
portfolio_returns_tq_rebalanced_monthly %>%
  mutate(market_returns =
    market_returns_tidy$returns) %>%
  ggplot(aes(x = market_returns,
             y = returns)) +
  geom_point(color = "cornflowerblue") +
  ylab("portfolio returns") +
  xlab("market returns")
```



Línea de regresión

Utilizando el gráfico anterior, generamos la línea de regresión:

```
portfolio_returns_tq_rebalanced_monthly %>%
  mutate(market_returns =
    market_returns_tidy$returns) %>%
  ggplot(aes(x = market_returns,
             y = returns)) +
  geom_point(color = "cornflowerblue") +
  geom_smooth(method = "lm",
             se = FALSE,
             color = "green") +
  ylab("portfolio returns") +
  xlab("market returns")
```



Gráfico con los parametros calculados

Podemos también agregar al gráfico la expresión de la regresión calculada:

```
data <- portfolio_returns_tq_rebalanced_monthly %>%
  mutate(market_returns =
    market_returns_tidy$returns)

my.formula <- y ~ x

p <- ggplot(data = data, aes(x = market_returns,
                             y = returns)) +
  geom_smooth(method = "lm", se=FALSE, color="green", formula = my.formula) +
  stat_poly_eq(formula = my.formula,
               aes(label = paste(..eq.label.., ..rr.label.., sep = "~~~")),
               parse = TRUE) +
  geom_point(color = "cornflowerblue")
p
```



Tarea

1. Calcule y analice la regresión entre los retorno del portafolio y los retornos del mercado. Genere conclusiones sobre la significancia y valores de los parámetros.
2. ¿Puede ser la pendiente de la regresión negativa?