EMat Escuela de Matemática

Universidad de Costa Rica

Departamento de Ciencias Actuariales

MA0501 Análisis Numérico

Proyecto de investigación:

Estimación y regularización de matrices de dependencia mediante Teoría de Matrices Aleatorias (RMT) entre líneas de seguro del mercado costarricense con datos de SUGESE.

Avance 1

Integrantes:

Sebastián Miranda Ramírez C4H274

Benjamín Gutiérrez Padua C4F813

Kevin David Calderón Martínez C4D511

Gabriel de Jesús Chaves Esquivel C4E273

Miguel Tovar B89795

2026

1. Motivación y planteamiento del proyecto

1.1. ¿Cómo se relacionan las líneas de seguro?

La tesis de Chen (2025) es la referencia principal que inspiró este proyecto. Su aplicación de la teoría de matrices aleatorias a las razones de siniestralidad y a las redes de riesgo en seguros nos llevó a explorar esas relaciones en el mercado costarricense con datos de SUGESE.

Estudiar cada serie de siniestralidad por separado permite conocer su nivel habitual, cuánto varía y en qué períodos aumentan los siniestros respecto de las primas. En este proyecto nos interesa también cómo se mueven unas series respecto de otras. Dos carteras con promedios distintos pueden subir al mismo tiempo, mientras que otras con niveles parecidos pueden moverse en sentidos opuestos.

Trabajamos con datos públicos de primas y siniestros de SUGESE. Cada combinación de aseguradora y ramo es un *nodo*, identificado por $i = (a, r)$. Así podemos comparar ramos de una misma empresa y aseguradoras que operan en un mismo ramo, sin resumir toda la actividad de cada compañía en una sola serie.

La pregunta es si hay grupos de nodos que tienden a moverse juntos y cuánto de esa relación puede deberse a tener pocas observaciones. El estudio de estas asociaciones sirve para analizar la diversificación, la concentración de exposiciones y las necesidades de reaseguro, y para describir qué partes del mercado se mueven de forma parecida.

1.2. El indicador y las correlaciones

Para cada nodo i y período t, calculamos la razón entre siniestros brutos S_{it} y primas brutas P_{it}:

$$L_{it} = \frac{S_{it}}{P_{it}}, \qquad P_{it} \neq 0.$$

Los montos originales son acumulados dentro del año, por lo que primero los convertimos en flujos trimestrales. Con ellos calculamos los siniestros por unidad de prima de cada nodo.

Organizamos los datos en una matriz $L \in \mathbb{R}^{N \times T}$, con un nodo por fila y un período por columna. Después centramos cada fila y la dividimos por su desviación estándar muestral. Esto permite comparar fluctuaciones entre series con distintos niveles y dispersiones.

La correlación de Pearson mide la asociación lineal entre dos series. En términos poblacionales,

$$\rho_{ij} = \frac{\operatorname{Cov}(L_i, L_j)}{\sqrt{\operatorname{Var}(L_i)\operatorname{Var}(L_j)}}.$$

Una correlación positiva indica que ambas tienden a desviarse de su media en el mismo sentido; una negativa, en sentidos opuestos. La matriz reúne esas relaciones para todos los pares.

1.3. De la matriz a los grafos y los grupos

Para leer la matriz como una red, usamos los pares aseguradora–ramo como nodos y sus correlaciones como enlaces. En este avance usamos una red *signed* por umbral para conservar las correlaciones positivas y negativas más fuertes. También construimos dos versiones del PMFG, que agregan conexiones mientras la red siga siendo planar.

Al variar el umbral podemos ver cómo se reduce la red y cuáles conexiones permanecen. Los PMFG ofrecen otra forma de resumir la matriz, con un número fijo de enlaces para el mismo conjunto de nodos.

Los grafos muestran las conexiones entre los nodos. Para buscar grupos comparamos las relaciones internas con las externas. MacMahon y Garlaschelli (2015) distinguen este problema del filtrado de enlaces y proponen una modularidad adaptada a matrices de correlación.

1.4. ¿Dónde entra la teoría de matrices aleatorias?

Con una muestra finita aparecen correlaciones distintas de cero incluso entre series independientes. El problema se hace más evidente cuando hay muchas series y pocos períodos. Con la teoría de matrices aleatorias (RMT) comparamos los valores propios de la matriz empírica con una referencia de ruido muestral.

Los valores propios indican cuánta variación corresponde a cada dirección de movimiento conjunto, descrita por su vector propio. El filtro conserva como señal los modos que superan el límite superior de esa referencia.

Las variantes de modularidad de MacMahon y Garlaschelli usan distintos modelos de referencia. Q_2 descuenta el ruido y Q_3 también retira el modo principal. Las cargas del vector propio muestran qué series participan en ese movimiento.

La parte numérica del proyecto consiste en construir la matriz, calcular sus valores y vectores propios, reconstruir las componentes filtradas y estudiar las particiones que se obtienen. En este avance presentamos los primeros resultados sobre el panel actual.

2. Hallazgos del proyecto

2.1. Análisis exploratorio

El panel contiene 50 series y 32 trimestres, de 2015 a 2022, para un total de 1600 observaciones. Los gráficos de cambios trimestrales y anuales muestran oscilaciones recurrentes en Automóvil y en el seguro obligatorio de riesgos del trabajo (SRT), además de movimientos abruptos en Caución y en el seguro obligatorio de automóviles (SOA).

La media de las razones individuales es 0,6408 y la mediana es 0,3269. Para comparar ramos, sumamos los siniestros y las primas entre aseguradoras en cada trimestre, calculamos su cociente y luego resumimos los valores a lo largo del tiempo.

SOA destaca con una media de 6,1891 y una mediana de 4,2280. La media supera bastante a la mediana, por lo que las observaciones altas tienen un peso importante en el promedio. También aparecen valores negativos en el panel.




Figura 1: Media y mediana temporal de la razón agregada por ramo, 2015–2022. Las razones se expresan en unidades.

2.2. Matriz de correlación empírica

Construimos $L \in \mathbb{R}^{50\times 32}$ y estandarizamos cada fila con su media $\bar{L}_i$ y su desviación estándar muestral s_i. Con $T = 32$,

$$X_{it} = \frac{L_{it} - \bar{L}_i}{s_i}, \qquad C = \frac{XX^{\mathsf{T}}}{T-1}, \qquad C_{ij} = \frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T} X_{it}X_{jt}.$$

La matriz resultante es simétrica y tiene unos en la diagonal. En la figura ordenamos los nodos por similitud para facilitar la lectura.




Figura 2: Correlaciones empíricas entre los 50 nodos. Rojo indica asociación positiva; azul, negativa; blanco, valores cercanos a cero.

Entre los 1225 pares distintos, la correlación media es 0,0114 y la mediana es 0,0009. Aun así, hay relaciones fuertes de ambos signos. Por ejemplo, INS–Accidentes y MAPFRE–Incendio y líneas aliadas tienen una correlación de 0,8237, mientras que MAPFRE–Otros daños a los bienes y MAPFRE–Vida tienen una de $-0{,}8665$. El promedio cercano a cero resume relaciones positivas y negativas que se compensan entre sí.

2.3. Red signed por umbral

En esta red conservamos un enlace entre nodos distintos cuando $|C_{ij}| \geq h$. El peso sigue siendo C_{ij}, con su signo original. Así mantenemos en una misma figura las series que se mueven juntas y las que se mueven en sentidos opuestos. Usamos tres umbrales para comparar cuántas conexiones quedan:

Umbral h	Enlaces	Positivos	Negativos
0,30	161	94	67
0,40	68	42	26
0,50	32	18	14

Al pasar de 0,30 a 0,50, la red pierde 129 enlaces. En los tres casos mantenemos los 50 nodos, incluidos los que quedan aislados, y usamos las mismas posiciones para poder comparar las figuras.




Figura 3: Red signed con $h = 0{,}40$. El color de cada nodo identifica la aseguradora. Los enlaces azules continuos son positivos y los naranjas discontinuos son negativos; el grosor indica la magnitud de la correlación.

La figura intermedia conserva 68 conexiones, de las cuales 26 son negativas. Conservar ambos signos permite ver esas relaciones en una misma red. Las tres redes se generan con `R/visualizar_redes.R` a partir de la matriz empírica.

2.4. PMFG por correlación y por magnitud

El *Planar Maximally Filtered Graph* (PMFG) de Tumminello et al. (2005) prueba los pares en orden y acepta un enlace si la red sigue siendo planar. Comparamos el orden clásico, por C_{ij} descendente, con una adaptación por $|C_{ij}|$ descendente. Ambos conservan el signo original y alcanzan $3N - 6 = 144$ enlaces.

Criterio de orden	Positivos	Negativos	Total
Correlación C_{ij}	139	5	144
Magnitud $\|C_{ij}\|$	87	57	144




Figura 4: PMFG clásico, ordenado por correlación.




Figura 5: PMFG ordenado por magnitud de la correlación.

Los PMFG comparten 75 enlaces. El de magnitud conserva la correlación de $-0{,}8665$ entre MAPFRE–Otros daños a los bienes y MAPFRE–Vida. La forma triangular viene del acomodo planar sin cruces. Ambos PMFG se construyeron a partir de la matriz empírica.

2.5. Marchenko–Pastur y elección de modularidad

Con $N = 50$ y $T = 32$, los límites de Marchenko–Pastur (MP) son

$$q = \frac{N}{T} = 1{,}5625, \qquad \lambda_{\pm} = (1 \pm \sqrt{q})^2, \qquad [\lambda_-, \lambda_+] = [0{,}0625;\ 5{,}0625].$$

El primer valor propio es $\lambda_1 = 6{,}9270$ y el segundo es $\lambda_2 = 4{,}8250$. Solo el primero supera el límite superior y concentra el 13,85 % de la variación total. También hay un valor positivo por debajo del límite inferior (0,0553) y 19 valores prácticamente nulos. Estos últimos se explican por el rango máximo $T - 1 = 31$ de la matriz centrada; para $q > 1$, MP también incluye una masa en cero.




Figura 6: Espectro empírico y límites de Marchenko–Pastur. Solo la primera barra supera $\lambda_+ = 5{,}0625$.

El filtro reúne los modos con $\lambda_a \leq \lambda_+$ en $C^{(r)}$ y conserva $C^{(s)} = C - C^{(r)}$. La modularidad Q_2 de MacMahon y Garlaschelli (2015, ec. 34) usa esa señal:

$$Q_2(g) = \frac{\sum_{i,j} C^{(s)}_{ij}\, \mathbf{1}\{g_i = g_j\}}{\sum_{i,j} C_{ij}}, \qquad C^{(s)} = \lambda_1 v_1 v_1^{\mathsf{T}}.$$

Como solo conservamos un modo, retirarlo también, como hace Q_3, deja una matriz nula salvo redondeo y todas las particiones reciben el mismo valor. Por eso usamos Q_2 para distinguir las particiones. Q_1 se mantiene como referencia, aunque no descuenta el ruido. Con Q_2 obtenemos grupos de 33 y 17 nodos, separados por los signos del primer vector propio.

Seguiremos con el análisis de la composición de los grupos y la comparación de sus conexiones en las redes.

Referencias

Chen, C.-P. (2025). *The Three Studies on Applying Random Matrix Theory to Loss Ratios for General Insurance Companies*. Tesis doctoral, Departamento de Gestión de Riesgos y Seguros, National Chengchi University.

MacMahon, M. y Garlaschelli, D. (2015). *Community Detection for Correlation Matrices*. *Physical Review X*, **5**, 021006. doi:10.1103/PhysRevX.5.021006.

Tumminello, M., Aste, T., Di Matteo, T. y Mantegna, R. N. (2005). *A tool for filtering information in complex systems*. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **102**(30), 10421–10426. doi:10.1073/pnas.0500298102.

Repositorio del proyecto

Los datos, scripts de R y figuras del avance están en:

https://github.com/sebas-miranda/riesgo_mercado_asegurador_MA0501