Trabajo 1

Series de Tiempo — Pregrado en Estadística, UNAL Medellín

Sebastian Valencia Botero ; Daniel Garavito ; Julian Ariza

2026-10-16

Table of contents

1 Punto 2 **3**
- 1.1 A . . . 3
  - 1.1.1 Item A . . . 3
- 1.2 B . . . 4
- 1.3 C . . . 5

2 Punto 3 **6**
- 2.1 Item a . . . 6
  - 2.1.1 Serie 1 . . . 6
  - 2.1.2 Serie 2 . . . 9
  - 2.1.3 Serie 3 . . . 12
- 2.2 Item b . . . 14
  - 2.2.1 Serie 1 . . . 14
  - 2.2.2 Serie 2 . . . 16
  - 2.2.3 Serie 3 . . . 18

3 Punto 4 **24**
- 3.1 item a . . . 24
- 3.2 item b . . . 25
  - 3.2.1 raizes serie 1 . . . 25
  - 3.2.2 raizes serie 2 . . . 26
  - 3.2.3 raizes serie 3 . . . 26
- 3.3 item c . . . 26
  - 3.3.1 serie 1 . . . 26
  - 3.3.2 serie 2 . . . 27
  - 3.3.3 serie 3 . . . 27
- 3.4 item d . . . 29

4 Punto 5 **35**
4.1 series resultantes . . . 35
4.2 A . . . 35
4.3 B . . . 39
4.4 C . . . 40
4.5 bloques serie 1 . . . 40
4.6 bloques serie 2 . . . 41
4.7 bloques serie 3 . . . 42

5 Punto 6 **43**
5.1 serie 1 datos . . . 43
5.1.1 optimizacion de parametros y metodos posibles . . . 43
5.1.2 correlogramas de metodos serie 1 . . . 45
5.1.3 aplicacion de metodos serie 1 . . . 47
5.1.4 validacion de metodos . . . 49
5.1.5 e . . . 50
5.2 serie 2 . . . 52
5.2.1 optimizacion de parametros . . . 52
5.2.2 correlogramas . . . 53
5.2.3 aplicacion de metodos . . . 56
5.2.4 validacion . . . 59
5.2.5 e . . . 59
5.3 serie 3 . . . 60
5.3.1 optimizacion de parametros para los metodos . . . 60
5.3.2 aplicacion de metodos . . . 61
5.3.3 Validacion . . . 63
5.3.4 e . . . 63

1 Punto 2

1.1 A

1.1.1 Item A

1.1.1.1 ficha serie 1

Table 1: Ficha técnica - Serie 1

Característica	Valor
Nombre	consumo mensual de agua potable 2011-2025
Unidad	miles de m^3
Frecuencia	Mensual
Fecha inicial	2011-11-01
Fecha final	2025-12-01
T (observaciones)	170
Mínimo	394.3
Máximo	605.7
Media	468.79

1.1.1.2 ficha serie 2

Table 2: Ficha técnica - Serie 2

Característica	Valor
Nombre	concentracion de PM2.5 2025-02-03 a 2025-09-10
Unidad	µg/m^3
Frecuencia	Diaria
Fecha inicial	2025-02-03
Fecha final	2025-09-10
T (observaciones)	220
Mínimo	24.8
Máximo	44.2
Media	34.72

1.1.1.3 ficha serie 3

Table 3: Ficha técnica - Serie 3

Característica	Valor
Nombre	Caudal medio mensual de un río andino
Unidad	m^3/s
Frecuencia	Mensual
Fecha inicial	2012-01-01
Fecha final	2025-12-01
T (observaciones)	168
Mínimo	96.2
Máximo	218.2
Media	154.35

1.2 B

serie 1

pregunta serie 1 ¿El consumo mensual de agua potable en miles de m^3 de la ciudad Villa Clara superara la capacidad de su acueducto de potavilizar 650 mil m^3 al mes para planificar una ampliacion en un horizonte de 12 meses?

serie 2

pregunta serie 2

En la estación de monitoreo de Villa Clara se mide diariamente la concentración de PM2.5 para gestionar la calidad del aire. Con el objetivo de decidir si la alcaldía debe declarar alerta ambiental y restringir el transporte de carga para el día siguiente, ¿Superará la concentración promedio diaria de PM2.5 los 37 $\mu g/m^3$ el día de mañana?

serie 3

Caudal medio mensual, en m^3/s, del río Sinuoso en la bocatoma del acueducto, medido por la estación limnigráfica de la corporación. La concesión permite captar el volumen completo mientras el caudal se mantenga por encima de 110 m^3/s; por debajo de ese valor la corporación ordena reducir la captación a la mitad, y la empresa debe llenar con anticipación los tanques de reserva, lo que cuesta 150 millones de pesos por mes. Interesa a la corporación, a la empresa de acueducto y a los usuarios de la cuenca aguas abajo. La pregunta de la empresa de acueducto: ¿en cuáles de los próximos doce meses conviene preparar los tanques de reserva?

pregunta serie 3

¿en que mes del proximo año segun un diagnostico del caudal del rio sinuoso medido en m^3/s mensualmente se reducira por debajo de 110 m^3/s en un horizonte de 12 meses para

llenar preparar el presupuesto de llenado de tanques con anticipacion y el tiempo necesario de mantenerlos llenos?

1.3 C

Table 4: Partición de las Series: n_0, H, orígenes y fechas de corte

Serie	Unidad	T	n0	H	Orígenes (h=1)	Orígenes (H)	Fecha inicio	Fecha corte (n0)	Fecha fin
Serie 1									
Serie 1	miles m³	170	136	18	34	17	2011-11-01	2023-02-01	2025-12-01
Serie 2									
Serie 2	µg/m³	220	176	7	44	38	2025-02-03	2025-07-28	2025-09-10
Serie 3									
Serie 3	m³/s	168	134	12	34	23	2012-01-01	2023-02-01	2025-12-01

2 Punto 3

2.1 Item a

2.1.1 Serie 1




Figure 1: Gráfico de la serie 1.

Figura 1: Consumo mensual de agua potable. El consumo de agua sube con los años: empezó cerca de 400 miles de m^3 en 2012 y llegó a cerca de 605 miles de m^3 a finales de 2025. Pero no sube igual todo el tiempo. Hasta 2019 sube despacio, y desde 2020 sube mucho más rápido. No se ve con claridad ningún otro patrón, como subidas y bajadas que se repitan cada año.




Figure 2: Correlograma de la serie 1.

Figura 2: ACF y PACF de la serie 1. En el gráfico de la ACF, la relación entre los rezagos y los anteriores es muy alta (cerca de 1 al inicio) y baja muy despacio al aumentar los rezagos. Esto confirma que la serie tiene una tendencia. En la PACF solo el primer rezago es significativo, con un valor cercano a 1. Los demás quedan dentro de las bandas, cerca de cero, y se comportan como ruido. Esto quiere decir que, una vez que se tiene en cuenta el rezago anterior, los rezagos más lejanos casi no aportan información nueva.




Figure 3: Grafico de rezagos serie 1.

Figura 3: Se escogieron los rezagos 1, 12 y 24. El rezago 1 compara cada mes con el mes anterior. Los rezagos 12 y 24 comparan cada mes con el mismo mes de uno y de dos años atrás, y sirven para ver si el consumo se repite cada año. En los tres gráficos los puntos forman una línea que sube, lo que significa que un mes con consumo alto viene después de meses con consumo alto. En el rezago 1 los puntos quedan muy pegados a la línea, y en los rezagos 12 y 24 se van abriendo un poco. Esto es coherente con la tendencia de la serie.

2.1.2 Serie 2




Figure 4: Grafico de la serie 2.

Figura 4: La concentración sube y baja todos los días, pero siempre alrededor de un mismo nivel, cerca de 35 µg/m³. No se ve que con el paso de los meses vaya subiendo o bajando, así que no hay tendencia. Los valores casi siempre están entre 25 y 45 µg/m³, y esa variación se mantiene. Tampoco se ve un patrón que se repita con claridad, como una semana más contaminada que otra.




Figure 5: Correlograma de la serie 2.

Figura 5: En la ACF, los rezagos 1 y 2 son los únicos claramente altos: el primero es cerca de 0,6 y el segundo cerca de 0,2. Es decir, un día se parece al día anterior y, un poco menos, al de dos días atrás. Después la gráfica pasa a valores negativos pequeños y vuelve a subir un poco, como una onda suave, pero casi todos esos valores quedan dentro de las bandas, así que pueden ser solo azar.En la PACF solo los rezagos 1 y 2 son significativos: el 1 es positivo (cerca de 0,6) y el 2 es negativo (cerca de $-0{,}25$). Los demás quedan dentro de las bandas. Esto quiere decir que, para entender el valor de hoy, bastan los dos días anteriores.




Figure 6: Grafico de rezagos serie 2.

Figura 6: Gráfico de rezagos de la serie 2. Se escogieron los rezagos 1 y 2, porque son los únicos que se destacan en los gráficos anteriores. El rezago 1 compara cada día con el día anterior, y el rezago 2 lo compara con el de dos días atrás. En el rezago 1 los puntos suben en una línea con bastante dispersión: si ayer hubo mucha contaminación, hoy suele haber bastante también, aunque no siempre. En el rezago 2 la línea casi no se inclina y los puntos quedan muy dispersos, así que anteayer dice poco sobre hoy

2.1.3 Serie 3




Figure 7: Grafico de la serie 3.

Figura 7: El caudal sube y baja de forma muy regular, siempre alrededor de un mismo nivel, cerca de 155 m^3/s. No se ve que con los años el río vaya llevando más o menos agua, así que no hay tendencia. Lo que sí se ve con claridad es un patrón que se repite: cada año aparecen dos épocas de caudal alto y dos de caudal bajo. Los valores más bajos rondan los 100 m^3/s y los más altos llegan cerca de 200 m^3/s.




Figure 8: Correlograma de la serie 3.

Figura 8: En la ACF se ve una onda que sube y baja de forma muy regular y no se apaga con los rezagos. Los valores son positivos y altos en los rezagos 6, 12, 18 y 24 (cerca de 0,8), y negativos y de tamaño parecido en los rezagos 3, 9, 15 y 21 (cerca de $-0{,}8$). Esto quiere decir que un mes se parece mucho al de 6 meses atrás y al de 12, y es casi lo contrario del de 3 o 9 meses atrás. Es la huella de un ciclo que se repite, y casi todos esos picos quedan fuera de las bandas. En la PACF los rezagos del 1 al 6, el 8, el 9 y el 12 son significativos, y después del 12 los valores quedan cerca de cero, dentro de las bandas. Esto sugiere que la dependencia se concentra en el último año: para entender un mes, importa lo que pasó en los 12 meses anteriores, y lo anterior a eso casi no agrega nada.




Figure 9: Grafico de rezagos serie 3.

Figura 9: Se escogieron los rezagos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 12, que son los que más se destacan en la PACF. Cada gráfico compara el caudal de un mes con el de algunos meses antes. Lo que se ve es que la inclinación de la línea cambia de signo según el rezago. En los rezagos 6 y 12 los puntos suben en una línea, y en el 12 quedan bastante pegados a ella: un mes con caudal alto viene seis y doce meses después de otro con caudal alto. En los rezagos 3 y 9 pasa lo contrario, los puntos bajan: un mes con caudal alto viene tres y nueve meses después de uno con caudal bajo

2.2 Item b

2.2.1 Serie 1

de la serie 1 vemos que tiene una tendencia fuerte, para ello vamos a retirar la tendencia para validar que no este ocultando alguna estacionalidad o algun patron.

Table 5: Prueba de estacionalidad de la serie 1

Estadístico F	Valor crítico	Valor p	gl1	gl2
0.4169	1.8548	0.9468	11	146

Se eliminó la tendencia mediante una media móvil centrada de orden 12 y se evaluó si existen diferencias en los niveles medios de los 12 meses del año.

Las hipótesis planteadas son:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_{12}$$
$$H_1 : \text{al menos una media mensual es distinta.}$$

El estadístico de prueba se define como

$$F = \frac{SSB/(s-1)}{SSW/(N-s)},$$

$$F \sim F_{11,146}.$$

Con un nivel de significancia del (5,%), se rechaza H_0 si ($F >$ 1,855).

Decisión: como ($F =$ 0,417 $<$ 1,855) y ($p =$ 0,947 $>$ 0,05), no se rechaza (H_0).

Interpretación: una vez eliminada la tendencia, no se encuentra evidencia estadística de que el nivel del consumo dependa del mes. Por tanto, la tendencia no parece estar ocultando una estacionalidad mensual. En consecuencia, la serie 1 se clasifica como una serie con tendencia y sin estacionalidad detectable mediante esta prueba.




Figure 10: Grafico de la serie 1 sin tendencia 158 observaciones de 170

Figura 10: Después de quitar la tendencia, el consumo de agua oscila alrededor de cero, casi siempre entre -10 y $+10$ miles de m^3. No se ve ningún patrón que se repita cada año ni cambios en el nivel o en qué tanto varía. Hay un valor muy bajo cerca de la observación 100 (unos -18 miles de m^3), pero es un caso aislado y no sigue ningún mes en particular.

2.2.2 Serie 2

En la serie 2 no se observa una tendencia ni patrones claros en el gráfico. Sin embargo, en la figura 5, correspondiente a la ACF, se aprecia un comportamiento oscilatorio, con picos que suben y bajan. Aunque los rezagos se encuentran dentro de las bandas de significancia, este patrón podría sugerir la presencia de estacionalidad, como si cada día de la semana tuviera un nivel típico de consumo. Por ello, se busca evaluar si el consumo de un día se parece al del mismo día de la semana anterior.

Table 6: Resultados de la prueba de estacionalidad de la serie 2

Estadístico F	Valor crítico	Valor p	gl1	gl2
0.3398	2.1413	0.9152	6	213

Hipótesis:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_7,$$
$$H_1 : \text{al menos un día tiene una media distinta.}$$

Donde (μ_1) corresponde al lunes y las demás medias representan los días restantes de la semana.

Estadístico de prueba:

$$F = \frac{SSB/(s-1)}{SSW/(N-s)}, \qquad F \sim F_{6,213} \text{ bajo } H_0.$$

Con un nivel de significancia del (5%), la región de rechazo es $(F > 2,141)$.

Decisión: como $(F = 0,340 < 2,141)$ y $(p = 0,915 > 0,05)$, no se rechaza (H_0).

Interpretación: no se encuentra evidencia estadística de que el nivel medio de PM2,5 dependa del día de la semana.

Table 7: Autocorrelación en los rezagos semanales de la serie 2

Rezago	Autocorrelacion	Limite_significancia
7	-0.0587	0.1321
14	-0.1630	0.1321
21	0.0654	0.1321

Table 8: Media de PM2,5 por día de la semana

Día	Media
Lunes	35.07
Martes	34.45
Miércoles	34.12
Jueves	34.58
Viernes	34.73
Sábado	35.06

Día	Media
Domingo	35.07

Table 9: Resumen descriptivo de la serie 2

Medida	Valor
Diferencia entre la media máxima y mínima	0.953
Desviación estándar de la serie	3.542

No hay estacionalidad semanal: la concentración de un día no se parece a la del mismo día de la semana anterior (r $= -0{,}06$; r $= 0{,}07$), y los promedios de los siete días son casi iguales (entre 34,1 y 35,1 µg/m³). Lo que sí se observa es una dependencia de corto plazo: la concentración de un día se parece a la del día anterior (r $= 0{,}61$). Esto no es un patrón de calendario, sino una "memoria" de la serie: si ayer hubo mucha contaminación, hoy tiende a haber bastante también, sin importar qué día de la semana sea.

2.2.3 Serie 3

Table 10: Prueba de estacionalidad de la serie 3

Estadístico F	Valor crítico	Valor p	gl1	gl2
95.2796	1.8505	0	11	156

El valor F (95,28) es mucho mayor que el valor crítico (1,85) y el valor p es prácticamente cero. Se rechaza que todos los meses tengan el mismo caudal, así que hay estacionalidad.

Table 11: Media de la serie 3 por mes

Mes	Media
Enero	171.00
Febrero	189.98
Marzo	179.29
Abril	143.35
Mayo	111.16
Junio	121.86
Julio	170.16
Agosto	182.80

Mes	Media
Septiembre	183.77
Octubre	144.87
Noviembre	117.62
Diciembre	136.32

El caudal promedio cambia mucho según el mes: febrero es el más alto (190,0 m^3/s) y mayo el más bajo (111,2 m^3/s). Las medias forman dos épocas altas y dos bajas.

Table 12: Descomposición de la variabilidad de la serie 3

Componente	Suma de cuadrados
Entre meses (SSB)	124593.90
Dentro de los meses (SSW)	18545.08

El caudal presenta diferencias importantes según el mes del año. La variación entre los promedios mensuales es mucho mayor que la variación dentro de cada mes, lo que indica que existe un patrón estacional marcado. En particular, algunos meses tienden a registrar caudales más altos que otros.

Table 13: Índices estacionales de la serie 3

Mes	Índice estacional
Enero	16.689
Febrero	36.585
Marzo	24.549
Abril	-10.715
Mayo	-42.728
Junio	-31.895
Julio	15.391
Agosto	29.460
Septiembre	27.311
Octubre	-9.327
Noviembre	-36.026
Diciembre	-19.295

Los índices estacionales muestran que el caudal aumenta en algunos meses, especialmente en febrero, marzo y agosto, mientras que disminuye en otros, como mayo, junio y noviembre.

Este comportamiento refuerza la presencia de un patrón estacional en la serie, pues el caudal tiende a variar según el mes del año.

Gráfico estacional, serie 3. Cada línea es un año del caudal del río, de enero (mes 1) a diciembre (mes 12). Las 14 líneas tienen casi la misma forma: el caudal sube a principios de año (pico en febrero), baja hasta mayo, vuelve a subir a mitad de año (pico entre agosto y septiembre) y baja hasta noviembre. Que todos los años repitan este patrón muestra que la estacionalidad es real y que no depende del año.

Table 14: Diferencias entre semestres

Mes	Diferencia entre semestres
Enero	1.299
Febrero	7.126
Marzo	-2.762
Abril	-1.388
Mayo	-6.702
Junio	-12.600

Un mes y el que viene seis meses después se parecen mucho: las diferencias van de 1,3 a

12,6 m^3/s, y la mayor es junio frente a diciembre. El patrón dominante es semestral, pero la diferencia no es cero.

Table 15: Indicadores de comparación del modelo aditivo

Indicador	Resultado
Amplitud de los índices estacionales	79.313
Desviación estándar del residuo (periodicidad 12)	9.539
Desviación estándar del residuo (periodicidad 6)	9.419
Número de observaciones comunes	156.000

La diferencia máxima entre semestres (12,6) es pequeña frente a la amplitud de los índices (79,3). Con período 12 o con 6 el residuo queda casi igual (9,54 y 9,42), así que declarar 12 no pierde nada y conserva la diferencia entre semestres.

Table 16: Comparación de los tipos de descomposición

Indicador	Resultado
Desviación relativa del modelo aditivo	0.0621
Desviación relativa del modelo multiplicativo	0.0628
Correlación entre nivel y amplitud estacional	0.1101
Correlación entre media y rango anual	0.1523

Las dos versiones dejan un error casi igual (6,21 % la aditiva y 6,28 % la multiplicativa). La correlación entre nivel y amplitud es baja (0,11), así que la oscilación no crece con el nivel. Se elige la aditiva por ser más simple.

Table 17: Rango anual de la serie 3

Año	Rango anual
1	82.5
2	75.4
3	98.4
4	99.3
5	81.4
6	88.6
7	75.8
8	96.5
9	90.3
10	86.5

Año	Rango anual
11	89.9
12	82.4
13	81.7
14	104.9

El rango de cada año se mueve entre 75,4 y 104,9 m^3/s sin una dirección clara, y su correlación con la media anual es 0,15. La amplitud no depende del nivel, lo que respalda la aditiva.

Se eligió la descomposición aditiva porque el nivel de la serie se mantiene cerca de 154 m^3/s y las oscilaciones no parecen aumentar cuando el caudal sube. Esto se refleja en la baja correlación entre la media y el rango anual (0,15). Además, los errores relativos de ambos modelos son muy similares (6,21 % para el aditivo y 6,28 % para el multiplicativo), por lo que se prefiere el modelo aditivo por ser más sencillo.




Figure 11: Descomposición clásica aditiva de la serie 3

La tendencia del caudal se mantiene estable a lo largo de los años. Se observa un patrón estacional marcado, con caudales altos en febrero y entre julio y septiembre, y bajos en mayo y entre octubre y diciembre. Los residuos oscilan alrededor de cero, con una desviación estándar de 9,5 m^3/s, aunque persiste cierta dependencia de corto plazo que se analiza en la sección 5.

Se declara s = 12. El patrón del año se repite casi igual cada 6 meses: un mes y el que viene seis meses después difieren entre 1,3 y 12,6 m^3/s, poco frente a los 79,3 m^3/s de amplitud. Por eso el componente dominante es semestral. Pero las diferencias no son cero (la mayor es junio frente a diciembre), y un período de 12 incluye el caso de 6 sin perder esa diferencia. Además, el residuo queda casi igual con 12 y con 6 (9,54 y 9,42 m^3/s), así que usar 12 no empeora el ajuste.

3 Punto 4

3.1 item a

```
source("../R/02-operadores.R")

# bloque de verificacion de funciones

D <- 1
s <- 4
set.seed(2024)
y <- rnorm(100, 2, 3)

# polinomio
# c(B) = 1 - B^4
# caso 1
mia_est   <- diferenciar(y, d = 0, D = D, s = s)
base_est  <- diff(y, lag = s, differences = D)

cat("Diferencia estacional (D =", D, ", s =", s, ") coincide:",
    all.equal(mia_est, base_est), "\n")
```

```
Diferencia estacional (D = 1 , s = 4 ) coincide: TRUE
```

```
# caso 2
d <- 1; D <- 1; s <- 4
mia_comb  <- diferenciar(y, d = d, D = D, s = s)
base_comb <- diff(diff(y, lag = s, differences = D), differences = d)

cat("Combinación (d =", d, ", D =", D, ", s =", s, ") coincide:",
    all.equal(mia_comb, base_comb), "\n")
```

```
Combinación (d = 1 , D = 1 , s = 4 ) coincide: TRUE
```

```
#polinomio
#c(B) = 1 - 0.5B + 0.25B^2
coefi <- c(-0.5, 0.25)
print(polinomio_rezago(coefi))
```

```
# A tibble: 2 x 2
  raiz        modulo
  <cpl>        <dbl>
1 1+1.732051i   2.00
2 1-1.732051i   2.00
```

3.2 item b

3.2.1 raizes serie 1

serie 1

La serie no es estacional por ende se propone estabilizar la varianza con una transformacion y hacer una diferencia para eliminar la tendencia ($\nabla \log(yt)$)

$z_t = \log(yt)$ estabilizara la varianza

$w_t = (1 - B)z_t$ elimina la tendencia

$c(B) = 1 - B$ seria el polinomio




Figure 12: Raizes en el plano - serie 1

3.2.2 raizes serie 2

serie 2

La serie no es estacional y se dice que es tipo 1 estacionaria en media, por lo que al diferenciar por ∇ no se encontrara mejor pronostico que con los datos originales.

$c(B) = (1-B)^0 y_t = y_t$ no hay polinomio en este caso.

3.2.3 raizes serie 3

serie 3

Esta serie es estacional y se registra mensual con periodo 12 se propone una tranformacion ∇_{12}

$w_t = (1-B^{12})y_t$ elimina la estacionalidad

$c(B) = 1 - B^{12}$ polinomio

3.3 item c

3.3.1 serie 1

Table 18: Serie 1: Varianza muestral y r1 por transformación

Transformación	Media	Varianza	r1
Original (y)	468.7876	3877.5116	0.9780
log(y)	6.1419	0.0162	0.9783
Dif. regular (d=1)	1.1964	34.0582	-0.2969
Dif.regular y log(y)	0.0001	0.0004	-0.6154

La tranformacion elegida es la de una diferencia ∇y_t debido a que al tranformar los datos con $\log(y_t)$ se estabiliza la varianza pero al aplicarle la diferencia se sobre diferencia por el resultado de $r_1 < -0.5$ por ende no captura estacionalidad conclusion que soporta mas la no estacionalidad del punto 2. Caso contrario con una sola diferencia ya que el $r_1 = -0.2969 > -0.5$ que no sobre diferencia y disminuye drasticamente la varianza. si se sigue diferenciando, r1 seria mas pequeño pero esta dejaria ruido blanco al no haber estacionalidad

Table 19: Serie 2: Varianza muestral y r1 por transformación

Transformación	Media	Varianza	r1
Original (y)	34.7232	12.5441	0.6090
Dif. regular (d=1)	0.0224	9.7215	0.0090
Dif. regular (d=2)	0.0101	19.3423	-0.3832

3.3.2 serie 2

Se escoge la serie original sin diferenciar debido a que se concluyo la no estacionalidad anteriormente, ademas al diferenciar una vez la varianza no cambia drasticamente comparada con la original

3.3.3 serie 3

Table 20: Serie 3: Varianza muestral y r1 por transformación

Transformación	Media	Varianza	r1
Original (y)	154.3476	857.1198	0.4116
Dif. regular (d=1)	-0.0946	1012.8951	0.1937
Dif. estacional (D=1, s=12)	**1.0551**	**155.5990**	**-0.0344**
Dif. regular+estacional (d=1,D=1,s=12)	0.0458	321.2689	-0.4876

Se escoge la transformacion ∇_{12} debido a que es la que mas reduce la varianza y con el r1 en la mejor zona de aceptacion. Pero al comprobar con la identidad $var(\nabla Y_t =) \ 2\gamma(0) - 2\gamma(1)$ no coinciden ya que esto da como resultado respectivamente $155.599 \neq 270.02$ esto se debe a heterocedasticidad estacional ya que la varianza cambia sustancialmente entre algunos meses pero no indica que exista tendencia debido a que si diferenciamos una vez mas la varianza aumenta.

3.4 item d




Figure 13: Anexo a mano punto 4.d




Figure 14: Anexo a mano punto 4.d




Figure 15: Anexo a mano punto 4.d




Figure 16: Anexo a mano punto 4.d




Figure 17: Anexo a mano punto 4.d





Figure 18: Anexo a mano punto 4.d


4 Punto 5

4.1 series resultantes


4.2 A



n = 169, m = 24. Azul: ±1,96/vn (ruido blanco). Rojo, solo en la ACF: banda de Bartlett.



n = 220, m = 24. Azul: ±1,96/vn (ruido blanco). Rojo, solo en la ACF: banda de Bartlett.



n = 156, m = 24. Azul: ±1,96/vn (ruido blanco). Rojo, solo en la ACF: banda de Bartlett.

Table 21: Comparación de las funciones ACF y PACF

Serie	n	m	Error máximo ACF	Error máximo PACF
Serie 1	169	24	4.441e-16	4.163e-17
Serie 2	220	24	2.220e-16	6.418e-16
Serie 3	156	24	5.551e-17	8.674e-17

```
$acf_fuera_blanco
[1] 1

$acf_fuera_bartlett
[1] 1

$pacf_fuera_blanco
[1] 1 9

$r1_a_r5
[1] -0.297 -0.010 -0.069 -0.063  0.124

$r12
```

```
[1] -0.035

$r24
[1] -0.016


$acf_fuera_blanco
[1]  1  2  5 13 14 15

$acf_fuera_bartlett
[1] 1 2

$pacf_fuera_blanco
[1] 1 2

$r1_a_r5
[1]  0.609  0.212 -0.005 -0.116 -0.140

$r12
[1] -0.13

$r24
[1] 0.027


$acf_fuera_blanco
[1]  3 12 24

$acf_fuera_bartlett
[1]  3 12

$pacf_fuera_blanco
[1]  3 11 12 21 24

$r1_a_r5
[1] -0.034 -0.045  0.255 -0.038  0.052

$r12
[1] -0.258

$r24
[1] -0.189
```

4.3 B

```
# A tibble: 3 x 6
  serie  estadistico    df valor_critico_5pct  p_value rechazo_H0
  <chr>        <dbl> <dbl>              <dbl>    <dbl> <lgl>
1 serie1        39.6    24               36.4 0.0238   TRUE
2 serie2       136.     24               36.4 0        TRUE
3 serie3        51.6    24               36.4 0.000878 TRUE
```

```
Serie 1 | diferencia en Q = 8.47e-06
Serie 2 | diferencia en Q = 1.56e-06
Serie 3 | diferencia en Q = 3.72e-07
```

Table 22: Resultados de la prueba de Ljung–Box con nivel de significancia del 5 %

Serie	n	m	Estadístico Q	Grados de libertad	Valor crítico (5%)	Valor p	Decisión
Serie 1 (y)	169	24	39.5621	24	36.415	0.0238	Rechazar H0
Serie 2 (y)	220	24	136.1250	24	36.415	0.0000	Rechazar H0
Serie 3 (y)	156	24	51.6158	24	36.415	0.0009	Rechazar H0

Prueba de Ljung–Box. Para evaluar la presencia de autocorrelación conjunta hasta el rezago (m=24), se aplica la prueba de Ljung–Box a cada serie. Las hipótesis son:

$$H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \cdots = \rho_m = 0,$$
$$H_1 : \exists k \in \{1, \ldots, m\} \text{ tal que } \rho_k \neq 0.$$

$$H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \cdots = \rho_m = 0,$$
$$H_1 : \exists k \in \{1, \ldots, m\} \text{ tal que } \rho_k \neq 0.$$

El estadístico de prueba es

$$Q = n(n+2) \sum_{k=1}^{m} \frac{\hat{\rho}_{2k}}{n-k}$$

que, bajo la hipótesis nula y los supuestos correspondientes, se compara aproximadamente con una distribución χ^2_m. Como no se estiman parámetros de un modelo sobre estas autocorrelaciones, no se realiza ningún ajuste adicional en los grados de libertad.

Con un nivel de significancia del 5%, se rechaza H_0 cuando $Q > \chi^2_{0.95,m}$, equivalentemente, cuando el p-valor es menor que 0.05. Los resultados para las tres series se presentan en la tabla correspondiente.

	serie	m	Q	critico	p	decision
1	1	6	20.3064	12.5916	0.002440	Rechaza
2	1	12	28.3514	21.0261	0.004910	Rechaza
3	1	24	39.5621	36.4150	0.023800	Rechaza
4	2	6	103.5522	12.5916	0.000000	Rechaza
5	2	12	113.1607	21.0261	0.000000	Rechaza
6	2	24	136.1250	36.4150	0.000000	Rechaza
7	3	6	11.7284	12.5916	0.068300	No rechaza
8	3	12	29.8166	21.0261	0.002980	Rechaza
9	3	24	51.6158	36.4150	0.000878	Rechaza

4.4 C

4.5 bloques serie 1




Table 23: Serie 1: Media y varianza por bloque

Bloque	N° observaciones	Media	Varianza
1	42	0.3500	43.1528
2	42	0.6000	25.7659
3	42	1.5429	42.8167
4	43	2.2674	24.7913

Table 24: Serie 1: Intervalos de confianza al 95% para la media

Método	Error estándar	Límite inferior	Media	Límite superior
Ingenuo (independencia)	0.4489	0.3166	**1.1964**	2.0763
Largo plazo (Bartlett, L = 4)	0.2942	0.6199	**1.1964**	1.7730

4.6 bloques serie 2




Table 25: Serie 2: Media y varianza por bloque

Bloque	N° observaciones	Media	Varianza
1	55	34.1727	10.5683
2	55	35.0345	15.3949
3	55	34.1109	10.0102
4	55	35.5745	13.3723

Table 26: Serie 2: Intervalos de confianza al 95% para la media

Método	Error estándar	Límite inferior	Media	Límite superior
Ingenuo (independencia)	0.2388	34.2552	**34.7232**	35.1912
Largo plazo (Bartlett, L = 4)	0.3517	34.0339	**34.7232**	35.4124

4.7 bloques serie 3




Table 27: Serie 3: Media y varianza por bloque

Bloque	N° observaciones	Media	Varianza
1	39	0.1744	127.4004
2	39	1.0974	142.1624
3	39	0.8513	186.9320
4	39	2.0974	176.2297

Table 28: Serie 3: Intervalos de confianza al 95% para la media

Método	Error estándar	Límite inferior	Media	Límite superior
Ingenuo (independencia)	0.9987	-0.9023	**1.0551**	3.0126
Largo plazo (Bartlett, L = 4)	1.0346	-0.9727	**1.0551**	3.0830

5 Punto 6

##Verificacion de los metodos

```
Verificacion de metodos: OK
```

5.1 serie 1 datos

```
          T          n0           H origenes_h1  origenes_H
        170         136          18           34          17
```

```
[1] "2011-11-01" "2023-02-01" "2025-12-01"
```

5.1.1 optimizacion de parametros y metodos posibles


```
  k      mse
1 2 34.68625
```

```
   k      mse
9 11 32.46473
```

```
   alpha      mse
35   0.7 33.02768
```

```
   alpha beta      mse
10   0.5 0.05 30.74679
```

```
  MM  DMM  SES Holt
  13   24    2    2
```




```
--- Tendencia lineal (exponencial: coeficientes en escala log) ---
# A tibble: 2 x 6
  coeficiente estimacion se_ordinario se_robusto t_estadistico   p_valor
  <chr>            <dbl>        <dbl>      <dbl>         <dbl>     <dbl>
1 beta0           367.         3.32       6.89           53.3 3.38e-107
2 beta1             1.19       0.0336     0.0792         15.0 8.23e- 33
t critico (5\%, gl = n - k): 1.974
R2: 0.8812


--- Tendencia cuadratica (exponencial: coeficientes en escala log) ---
# A tibble: 3 x 6
  coeficiente estimacion se_ordinario se_robusto t_estadistico   p_valor
```

```
  <chr>            <dbl>        <dbl>      <dbl>         <dbl>     <dbl>
1 beta0        412.          1.87       3.93            105.   2.60e-154
2 beta1         -0.390       0.0504     0.102            -3.80 2.00e-  4
3 beta2          0.00922     0.000285   0.000541         17.0  2.28e- 38
t critico (5\%, gl = n - k): 1.974
R2: 0.9836

--- Tendencia exponencial (exponencial: coeficientes en escala log) ---
# A tibble: 2 x 6
  coeficiente estimacion se_ordinario se_robusto t_estadistico   p_valor
  <chr>            <dbl>        <dbl>      <dbl>         <dbl>     <dbl>
1 beta0 (log)    5.93       0.00603     0.0124           477.  5.87e-265
2 beta1 (log)    0.00246    0.0000611   0.000138          17.9 1.13e- 40
t critico (5\%, gl = n - k): 1.974
R2: 0.906
```


5.1.2 correlogramas de metodos serie 1


```
--- Residuos de la tendencia lineal ---
```



```
Ljung-Box (m = 24, 24 gl): Q = 2018.35, critico = 36.42, p = 0
Jarque-Bera (2 gl): JB = 5.82, critico = 5.99, p = 0.0544
Durbin-Watson: d = 0.074, r1 = 0.947, 2(1-r1) = 0.105


--- Residuos de la tendencia cuadratica ---
```







```
Ljung-Box (m = 24, 24 gl): Q = 582.65, critico = 36.42, p = 1.01e-107
Jarque-Bera (2 gl): JB = 5.87, critico = 5.99, p = 0.053
Durbin-Watson: d = 0.526, r1 = 0.730, 2(1-r1) = 0.539

--- Residuos de la tendencia exponencial ---
```






```
Ljung-Box (m = 24, 24 gl): Q = 1955.54, critico = 36.42, p = 0
Jarque-Bera (2 gl): JB = 4.92, critico = 5.99, p = 0.0853
Durbin-Watson: d = 0.109, r1 = 0.931, 2(1-r1) = 0.137
```

5.1.3 aplicacion de metodos serie 1

```
h = 1 (34 origenes)
```

	metodo	n_origenes	RMSE	MAD	MAPE	RMSE_rel_referente
1	Holt	34	5.134	3.966	0.6880	
2	Ingenuo (referente)	34	5.665	4.553	0.7911	
3	SES (contraste)	34	5.859	4.577	0.7957	
4	Media movil (contraste)	34	6.199	4.790	0.8333	
5	Doble media movil	34	6.493	5.354	0.9249	
6	Tendencia cuadratica	34	8.021	6.661	1.1743	
7	Tendencia exponencial	34	38.153	37.792	6.5878	
8	Tendencia lineal	34	40.122	39.758	6.9266	
9	Media simple (contraste)	34	119.429	118.490	20.5954	

```
1             0.9063
2             1.0000
3             1.0341
4             1.0943
5             1.1461
6             1.4158
7             6.7346
8             7.0822
9            21.0810
```


h = 18 (17 origenes)


```
                   metodo n_origenes    RMSE     MAD    MAPE
1                    Holt         17   6.751   5.247  0.8768
2       Doble media movil         17   7.818   7.022  1.1927
3    Tendencia cuadratica         17   9.203   7.701  1.3032
4     Ingenuo (referente)         17  41.667  41.347  6.9620
5         SES (contraste)         17  42.381  42.122  7.0937
6  Media movil (contraste)        17  42.488  42.235  7.1129
7   Tendencia exponencial         17  57.278  57.042  9.6177
8        Tendencia lineal         17  60.959  60.742 10.2402
9 Media simple (contraste)        17 144.801 144.534 24.3554
  RMSE_rel_referente
1             0.1620
2             0.1876
3             0.2209
4             1.0000
5             1.0171
6             1.0197
7             1.3747
8             1.4630
9             3.4752
```


```
    Ingenuo (referente) Media simple (contraste)  Media movil (contraste)
              41.347059               144.533984                42.235294
         SES (contraste)        Doble media movil                     Holt
              42.122291                -3.520107                3.312525
       Tendencia lineal     Tendencia cuadratica    Tendencia exponencial
              60.741542                 6.057519                57.041696
```

5.1.4 validacion de metodos

```
[1] "Holt"
```








```
t media cero (33 gl): t = -0.099, critico = 2.035, p = 0.922

Ljung-Box (m = 8, 8 gl): Q = 4.197, critico = 15.507, p = 0.839

Jarque-Bera (2 gl): JB = 0.770, critico = 5.991, p = 0.68

Durbin-Watson: d = 1.676, r1 = 0.149, 2(1-r1) = 1.701
```

5.1.5 e


```
 [1]  5.21  6.29  6.77  7.35  7.94  8.55  9.13  8.90  8.62  9.23  9.84 10.20
[13] 10.22  9.37  8.54  8.16  7.13  6.06
```

```
        fecha     pron      inf      sup
1  2026-01-01 608.4563 598.2436 618.6690
2  2026-02-01 610.4595 598.1241 622.7949
3  2026-03-01 612.4626 599.1936 625.7316
4  2026-04-01 614.4658 600.0572 628.8744
```

```
5  2026-05-01 616.4690 600.9014 632.0366
6  2026-06-01 618.4721 601.7160 635.2283
7  2026-07-01 620.4753 602.5895 638.3611
8  2026-08-01 622.4785 605.0418 639.9151
9  2026-09-01 624.4816 607.5834 641.3799
10 2026-10-01 626.4848 608.4024 644.5671
11 2026-11-01 628.4880 609.2061 647.7698
12 2026-12-01 630.4911 610.5035 650.4788
13 2027-01-01 632.4943 612.4611 652.5274
14 2027-02-01 634.4974 616.1323 652.8626
15 2027-03-01 636.5006 619.7628 653.2385
16 2027-04-01 638.5038 622.5120 654.4955
17 2027-05-01 640.5069 626.5304 654.4834
18 2027-06-01 642.5101 630.6264 654.3938
```

```
Primer mes con pronostico puntual > 650: NA
```

```
Primer mes con limite superior > 650:   2026-12-01
```



±1.96 veces la desviación de los errores de origen móvil a cada horizonte; no es un intervalo de confianza.

5.2 serie 2

```
         T          n0           H origenes_h2  origenes_H
       220         176           7           44          38
```

```
[1] "2025-02-03" "2025-07-28" "2025-09-10"
```

5.2.1 optimizacion de parametros


```
  k      mse
1 2 11.45155
```

```
   k      mse
8 10 16.71483
```

```
   alpha      mse
49  0.98 9.304195
```

```
   alpha beta      mse
19  0.95 0.05 9.776512
```

```
  MM  DMM  SES Holt
  13   24    2    2
```



5.2.2 correlogramas


```
--- Tendencia lineal (exponencial: coeficientes en escala log) ---
# A tibble: 2 x 6
  coeficiente estimacion se_ordinario se_robusto t_estadistico   p_valor
  <chr>            <dbl>        <dbl>      <dbl>         <dbl>     <dbl>
1 beta0         34.0          0.477      0.664           51.2  1.46e-123
2 beta1          0.00639      0.00374    0.00518          1.23 2.19e-  1
t critico (5%, gl = n - k): 1.971
R2: 0.0132

--- Tendencia cuadratica (exponencial: coeficientes en escala log) ---
# A tibble: 3 x 6
  coeficiente estimacion se_ordinario se_robusto t_estadistico  p_valor
  <chr>            <dbl>        <dbl>      <dbl>         <dbl>    <dbl>
1 beta0       34.2          0.721      0.975           35.0    2.63e-91
2 beta1        0.00196      0.0151     0.0218           0.0901 9.28e- 1
3 beta2        0.0000200    0.0000660  0.0000977        0.205  8.38e- 1
```

```
t critico (5%, gl = n - k): 1.971
R2: 0.0136


--- Tendencia exponencial (exponencial: coeficientes en escala log) ---
# A tibble: 2 x 6
  coeficiente estimacion se_ordinario se_robusto t_estadistico   p_valor
  <chr>            <dbl>        <dbl>      <dbl>         <dbl>     <dbl>
1 beta0 (log)   3.52         0.0141     0.0197          179.   1.54e-238
2 beta1 (log)   0.000182     0.000110   0.000151          1.20 2.31e-  1
t critico (5%, gl = n - k): 1.971
R2: 0.0123


--- Residuos de la tendencia lineal ---
```





```
Ljung-Box (m = 24, 24 gl): Q = 138.45, critico = 36.42, p = 4.48e-18
Jarque-Bera (2 gl): JB = 4.21, critico = 5.99, p = 0.122
Durbin-Watson: d = 0.782, r1 = 0.605, 2(1-r1) = 0.790


--- Residuos de la tendencia cuadratica ---
```




```
Ljung-Box (m = 24, 24 gl): Q = 138.82, critico = 36.42, p = 3.83e-18
Jarque-Bera (2 gl): JB = 4.25, critico = 5.99, p = 0.12
Durbin-Watson: d = 0.782, r1 = 0.605, 2(1-r1) = 0.790

--- Residuos de la tendencia exponencial ---
```






```
Ljung-Box (m = 24, 24 gl): Q = 140.34, critico = 36.42, p = 2.01e-18
Jarque-Bera (2 gl): JB = 9.71, critico = 5.99, p = 0.00777
Durbin-Watson: d = 0.774, r1 = 0.609, 2(1-r1) = 0.782

Nivel final Media simple: 34.72318

Nivel final Ingenuo:      40.1
```

5.2.3 aplicacion de metodos

```
h = 1 (44 origenes)

                            metodo n_origenes  RMSE   MAD  MAPE
1               Ingenuo (referente)         44 3.344 2.350 6.727
2                               SES         44 3.345 2.361 6.756
3                  Holt (contraste)         44 3.428 2.421 6.931
4                       Media movil         44 3.773 2.990 8.532
5      Tendencia lineal (contraste)         44 3.793 3.111 8.718
```

```
6 Tendencia exponencial (contraste)         44 3.835 3.148 8.784
7                      Media simple         44 3.872 3.193 8.861
8  Tendencia cuadratica (contraste)         44 3.945 3.223 8.953
9     Doble media movil (contraste)         44 4.131 3.258 9.360
  RMSE_rel_referente
1              1.000
2              1.000
3              1.025
4              1.128
5              1.134
6              1.147
7              1.158
8              1.180
9              1.236
```


h = 7 (38 origenes)


```
                            metodo n_origenes  RMSE   MAD   MAPE
1      Tendencia lineal (contraste)         38 3.724 3.002  8.503
2 Tendencia exponencial (contraste)         38 3.756 3.045  8.586
3  Tendencia cuadratica (contraste)         38 3.796 3.123  8.728
4                      Media simple         38 3.836 3.122  8.761
5                       Media movil         38 4.987 4.184 11.933
6     Doble media movil (contraste)         38 5.509 4.878 13.984
7                               SES         38 5.595 4.626 13.170
8                Ingenuo (referente)         38 5.630 4.655 13.250
9                   Holt (contraste)         38 6.550 5.380 15.335
  RMSE_rel_referente
1             0.6614
2             0.6672
3             0.6744
4             0.6814
5             0.8859
6             0.9786
7             0.9939
8             1.0000
9             1.1634
```


```
             Ingenuo (referente)                      Media simple
                       -0.3973684                         0.9871917
                      Media movil                               SES
```

```
                    -0.4210526                     -0.3983364
Doble media movil (contraste)                Holt (contraste)
                    -1.1924532                     -0.7301964
 Tendencia lineal (contraste)  Tendencia cuadratica (contraste)
                     0.6346508                      1.1511162
Tendencia exponencial (contraste)
                     0.8026514
```

```
[1] "Ingenuo (referente)"
```







5.2.4 validacion

```
t media cero (43 gl): t = 0.286, critico = 2.017, p = 0.777

Ljung-Box (m = 11, 11 gl): Q = 10.932, critico = 19.675, p = 0.449

Jarque-Bera (2 gl): JB = 2.282, critico = 5.991, p = 0.319

Durbin-Watson: d = 1.988, r1 = 0.003, 2(1-r1) = 1.994
```

5.2.5 e

```
[1] 3.379 4.840 5.756 6.315 6.403 6.108 5.691

       fecha pron      inf      sup
1 2025-09-11 40.1 33.47655 46.72345
2 2025-09-12 40.1 30.61271 49.58729
3 2025-09-13 40.1 28.81789 51.38211
```

```
4 2025-09-14 40.1 27.72209 52.47791
5 2025-09-15 40.1 27.54994 52.65006
6 2025-09-16 40.1 28.12776 52.07224
7 2025-09-17 40.1 28.94577 51.25423
```



±1.96 veces la desviacion de los errores de origen movil a cada horizonte; no es un intervalo de confianza.

5.3 serie 3

```
          T          n0           H origenes_h3  origenes_H
        168         134          12          34          23
```

```
[1] "2012-01-01" "2023-02-01" "2025-12-01"
```

5.3.1 optimizacion de parametros para los metodos

```
     alpha beta gamma      mse
3250  0.05 0.05   0.5 137.1521
```

```
     alpha beta gamma     mse
3250  0.05 0.05   0.5 139.334
```

```
 HW_adit HW_multi
      13       13

Nivel final Ingenuo simple:     156.1

Nivel final Ingenuo estacional: 179.6
```

5.3.2 aplicacion de metodos

```
h = 1 ( 34 origenes)
```


	metodo	n_origenes	RMSE	MAD	MAPE	RMSE_rel_referente
1	tendencia ficticias	34	11.38	8.581	5.172	0.8726
2	Holt-multi(contraste)	34	11.73	9.141	5.678	0.8992
3	Holt aditivo	34	11.88	9.101	5.654	0.9109
4	Ingenuo estacional	34	13.04	9.750	6.087	1.0000
5	ingenuo (referente)	34	33.76	27.132	17.737	2.5882


```
h = 12 ( 23 origenes)
```


	metodo	n_origenes	RMSE	MAD	MAPE	RMSE_rel_referente
1	tendencia ficticias	23	10.89	8.111	4.799	0.8874
2	Holt-multi(contraste)	23	11.59	8.728	5.255	0.9444
3	Holt aditivo	23	11.66	8.777	5.310	0.9500
4	Ingenuo estacional	23	12.27	8.839	5.348	1.0000
5	ingenuo (referente)	23	12.27	8.839	5.348	1.0000

```
   Ingenuo estacional   tendencia ficticias          Holt aditivo
             3.960870              5.146099              5.302059
  ingenuo (referente) Holt-multi(contraste)
             3.960870              4.998646

[1] "tendencia ficticias"
```


Errores de origen movil a un paso: tendencia ficticias
Error (m³/s)
20
0
−20
2024
2025
2026
Fecha
n = 34 errores, h = 1





5.3.3 Validacion

```
t media cero (33 gl): t = 1.552, critico = 2.035, p = 0.13
```

```
Ljung-Box (m = 8, 8 gl): Q = 6.968, critico = 15.507, p = 0.54
```


```
Jarque-Bera (2 gl): JB = 0.697, critico = 5.991, p = 0.706
```

```
Durbin-Watson: d = 2.123, r1 = -0.237, 2(1-r1) = 2.473
```

5.3.4 e

```
 [1] 11.153 10.381 10.465 10.610 10.755 10.385 10.578  9.944  9.883  9.881
[11]  9.676  9.815
```

	fecha	pron	inf	sup
estacion_1	2026-01-01	175.9407	154.08165	197.7997
estacion_2	2026-02-01	194.9192	174.57162	215.2668
estacion_3	2026-03-01	184.2264	163.71543	204.7373
estacion_4	2026-04-01	148.2907	127.49468	169.0866
estacion_5	2026-05-01	116.0978	95.01861	137.1770
estacion_6	2026-06-01	126.7978	106.44287	147.1527
estacion_7	2026-07-01	175.0978	154.36431	195.8313
estacion_8	2026-08-01	187.7407	168.24980	207.2315
estacion_9	2026-09-01	188.7121	169.34188	208.0823
estacion_10	2026-10-01	149.8121	130.44455	169.1796
estacion_11	2026-11-01	122.5621	103.59703	141.5271
estacion_12	2026-12-01	141.2621	122.02410	160.5001



±1.96 veces la desviacion de los errores de origen movil a cada horizonte; no es un intervalo de confianza.