

Ficha de mi Cachorro



Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Sexo:

Raza:

Color:

Adquirido en:

Identificación:

Dueño:

Dirección

Fono:

MANUAL PARA EL CUIDADO DEL CACHORRO

• INTRODUCCIÓN

Con un nuevo cachorro usted disfrutará, al igual que millones de personas, de ese cariño tan especial que sus mascotas le proporcionan. El primer año de su mascota es el más importante, por lo tanto debe estar preparado para ofrecerle una buena estadía, con una alimentación adecuada, entrenamiento y visitas regulares a su Médico Veterinario.

PREPÁRESE PARA RECIBIR A SU CACHORRO

Tener en casa un cachorro, es siempre un gran evento. Después de las 6 semanas de vida, su cachorro deberá estar completamente destetado y listo para comenzar a vivir con su nueva familia.

Usted debe prepararse antes de tener en casa al cachorro. Esto ayudará a que su mascota se adapte más fácilmente a su nuevo entorno. Debe esperarlo con alimento, juguetes, collar, correa y cama.



- **Plato:** Los platos más adecuados para el alimento y el agua del cachorro, son aquellos fáciles de lavar y hechos de un material suficientemente resistente al uso que se le dará.

- **Collar:** El collar de su cachorro debe ser ajustable a medida que éste crece; los collares de ahorque (que estrangulan) son raramente justificables para la mayoría de los perros. Si usted usa uno, debe quitárselo cuando no lo necesite o cuando su perro está solo. Estos collares pueden quedar atascados en sillas, puertas u otros objetos y causar la muerte de su perro por estrangulación.

- **Cama:** La cama del cachorro deberá ser fácil de limpiar y estar protegida de la humedad. Una manta puede servir para un perro adulto, pero los cachorros pueden masticar y destruir estas camas. Los diarios son lo más recomendable para ellos. Durante su primera noche en casa, el cachorro puede sentirse solo o asustado en su nuevo entorno. Música suave, una luz tenue o un reloj tic-tac pueden ayudar a consolarlo. Cuando usted decida donde quiere que su perro duerma, tome en consideración cuales áreas de la casa o el patio están autorizadas y cuales restringidas para él.

- **Dentro de casa:** Un corral es un buen lugar para que su cachorro descanse y duerma. Una malla de alambre o una jaula de fibra de vidrio ayudan a mantenerlo confinado por un tiempo, cuando la familia está ocupada o cuando él esté solo. También proporciona un lugar adecuado cuando el cachorro está cansado o cuando requiera seguridad.

- **Fuera de casa:** Su perro necesita un lugar tranquilo para dormir y debe tener una casa que lo proteja del sol, frío, la lluvia y el viento.

MANEJO ALIMENTARIO



La tendencia moderna está dirigida al uso de alimentos científicamente formulados. Elija un alimento de buena calidad para cada etapa del desarrollo de su mascota: cachorro, adulto, senior. Le recomendamos el uso del alimento Premium Fit Fórmula®. Ante cualquier consulta en relación al alimento adecuado para su mascota, ingrese al sitio web de mascotasonline y formule una consulta al veterinario. Son alimentos prohibidos: repollo, coliflor, papas, pan, grasas, aceites y frituras, huesos de aves o conejos, aliños, legumbres, chocolates y dulces en general.

No alimente en exceso a su mascota, ya que si engorda demasiado puede presentar problemas de columna y enfermedades hepáticas. No lo someta a ejercicios violentos poco antes o poco después de las comidas. Nunca debe faltarle abundante agua fresca. Cualquier cambio de alimentación debe ser gradual ya que de lo contrario se podría producir diarrea. Su cachorro sufrirá un «stress de ambientación» lo que podría llevarle a presentar un cuadro de diarrea transitoria. La primera alimentación luego del destete debe ser un sustituto de la leche materna: MAMISTOP® PERROS, que puede usarse también como complemento de la alimentación a medida que crece su mascota.

REGLAS DE COMPORTAMIENTO

Una de las mayores dificultades que debe sortear el nuevo amo son las conductas higiénicas de su mascota.

El cachorro tiende a hacer sus necesidades en lugares que el dueño generalmente no aprueba. Es importante saber que un cachorro, normalmente tiene una frecuencia alta de micción (hace pipí varias veces al día) y aún no es capaz de contenerse o aguantarse. Como muchas veces, sobre todo si el cachorro está dentro de la casa, esta conducta pasa a ser molesta, es necesario educar al cachorro. Para esto utilizamos **PICHICHI®**, que es un educador sanitario para mascotas. Se debe aplicar 5-10 gotas de **PICHICHI®** en el lugar destinado para que su mascota haga sus necesidades, de preferencia sobre un paño, cartón o diarios, para que su olor permanezca más tiempo. Se debe repetir diariamente la aplicación hasta que el cachorro se habitúe.

En ocasiones, su cachorro puede orinar en sitios o artículos que usted no desee. Para evitar esto use **PET OUT®**, así terminará con los problemas que ocasiona el marcaje territorial y las malas conductas. **PET OUT®** se aplica en forma de rocío sobre la superficie elegida, repitiendo tres veces al día hasta que su cachorro aprenda que ese sitio está restringido para él. **PET OUT®** no debe aplicarse directamente sobre el pelaje de la mascota. Si es abundante agua y enjuagar en repetidas ocasiones.



Cuando la orina y/o las fecas de vuestro cachorro no son recogidas de inmediato, estas impregnan la zona con un olor, para nosotros desagradable y para el cachorro característico de "su baño". Es por eso que siempre es recomendable levantar rápidamente los desechos (los cuales además pueden ser fuente de enfermedades importantes como los parásitos), limpiar la zona en cuestión y desodorizarla. En este punto es recomendable la utilización de **QUIT OLOR®**, el cual es un eliminador de

olores ambientales. Se puede usar a discreción cuantas veces sea necesario, para desodorizar el ambiente de malos olores.

ATENCIÓN: **QUIT OLOR®** no es colonia para perros ni gatos, por lo que no se debe aplicar directamente a la mascota.



En ocasiones los cachorros tienden a morder objetos de la casa, como sillones, zapatos, cortinas, cables, etc... para corregir este mal hábito de pequeños utilizamos **CAN OUT®**, una solución amargante antimordeduras de perros. **CAN OUT®** debe aplicarse en el objeto o superficie que se desea que el perro no muerda, así cuando se acerque a morder rechazará el producto. En un comienzo se debe aplicar varias veces al día y posteriormente una vez al día.

ENTRENAMIENTO

El entrenamiento proporciona seguridad y confianza a usted y a su mascota. Además, es una muy buena manera de comunicarse entre ambos.

El entrenamiento puede empezar cuando un cachorro tiene entre 8 y 10 semanas de edad, continuando su aprendizaje a medida que crece y se convierte en adulto.



Los cachorros se cansan fácilmente, por esto las sesiones de entrenamiento deben ser cortas: una o dos por día, de 15 a 30 minutos cada una. Recuerde que los perros poseen, por sobre todo, una memoria asociativa por lo que debe ser paciente. La repetición es necesaria y debe ser muy generoso en sus alabanzas y elogios cuando su

cachorro obedezca la orden. Sea consistente y seguro cuando lo entrene. Él necesita saber quién es el jefe. Recuerde corregirlo cuando está en un error y alabarlo cuando está en lo correcto. Use su voz para hacerlo, nunca recurra al castigo físico. Diga «¡NO!» con voz autoritaria cuando lo corrija; luego que su cachorro responda a su corrección, alábelo inmediatamente.

EXÁMENES RUTINARIOS



Usted y su perro serán los mejores amigos, pero hay otra persona quien también será un buen amigo: Su Médico Veterinario. Visítelo con su nueva mascota. Los cachorros deben ser vacunados a temprana edad.

Su veterinario le entregará un calendario de vacunas.

Realice chequeos regulares cada 6 meses.

- **Examen físico:** Durante el examen físico, su veterinario palpará el abdomen del cachorro, auscultará el tórax para escuchar el corazón y los sonidos respiratorios, revisará la condición del pelaje, mirará los oídos por si hay infección o parásitos, examinará los ojos para estar seguro que ellos están limpios y libres de infecciones, revisará la cavidad bucal para determinar si hay depósitos de tártaro o alteración en las encías. Su veterinario le preguntará por cualquier problema reciente de salud o si su cachorro ha estado junto a otros perros enfermos. Para responder las preguntas que su veterinario le formula, usted necesita saber qué es lo normal. La siguiente guía le ayudará a distinguir la normalidad de una alteración.

• **Ojos:** Los ojos de su cachorro deben estar brillantes y limpios. Cualquier descarga o secreción debe despertar su preocupación y seguir la evolución de este signo. También observe si hay hinchazón o protuberancias en los párpados.

• **Oídos:** Los oídos de su perro deben estar limpios y libres de descarga y olor. Limpie rutinariamente los oídos usando **DRAGOVIN®** ó **LIMPIOTIC®**. Los ácaros del oído, común en perros y gatos, son unos parásitos muy pequeños, que producen una secreción de color negro. Un tratamiento veterinario es necesario para eliminar estos parásitos.

Algunas razas, como Poodles, Cockers y Setters tienen que necesitan ser recortados o retirados. Pregunte hacerlo. Un descuido de cualquier inflamación o infección de los oídos puede llevar a cronicidad (enfermedad progresiva) la que puede presentarse con dolor, debiendo en aquellos casos que no remitan con tratamiento local, **TRANSIMED®** o **ULTRAFIL®**, solucionarse con cirugía.



• **Nariz:** La nariz de su cachorro debe estar limpia y húmeda sin descargas o heridas.

• **Hocico:** Examine el hocico de su perro periódicamente. Las encías deben estar rosadas y saludables.

Los dientes de su perro tienen que ser examinados y limpiados por su veterinario cada seis meses, ya que los depósitos de tártaro pueden llevar a una enfermedad en las encías, a la pérdida de dientes, o bien, a una enfermedad sistémica producto de la placa bacteriana junto a las encías.

• **Cuerpo y Pelaje:** Toque el cuerpo del cachorro para determinar la existencia de tumores, protuberancias y garrapatas. Pase su mano a contrapelo para ver si hay pulgas, caspa o suciedad.

• **Ano:** Examine el ano de su perro por si existiera una infección o parásitos intestinales. Ambas condiciones necesitan tratamiento veterinario.

Vacunaciones: Estas serán administradas durante las visitas a su Médico Veterinario. No tenga miedo en preguntarle cualquier inquietud relacionada con la salud de su perro. Su veterinario es la mejor fuente de información y debe convertirse en su mejor aliado para la buena salud de su mascota.

A continuación aparece el calendario de vacunas de tu cachorro:

EDAD	¿QUE LE CORRESPONDE?
1 1/2 meses	Vacuna Parvo/Corona
2 meses	Vacuna Octuple/ Séxtuple
3 meses	Vacuna Octuple/ Séxtuple
4 meses	Vacuna Octuple/ Séxtuple
6 meses	Vacuna Antirrábica
1 año	Vacuna Antirrábica



COMO ADMINISTRAR UN MEDICAMENTO

Si su perro está enfermo, su Médico Veterinario probablemente prescribirá un medicamento oral. Si tiene que ingerir comprimidos, la forma más fácil es esconderla dentro de una pequeña cantidad de comida. Tome una pequeña cantidad de alimento y haga una bola, ponga en el interior el comprimido. Si su perro come alimento seco, puede humedecerlo o comprar alimento enlatado para administrar la tableta (puede ofrecerlo como premio antes de las comidas regulares). Al dar este alimento en forma de bola, con el medicamento en su interior, su perro lo aceptará de inmediato y usted estará seguro que recibió su medicación. Su Médico Veterinario le mostrará como dar la tableta directamente cuando sea necesario. Si su cachorro debe recibir un medicamento líquido, ponga el gotario entre los dientes, incline hacia arriba el mentón y lentamente administre el medicamento. Puede hacerse también través de una jeringa sin aguja.

ENFERMEDADES COMUNES

La salud de su cachorro no sólo es importante para usted. Esta preocupación se traduce en numerosas investigaciones de Médicos Veterinarios y laboratorios farmacéuticos a través del mundo. Fruto de estas investigaciones, han sido desarrolladas medicinas y vacunas que proporcionan salud y protección a muchas enfermedades. Al momento de ser vacunado, su cachorro debe estar sano al examen clínico, libre de parásitos y bien alimentado. Una alimentación con ingredientes de alta calidad trabajará junto a la vacuna para construir anticuerpos y resistir las enfermedades.



Las siguientes enfermedades pueden ser controladas a través de vacunaciones.

- **Distemper:** Esta enfermedad es causada por un virus que ataca todos los tejidos del cuerpo. Se pueden distinguir tres grandes grupos de síntomas: respiratorios, digestivos y neurológicos. Los signos de distemper son similares a un resfriado con fiebre. Algunas veces causa neumonía, secreciones oculares, nasales, diarrea, parálisis y/o convulsiones. El pronóstico va de reservado a desfavorable, sumado a lo oportuno del tratamiento, el cual es sólo sintomático.
- **Parainfluenza:** Esta enfermedad puede ser causada por uno o varios microorganismos y puede diseminarse rápidamente en un criadero de perros. Usualmente la enfermedad causa problemas respiratorios y no constituye una amenaza para la vida.
- **Parvovirus y Coronavirus:** Enfermedades virales, muy contagiosas, se caracterizan por producir vómitos y diarrea sanguinolenta y maloliente. La deshidratación severa e infecciones asociadas pueden provocar la muerte. Requiere de atención clínica inmediata, ante la aparición de los primeros síntomas. A menor edad de los cachorros, aumenta la probabilidad de un desenlace fatal.
- **Rabia:** Esta enfermedad es causada por un virus que está en la saliva de los animales infectados y es transmitido mediante su mordedura. El virus ataca al tejido nervioso, causando parálisis y muerte. La imposibilidad para tragar, lleva equivocadamente a pensar que el perro rechaza el agua, por esto la enfermedad

fue comúnmente llamada hidrofobia. Todas las mascotas deben recibir la vacuna antirrábica, ya que este virus puede ser transmitido a las personas al tener contacto directo con un animal infectado. ¡La rabia es siempre fatal!

Las siguientes son alteraciones posibles de encontrar en perros, y usted las debe conocer para comunicárselas a su Médico Veterinario.

- **Diarrea:** Puede ser causada por varios factores, incluyendo bacterias, virus, parásitos intestinales, sustancias tóxicas, ciertos alimentos o trastornos psicológicos. Una disfunción orgánica, especialmente de hígado o páncreas, también puede causar diarrea. La diarrea se puede tratar eliminando todo alimento por 24 horas, proporcionando solamente agua fresca, y tratando con **DIARREPAS®** en casos necesarios. Llame a su Médico Veterinario si la diarrea es sanguinolenta, si el volumen de la diarrea es muy grande, si su perro está débil, deshidratado, tiene síntomas de otra enfermedad o si la diarrea continúa por más de 24 horas. Después que su perro se recupere, vuelva a su dieta regular ofreciendo pequeñas cantidades de alimento, alrededor de 3 a 6 veces al día.
- **Constipación:** Al igual que la diarrea, la constipación puede ser causada por muchos factores, incluyendo ingestión de sustancias como pelo, huesos o material extraño, poca ingesta de agua y algunas enfermedades. Su Médico Veterinario puede necesitar tomar muestras de sangre, radiografías, ecografías u otras pruebas para encontrar la causa de la constipación. Además su Médico Veterinario le recomendará una dieta alta en fibra. Usted puede ayudar promoviendo a que su perro haga más ejercicio, y que no coma huesos u otras materias indigestibles.
- **Vómito:** Es posible que su perro vomite ocasionalmente. Sin embargo, llame a su Médico Veterinario si los vómitos ocurren más de cinco veces en pocas horas, el volumen del vómito es muy grande, el vómito contiene sangre o está acompañado por diarrea o dolor abdominal.

CONTROL PARASITARIO

Los parásitos pueden ser peligrosos para su familia y su mascota, si no están bajo control. Los siguientes parásitos son comunes y usted debe conocerlos.

PARÁSITOS EXTERNOS

Pulgas y Garrapatas: Un buen tratamiento debe ser efectivo contra los parásitos sobre su mascota y los que están en el ambiente, y a su vez, inocuo para su perro y usted. Recuerde que la pulga se alimenta de la sangre de su cachorro y que no está presente siempre sobre el perro; el desarrollo larvario también ocurre fuera del perro. Las pulgas pueden sobrevivir muchos meses sin alimentarse y entonces desarrollar un apetito voraz, el que manifiestan a través de su picada. Por otro lado, una garrapata hembra, puede colocar entre 2.000 y 4.000 huevos, los que pueden permanecer biológicamente activos hasta por tres años. Para obtener óptimos resultados controle los parásitos en su mascota y los que se encuentran en el ambiente, para esto, use los métodos de la siguiente lista, dependiendo



de las condiciones climáticas y las facilidades para usted y su mascota:

- **Shampoos:** Un buen shampoo antiparasitario es el primer paso para combatir las pulgas y/o garrapatas. Use **DORAZEL PLUS®** o **SINPUL SHAMPOO®**, pues contienen un insecticida asociado a su formulación cosmética para mascotas. Su Médico Veterinario puede indicarle como usarlo.



- **Spray: FIPROKILL® SPRAY:** Lo más efectivo en el control de pulgas y garrapatas en perros y gatos. Producto a base de fipronil, que altera el sistema nervioso central de los parásitos provocándoles la muerte.

En presentaciones de 100 y 250 ml en spray. Se puede utilizar en cachorros desde los 2 días de vida. En perros su eficacia contra pulgas es de 90 días, y 30 días contra garrapatas. En gatos, protege por hasta 30 días contra pulgas. Permite baños 48 horas antes y después de su aplicación.

Use también la línea de productos **SINPUL SPRAY®**. Estos productos contienen un nivel de compuestos muy activos contra los parásitos, pero seguros para su cachorro. Pregunte a su Médico Veterinario con qué frecuencia debe usarlos.


- **Baños sanitarios:** Pueden ser polvos para disolver (**SINPUL® 30**) o líquidos para diluir (**SINPUL SOLUCIÓN®**). En cualquier caso, es preciso bañar completamente a la mascota y dejar secar sin enjuagar. Impida que su mascota ingiera el agua del baño, dándole de beber abundante agua fresca antes. Puede usar el preparado sobrante para esparcirlo por patios y terrazas.

- **Antiparasitarios Pour-On:** Son muy fáciles de aplicar y muy efectivos en el control de pulgas y garrapatas. **FIPRODRAG® PIPETA:** En presentaciones de 2 - 10 kilos, de 10 - 20 kilos, de 20 - 40 kilos y de 40 - 60 kilos de peso para perros y presentación única para gatos. Se puede utilizar desde las 10 semanas de edad. Tiene una duración de al menos 2 meses contra pulgas y 5 semanas contra garrapatas en perros. En el caso de los gatos protege hasta 5 semanas contra las pulgas.

Fiprokill® Pipeta permite baños 48 horas antes y después de su aplicación, sin perder su eficacia.

SINPUL® PIPETA RAZA PEQUEÑA: Para perros con peso menor a 15 kilos, aplicar todo el pomo (2mL) en la zona de la cruz. El producto proporciona una efectiva protección contra reinfestaciones por 4 semanas después de su aplicación.

SINPUL® PIPETA RAZA GRANDE: Para perros de 15 o más kilos, aplicar un pomo (2mL) en la zona de la cruz y otro pomo de igual volumen en la base de la cola. El producto proporciona una efectiva protección contra reinfestaciones por 4 semanas después de su aplicación.



Tiña: La tiña es una infección por hongos (micosis) que afecta a la piel de los cachorros más que a la de perros adultos. La infección es transmitida desde otro cachorro o desde los hongos del suelo. El síntoma clásico es la aparición de una costra o un círculo con pérdida de pelo. La tiña puede ser transmitida a las personas, especialmente a los niños. **IMAVEROL®** es un producto importado, con el que se puede bañar para combatir los hongos. Su veterinario examinará las áreas sin pelo y las lesiones para asegurar el diagnóstico, e implementará una serie de baños como tratamiento. Puede prevenir bañando con shampoo **REGEPIPEL PLUS®** que puede ser usado también en gatos.

PARÁSITOS INTERNOS

- **Áscaris:** El ciclo de vida de los parásitos intestinales tiende a fomentar la reinfestación. Los cachorros pueden nacer con ellos, o recibir las larvas a través de la leche de su madre. Para estos casos, **INVERMIC® GOTAS** o **NANORMEN® SUSPENSIÓN** son indicados desde los 15 días de vida de su mascota. Los parásitos adultos producen huevos, los que son eliminados por medio de las deposiciones. Estos huevos (o larvas) pueden infectar a otro animal. Los huevos de Tenias son ingeridos por pulgas que diseminan la enfermedad cuando un perro o gato accidentalmente come una pulga. Las hembras deben ser revisadas antes de cruzarse ya que deben ser tratadas con **PANVERMIC PLUS®, PRAZIVERMIC®** o **CANIFORT®** para evitar que las larvas pasen a los fetos a través de la sangre. Su Médico Veterinario puede detectar parásitos intestinales por la presencia de huevos y administrar uno de los medicamentos mencionados. Las fecas deben ser recogidas frecuentemente para prevenir la diseminación de huevos y larvas.

A continuación el calendario de las desparasitaciones:

EDAD	¿QUE CORRESPONDE?
15 DÍAS	DESPARASITAR CON INVERMIC (PERRO) o NANORMEN SUSPENSIÓN
30 DÍAS	DESPARASITAR CON INVERMIC (PERRO) o NANORMEN SUSPENSIÓN
45 DÍAS	DESPARASITAR CON INVERMIC (PERRO) o NANORMEN SUSPENSIÓN
60 DÍAS	DESPARASITAR CON INVERMIC (PERRO) o NANORMEN SUSPENSIÓN
75 DÍAS	DESPARASITAR CON INVERMIC (PERRO) o NANORMEN SUSPENSIÓN
3 MESES	DESPARASITAR CON PANVERMIC PLUS, PRAZIVERMIC o CANIFORT
4 MESES	DESPARASITAR CON PANVERMIC PLUS, PRAZIVERMIC o CANIFORT
5 MESES	DESPARASITAR CON PANVERMIC PLUS, PRAZIVERMIC o CANIFORT
CADA 3-4 MESES	DESPARASITAR CON PANVERMIC PLUS, PRAZIVERMIC o CANIFORT
DE POR VIDA	

CUIDADOS

Los cuidados de higiene y belleza son importantes para la salud de su mascota, quien apreciará el tiempo extra que usted le entrega. Su Médico Veterinario lo guiará en relación a la frecuencia de los baños para su perro. Use un shampoo suave como **SIR DOG®** o **CANISH®**; nunca jabón de lavar. Siempre peine y cepille el pelaje para desenredar antes de mojarlo, ya que el agua aprieta los nudos de pelo. Los animales de pelo largo y abundante como el Collie, Samoyedo, Pastor Inglés, Pastor de Brie y otros, requieren de un cepillado frecuente, con especial atención en las áreas alrededor de los oídos y cola. Para ello, **CANISH®** balsámico facilitará el cepillado. Si el pelaje de tu mascota tiende a enredarse con facilidad puedes utilizar **SUAVIPET®**, una loción desenredante para perros y gatos especialmente formulado para razas cuyo pelaje es muy fino y que tengan predisposición a formar nudos en su pelaje como los Maltés, Yorkshire, Setter Irlandés y otras razas. Se recomienda aplicar después del baño previo al cepillado.



ALERGIAS

Los síntomas incluyen picazón, pérdida de pelo, fricción y frotación de diversas partes del cuerpo. Su mascota se lamerá o se rascará con frecuencia las orejas, las extremidades, las axilas o la ingle. Este trauma a repetición provocará a menudo infecciones crónicas. Para tener éxito con el tratamiento, deberá seguir las instrucciones de su Médico Veterinario. Las alergias pueden tratarse por varios métodos, incluidos inyecciones, medicamentos orales, champús tópicos y cremas.

REPRODUCCION CANINA

Si desea que su mascota tenga cachorros, ha tomado una gran decisión. La pubertad de los perros se presentará alrededor de los 6 - 8 meses de edad, dependiendo de la raza. El primer ciclo estral (celo) de la hembra durará alrededor de 21 a 22 días, y ella continuará ciclando cada 6 meses en promedio. Si usted opta por no cruzar jamás a su perra, ella puede ser esterilizada quirúrgicamente. El macho también puede ser esterilizado. A menos que usted esté planificando un programa de cruces para su mascota, aquí tiene algunas buenas razones para controlar la población canina.



Cada año miles de cachorritos son abandonados; animales saludables son eliminados violentamente o guardados hasta que alguien los adopte. Este problema se va acrecentando porque perros sin dueño se cruzan y sus camadas no cuentan con un hogar. Recuerde, si usted decide cruzar a su mascota, debe responsabilizarse por encontrar un hogar apropiado para los cachorros. En el caso de que su perra se cruce sin usted quererlo, de todas formas es su responsabilidad hacerse cargo de los cachorros. Una opción para evitar los ciclos de las perras, es usar anticonceptivos inyectables (**OVO - 6®**) u orales (**NONPET® PERRA**), siguiendo la indicación de su Médico Veterinario quien evaluará la mejor elección según sea su caso particular. Si su opción es cruzar a su perrita, haga una cita con su Médico Veterinario para un examen físico y revisar el programa de desparasitaciones y vacunaciones. Su perrita también debe estar con un óptimo peso corporal para asegurar su salud y la salud de sus cachorros. La gestación de las perras tiene una duración aproximada de 9 semanas; durante este tiempo su perra necesita cambiar su alimentación, por un alimento de cachorros alto en proteína. Ella requiere aumentar las cantidades de calorías, calcio, fósforo, proteínas y vitaminas. Aportes suplementarios se pueden obtener con **JUECAN®** en polvo o **DOGUIVIT®** en comprimidos.

El ciclo estral de la perra:

ANESTRO	60-120 días. Sin signos de celo
PROESTRO	10 -12 días. Inflamación de la vulva. Sangramiento iii No Acepta la monta!!!
ESTRO	10 -12 días. Sangramiento disminuye o desaparece iii Acepta la monta!!!
METAESTRO	60- 70 días. Rechaza la monta y retoma la conducta normal, a menos que se haya cruzado y esté preñada.

PRIMEROS AUXILIOS

Cuando su mascota presente algún problema, es importante que usted sepa reaccionar pronta y oportunamente. Conocer los auxilios básicos es esencial para la recuperación de su mascota. Cuando usted conozca los procedimientos adecuados de primeros auxilios, podrá ayudar a su perro a recuperarse de las emergencias y además, ayudará a su Médico Veterinario.

- **Respiración artificial:** Si su cachorro no respira por cinco a seis minutos, se puede producir daño cerebral. Se debe actuar rápidamente. Primero ponga a su perro de costado. Extienda su cabeza y exteriorice la lengua usando sus manos con un paño limpio para que no se le resbale. Extraiga cualquier material extraño o mucoso de la garganta usando sus dedos envueltos con un trozo de gasa. Inicie la respiración artificial poniendo sus manos sobre el pecho del perro a la altura de los codos. Presione por tres a cuatro segundos y relaje por el mismo periodo de tiempo. Continúe este procedimiento hasta que su perro empiece a respirar. Cuando lo haga mantenga presionado el pecho, pero no aplique mucha presión. Reduzca gradualmente la compresión. Levante a su perro de espalda, tomando hombros y caderas y póngalo en un lugar tranquilo y protegido. Llame a su Médico Veterinario inmediatamente.


- **Shock:** Un shock puede llevar a la muerte. Esta condición produce una gran disminución de la irrigación sanguínea hacia el cerebro y otros órganos vitales. Cuando su perro se encuentre en estado de shock presentará el pulso reducido, las encías pálidas, debilidad, disminución de la frecuencia cardíaca y la respiración alterada. Primero revise la cavidad bucal de su perro (usted podría hacer respiración

artificial), luego detenga cualquier pérdida de sangre presionando directamente o usando un torniquete. Mantenga la cabeza en 1 nivel más bajo que el corazón, ubique a su perro en un lugar tranquilo y protegido. Llame a su Médico Veterinario inmediatamente después de estabilizar a su perro.

- **Hemorragias:** Las hemorragias pueden ser controladas de tres formas: por compresión, vendaje y por torniquete.

1. **Por compresión:** mantenga presionada el área usando un trozo de género limpio o gasa. Sosténgalo durante cuatro a cinco minutos y disminuya lentamente la presión. Si la hemorragia continúa, pruebe con compresión y vendaje. Cambie el vendaje durante la primera hora para asegurarse que la hemorragia se detuvo y también comprobar que el vendaje no está muy apretado.
2. **Torniquete:** se usa cuando la lesión está acompañada de salida de sangre en chorro o cuando la compresión, o vendaje no ayudan a detener la hemorragia. El torniquete debe estar entre la lesión y el corazón; apriete lo suficiente como para controlar la hemorragia y libere el torniquete levemente cada 15 minutos hasta constatar su detención. Luego lleve a su mascota inmediatamente a su Médico Veterinario.

3. **Vendaje:** Recuerde que el vendaje de su mascota debe estar firme pero no apretado. Un vendaje apretado puede alterar el flujo sanguíneo. Primero limpie el área con un antiséptico (también puedes usar **PETEVER®**) y agua tibia. Seque y luego aplique una venda o cinta no adhesiva. Cúbralo con gasa y fije el vendaje con tela adhesiva en el lugar.



- **Transporte de un animal lesionado:** Siempre se debe mover a un animal lesionado, acostado sobre uno de sus lados y ojalá sobre una camilla. Usted puede hacerlo poniendo dos palos o barras unidas por medio de las mangas de una chaqueta o camisa, o usando una frazada o manta. Recuerde, cuando transporte a un animal lesionado, revíselo para determinar si está en shock o sangrando. Esté atento a su hocico, ya que la mayoría de las mascotas pueden morder si están doloridas.

- **Congelamiento:** A bajas temperaturas, una mascota puede iniciar un proceso de congelación en orejas, patas y cola. La piel congelada es pálida y lustrosa al principio y luego se torna blanco-escarchada. Entibie la piel aplicando calor, alrededor de 24°C, con toallas húmedas a la temperatura mencionada. Después que la piel se entibie, seque cuidadosamente y vende la zona afectada, sin apretar demasiado.

- **Golpe de calor:** Los síntomas del golpe de calor incluyen jadeo, espuma por el hocico, agitación extrema, depresión y coma. Si su perro tiene una temperatura sobre 41°C, puede presentar daño cerebral irreversible. Una hipertermia de su perro debe ser controlada con agua fría y/o hielo envuelto en un paño. Llame a su Médico Veterinario inmediatamente.

- **Quemaduras:** Si su mascota se ha quemado, no ponga ningún tipo de sustancia ni medicamento en la lesión. Sólo aplique agua fría o hielo envuelto en paños, mientras se dirige lo más pronto posible donde su Médico Veterinario.

- **Heridas:** Todas las heridas, ya sean grandes o pequeñas, deben ser limpiadas con agua y jabón o con algún antiséptico (Puede diluir



PETEVER®). Si la herida es hemorrágica, aplique los primeros auxilios para hemorragias. En cortes superficiales, después de limpiar, vende (si es posible) con una cinta no adhesiva, gasa estéril o gasa de vendaje. Un corte de más de 5 cm. de longitud o más de 1 cm. De ancho requiere puntos. Si su mascota se ha cortado haga lo siguiente: enfrente los bordes, aplique compresión y vendaje. Cambie el vendaje durante la primera hora para hacer una evaluación y llame a su Médico Veterinario. Para una herida perforada o punzante, usted debe hacer una limpieza y desinfección profunda para evitar la formación

de abscesos. Heridas de balas o perdigones necesitan ser limpiadas y desinfectadas para evitar la contaminación, pero si su mascota esta postrada, trátela como a una mascota en shock y llévela a la clínica veterinaria más cercana para un tratamiento inmediato. La cicatrización posterior puede ser estimulada usando **VULKETAN®** gel o **MIXANTIP PLUS®** crema.

- **Intoxicaciones:** Si su mascota ha ingerido accidentalmente una sustancia tóxica, como agroquímicos, veneno para ratones, anticongelantes para autos o algún medicamento humano, llame a su Médico Veterinario o a un centro de información toxicológica para ayudarlo inmediatamente (C.I.T.U.C. 6353800 - Stgo.). No induzca vómito hasta saber fehacientemente si la sustancia que ha ingerido no es cáustica. Algunas sustancias tóxicas pueden ser más dañinas cuando son vomitadas. Si debe inducir el vómito, déle a beber agua oxigenada. **HEPROTEC®** jarabe puede ser utilizado como protector hepático durante la convalecencia.

- **Lesiones en los ojos:** Todas las lesiones oculares necesitan una pronta atención veterinaria. No aplique ningún medicamento en los ojos de su mascota y no permita que se frote. Llévelo inmediatamente a su Médico Veterinario.

- **Anzuelos:** Nunca remueva un anzuelo que se encuentre cerca de la zona de los ojos; su veterinario debe hacerlo. Para otras áreas, pase el anzuelo a través de la piel y córtelo en la púa con una herramienta apropiada, luego retírelo. Trate la lesión como a una herida punzante y llame a su Médico Veterinario.

