

Estadio de la planta (momento fenológico)	Aplicación	Principio Activo	Consejo	Estadio de la planta (momento fenológico)
Gusano (carpocapsa)	Estar atento a las alertas dadas por ISCAMEN y SENASA, según oasis.	Según monitores y daños	Metil azinfos Fosmet Teflubenzuron Flufenoxuron Tebufenozide Metoxifenozone Acetamiprid Tiacloprid Carpovirus Plus Spinosad Novaluron Clorantraniliprole Cyantraniliprole Flubendiamide	Hacer monitoreo permanentes en todo el ciclo de vida de la plaga. Estar atento a las alertas dadas por el ISCAMEN y SENASA, según oasis. Las trampas de confusión sexual son efectivas para poblaciones bajas (menos del 2% de daño en cosecha). <u>Control Cultural:</u> Cartón corrugado desde fines de diciembre y destrucción de cartones en invierno. Erradicación de montes viejos o abandonados. Raspado de troncos y destrucción de corteza. Poda: altura máxima de plantas 5m alcanzar la parte superior del árbol hay mayor actividad de la plaga. Pulverización y descortezado de puntales antes de colocación. Eliminación fruta atacada, enterrado, sancochado. Desinfección: frigoríficos, galpones de empaque, cajones cosecheros, bins y todo recipiente retornable donde se haya colocado fruta. Tener cuidado de no matar a su enemigo natural con el exceso de químicos.