

Ayudantía 15 - MAT1610


1. Calcular el volumen de un cono circular truncado, cuya altura es h , base inferior R y radio superior r , como se muestra en la figura.



Solución:

Note que el cono circular truncado puede obtenerse al rotar alrededor del eje x el área del trapecio de altura h , base menor r y base mayor R , como en la figura

Note el área del trapecio se asocia al área bajo la recta que pasa por los puntos $(0, r)$ y (h, R) ,



entre 0 y h . Dicha recta tiene ecuación $y = mx + r$ con $m = \frac{R-r}{h-0} = \frac{R-r}{h}$, entonces,

$$V = \int_0^h \pi(mx + r)^2 dx = \pi \int_0^h (mx + r)^2 = \pi \left. \frac{(mx + r)^3}{3m} \right|_0^h = \frac{(mh + r)^3}{3m} - \frac{(r)^3}{3m}$$

Por lo tanto,

$$V = \frac{\pi}{3m} ((mh + r)^3 - r^3) = \frac{\pi}{3 \frac{R-r}{h}} ((R - r + r)^3 - r^3) = \frac{\pi h}{3(R-r)} (R^3 - r^3) = \frac{\pi h}{3} (R^2 + rR + r^2)$$

Así, el volumen de un cono circular truncado, cuya altura es h , base inferior R y radio superior r es $V = \frac{\pi h}{3} (R^2 + rR + r^2)$ unidades de volumen.

2. Determinar el volumen del sólido generado por la rotación del área limitada por las curvas asociadas a $-y^2 - 1 = x$ y la recta $x = -2$ alrededor de la recta $x = -2$



Solución:

Puntos de Intersección: $-y^2 - 1 = -2 \Leftrightarrow y^2 = 1 \Leftrightarrow y = \pm 1$, es decir, los puntos son $(-2, -1)$, $(-2, 1)$.

$$\begin{aligned} V &= \int_{-1}^1 \pi(-y^2 - 1 - (-2))^2 dy \\ &= 2\pi \int_{-1}^1 (-y^2 + 1)^2 dy \\ &= 2\pi \int_{-1}^1 (y^4 - 2y^2 + 1) dy \\ &= \pi \left(\frac{y^5}{5} - 2\frac{y^3}{3} + y \right) \Big|_{-1}^1 \\ &= \left(\frac{16\pi}{15} \right) \end{aligned}$$

Así el volumen es $\frac{16\pi}{15}$ unidades de volumen.


Idea gráfica



3. Hallar el volumen del sólido generado en la rotación del área limitada por la parábola $y = -x^2 - 3x + 6$ y la recta $y = 3 - x$ alrededor de la recta $x = 3$ y del eje x .

Solución:


El área a rotar se muestra en la figura



Intersección entre las curvas:

$$\begin{aligned}
 -x^2 - 3x + 6 &= 3 - x \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0 \\
 &\Leftrightarrow (x + 3)(x - 1) = 0 \\
 &\Leftrightarrow x = -3 \vee x = 1
 \end{aligned}$$

Idea gráfica del sólido generado:



$$\begin{aligned}
V &= 2\pi \int_{-3}^1 (3-x) (-x^2 - 3x + 6 - (3-x)) dx \\
&= 2\pi \int_{-3}^1 (3-x) (-x^2 - 2x + 3) dx \\
&= 2\pi \int_{-3}^1 (-3x^2 - 6x + 9 + x^3 + 2x^2 - 3x) dx \\
&= 2\pi \int_{-3}^1 (x^3 - x^2 - 9x + 9) dx \\
&= 2\pi \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - \frac{9x^2}{2} + 9x \right] \Big|_{-3}^1 \\
&= 2\pi \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{3} - \frac{9}{2} + 9 - \left(\frac{81}{4} + 9 - \frac{81}{2} - 27 \right) \right] \\
&= 2\pi \left[-\frac{80}{4} + \frac{72}{2} + 27 - \frac{1}{3} \right] \\
&= 2\pi \left[43 - \frac{1}{3} \right] \\
&= 2\pi \left[\frac{128}{3} \right] \\
&= \frac{256\pi}{3}
\end{aligned}$$

Así, el volumen del sólido es $\frac{256\pi}{3}$ unidades de volumen.

4. Determinar el volumen del sólido generado por la rotación alrededor del eje y del área limitada por las curvas asociadas a $y = e^{-x^2}$, $y = 0$, $x = 0$ y $x = 1$.

Solución:

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^1 (2\pi x e^{-x^2}) dx \\
 &= \pi \int_0^1 (2x e^{-x^2}) dx \\
 &= -\pi \int_0^{-1} e^u du \\
 &= \pi \int_{-1}^0 e^u du \\
 &= \pi (e^u \big|_{-1}^0) \\
 &= \pi(1 - e^{-1})
 \end{aligned}$$

Así el volumen es $\pi(1 - e^{-1})$ unidades de volumen. Idea gráfica:

