

Exodoncia simple de tercer molar superior (1.8 / 2.8)

v0.2 · borrador · borrador sin revisión de especialista · 2026-10-06

Fuentes, el porqué de cada paso y la versión vigente
criterium-e5d90.web.app/#proto/exodoncia-18



PIEZA (1.8 / 2.8)	INDICACIÓN	TUBOS DE ANESTESIA	COMUNICACIÓN AL SENO (MM)
-------------------	------------	--------------------	---------------------------

PASO A PASO

- 01

☐ Confirma indicación y radiografía

Confirma la indicación y mira la radiografía antes de anestesar.
- 02

☐ Enjuague y posición

Haz que el paciente se enjuague con clorhexidina durante 1 minuto y ubícalo en decúbito supino.
- 03

☐ Anestesia vestibular y palatina

Infiltra por vestibular y completa con una punción palatina. Empieza con un tubo y ten más a mano.
- 04

☐ Antisepsia y campo

Haz antisepsia de la piel perioral y arma el campo estéril con el instrumental en el orden en que lo vas a usar.
- 05

☐ Sindesmotomía completa

Separa la encía del cuello del diente con la sonda o el sindesmótomo, en todo el contorno.
- 06

☐ Luxa sosteniendo la tuberosidad

paso crítico

Luxa con el elevador mientras sostienes la tuberosidad con los dedos de la otra mano.
- 07

☐ Prehensión y avulsión

Toma el diente con el fórceps y extráelo con un movimiento controlado hacia vestibular y oclusal.
- 08

☐ Descarta comunicación al seno

paso que suele faltar

Antes de soltar al paciente, mira el fondo del alveolo con buena luz y descarta una comunicación con el seno maxilar.
- 09

☐ Alveolo, irrigación y hemostasia

Revisa el alveolo, irriga suave con suero fisiológico y logra la hemostasia con compresión.
- 10

☐ Indicaciones y analgesia

Da las indicaciones de palabra y por escrito, y receta analgesia. Sin antibiótico. → paciente sano, exodoncia simple, sin infección previa

NO TE LO SALTES

- 06 Terminaste cuando el diente tiene movilidad clara y los dedos que sostienen la tuberosidad no sienten que el hueso se mueva junto con el diente.
- 08 Terminaste cuando inspeccionaste el fondo del alveolo y, si hubo sospecha, estimaste el tamaño del defecto y avisaste al docente.

INSTRUMENTAL

- PREVIO
- ☐ Consentimiento informado de cirugía firmado
- ☐ Radiografía del diente a la vista
- ☐ Clorhexidina para enjuague y para piel perioral
- ANESTESIA
- ☐ Jeringa carpule y agujas cortas
- ☐ Lidocaína al 2 % con epinefrina 1:100.000, al menos 4 tubos disponibles
- CAMPO
- ☐ Campo estéril, gasas y aspiración quirúrgica
- ☐ Lámpara orientada al sector posterior
- EXODONCIA
- ☐ Sonda o sindesmótomo
- ☐ Elevador recto mediano
- ☐ Fórceps para molar superior
- ☐ Cureta de Lucas y lima de hueso
- ☐ Jeringa con suero fisiológico
- CIERRE
- ☐ Gasas para compresión
- ☐ Sutura por si hay que afrontar bordes
- ☐ Indicaciones escritas impresas