Ayudantías Metodos Cuantitativos II

Octubre/2026

Data wrangling


Mutate, summarise y group by

Quinta ayudantía

Metodología cuantitativa y proceso de investigación

Proceso de programación para el análisis de datos

Data wrangling:
Revisar y preparar nuestra base de datos para que podamos trabajar con ella de mejor forma



Data wrangling:
limpieza, selección y transformación de datos

Funciones:

table()

unique()

```
table(base_antropologia$ocupacion_madre)

Administrativo / Profesional
                           2
              Salud y cuidado
                           2
Trabajo doméstico / Inactiva
                           2
```

```
unique(base_antropologia$`preferencia_música_1`)

'Pop' · 'Indie rock, rock alternativo' · 'Hip hop, rap, boom-bap, freestyle' ·
```

names()

janitor::clean_names()

rename()

mutate()

recode()

b) Renombrar variables `rename()`

- Estructura del código:

```
base_de_datos <- base_de_datos %>%

  dplyr::rename(
    nombre_nuevo = nombre_original,

    nombre_nuevo = nombre_original,

    nombre_nuevo = nombre_original

  )
```

a) Limpiar nombres de variables

```
base_antropologia <- janitor::clean_names(base_antropologia)
#estandariza los nombres (mayúsculas a minúsculas, reemplaza espacios


names(base_antropologia)
```

Recodificar categorías con `recode`

```
base_antropologia <- base_antropologia %>%
  mutate(
    ocupacion_madre = recode(ocupacion_madre,
                             "reponedara_en_un_supermercado_" = "Servicios",
                             "docente_de_yoga" = "Servicios",
                             "reponedora" = "Servicios",
                             "paisajista,_esta_a_cargo_de_supervisar_y_dirigir_el_mantenimiento_
                             "tia_de_furgon,_transportar_ninos_de_basica\r\n" = "Servicios",
                             "duena_de_casa,_cuidados_del_hogar,,_repostera_" = "Servicios",
```

Proceso de programación para el análisis de datos

Visualización de datos: aquí es donde comenzamos a analizar datos e interpretarlos desde las tablas y gráficos



Análisis de datos en RStudio



Análisis de datos categóricos: datos cualitativos (no numéricos)

table()

freq()

ANÁLISIS UNIVARIADO

- **Distribución de frecuencias**
- **Tablas de frecuencia**
- **Frecuencia: Cuánto se repiten los datos**

ctable()

proptable()

ANÁLISIS BIVARIADO

- **Relación entre variables**
- **Tablas de contingencia**
- **Contingencia: Cuánto se relacionan las variables**

ANÁLISIS UNIVARIADO

- **Distribución de frecuencias**
- **Tablas de frecuencia**
- **Frecuencia: Cuánto se repiten los datos**

X_i	Frecuencia absoluta (n_i)	Frecuencia absoluta acumulada (N_i)	Frecuencia relativa (fi = ni/N)	Frecuencia relativa acumulada (Fi=Ni/N)
1	7	7	0,06	0,06
2	19	26	0,15	0,21
3	25	51	0,20	0,41
4	12	63	0,10	0,50
5	23	86	0,18	0,69
6	15	101	0,12	0,81
7	8	109	0,06	0,87
8	16	125	0,13	1,00
Total	125	125	1	1

Distribución de frecuencias de Relgión

Religion	Frecuencia	Porcentaje
Protestante	10846	50,71
Católica	5124	23,96
Ninguna	3523	16,47
Cristiana	689	3,22
Judía	388	1,81
Otra	224	1,05
Budismo	147	0,69
Inter o no confesional	109	0,51
Musulmana/Islam	104	0,49
Cristiana ortodoxa	95	0,44
Hinduismo	71	0,33
Otra religión oriental	32	0,15
Nativa americana	23	0,11
No sabe	15	0,07
Total	21390	100,00

ANÁLISIS BIVARIADO

- **Relación entre variables**
- **Tablas de contingencia**
- **Contingencia: Cómo se relacionan las variables**

Género \ Inclinación profesional	Lenguas Extranjeras	Licenciatura en Matemáticas	Enfermería	Total
Masculino (M)	7	15	5	27
Femenino (F)	8	5	10	23
Total	15	20	15	50

Tabla de contingencia para religión y clase social (% por columnas)

	Clase social baja	Clase social media	Clase social media - alta	Clase social media - baja	Sum
Creencia firme	1.02	2.04	0.68	1.70	5.44
Creencia moderada	1.02	2.72	0.68	3.06	7.48
Dudas ocasionales	0.68	6.80	1.36	3.74	12.59
Escéptico	0.00	5.10	2.04	4.08	11.22
No creencias	1.36	4.76	3.40	3.74	13.27





