

Dérivation - Exercice 1 : Nombre Dérivé

Dérivation - Exercice 1 : Nombre Dérivé

Déterminer les équations des tangentes aux courbes des fonctions suivantes :

Dérivation - Exercice 1 : Nombre Dérivé

Déterminer les équations des tangentes aux courbes des fonctions suivantes :

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Dérivation - Exercice 1 : Nombre Dérivé

Déterminer les équations des tangentes aux courbes des fonctions suivantes :

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Dérivation - Exercice 1 : Nombre Dérivé

Déterminer les équations des tangentes aux courbes des fonctions suivantes :

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Dérivation - Exercice 1 : Nombre Dérivé

Déterminer les équations des tangentes aux courbes des fonctions suivantes :

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Pour déterminer l'équation de la tangente d'une fonction, vous devez (pour le moment) :

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Pour déterminer l'équation de la tangente d'une fonction, vous devez (pour le moment) :

1. Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Pour déterminer l'équation de la tangente d'une fonction, vous devez (pour le moment) :

1. Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$
2. Calculer le nombre dérivé,

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Pour déterminer l'équation de la tangente d'une fonction, vous devez (pour le moment) :

1. Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$
2. Calculer le nombre dérivé, en calculant la limite du **taux d'accroissement** lorsque $h \rightarrow 0$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Pour déterminer l'équation de la tangente d'une fonction, vous devez (pour le moment) :

1. Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$
2. Calculer le nombre dérivé, en calculant la limite du **taux d'accroissement** lorsque $h \rightarrow 0$
3. Puis finalement, déterminer l'équation de la tangente

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Pour déterminer l'équation de la tangente d'une fonction, vous devez (pour le moment) :

1. Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$
2. Calculer le nombre dérivé, en calculant la limite du **taux d'accroissement** lorsque $h \rightarrow 0$
3. Puis finalement, déterminer l'équation de la tangente

1) Calculer le taux d'accroissement :

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Pour déterminer l'équation de la tangente d'une fonction, vous devez (pour le moment) :

1. Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$
2. Calculer le nombre dérivé, en calculant la limite du **taux d'accroissement** lorsque $h \rightarrow 0$
3. Puis finalement, déterminer l'équation de la tangente

1) Calculer le taux d'accroissement :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \text{ où } a = 2.$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Pour déterminer l'équation de la tangente d'une fonction, vous devez (pour le moment) :

1. Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$
2. Calculer le nombre dérivé, en calculant la limite du **taux d'accroissement** lorsque $h \rightarrow 0$
3. Puis finalement, déterminer l'équation de la tangente

1) Calculer le taux d'accroissement :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \text{ où } a = 2.$$

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 =$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

$$f(2 + h) =$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

$$f(2 + h) = 3 \times (2 + h)^3$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

$$f(2+h) = 3 \times (2+h)^3 = 3 \times (2+h)^2$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

$$f(2+h) = 3 \times (2+h)^3 = 3 \times (2+h)^2(2+h)$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

$$f(2+h) = 3 \times (2+h)^3 = 3 \times (2+h)^2(2+h)$$

$$f(2+h) =$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

$$f(2+h) = 3 \times (2+h)^3 = 3 \times (2+h)^2(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(2^2 +$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

$$f(2+h) = 3 \times (2+h)^3 = 3 \times (2+h)^2(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(2^2 + 2 \times 2 \times h +$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

$$f(2+h) = 3 \times (2+h)^3 = 3 \times (2+h)^2(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(2^2 + 2 \times 2 \times h + h^2)$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

$$f(2+h) = 3 \times (2+h)^3 = 3 \times (2+h)^2(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(2^2 + 2 \times 2 \times h + h^2)(2+h)$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

$$f(2+h) = 3 \times (2+h)^3 = 3 \times (2+h)^2(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(2^2 + 2 \times 2 \times h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) =$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

$$f(2+h) = 3 \times (2+h)^3 = 3 \times (2+h)^2(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(2^2 + 2 \times 2 \times h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(4 + 4h + h^2)(2+h)$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

$$f(2+h) = 3 \times (2+h)^3 = 3 \times (2+h)^2(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(2^2 + 2 \times 2 \times h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(4 + 4h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) =$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

$$f(2+h) = 3 \times (2+h)^3 = 3 \times (2+h)^2(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(2^2 + 2 \times 2 \times h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(4 + 4h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(8 + 4h + 8h + 4h^2 + 2h^2 + h^3)$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

$$f(2+h) = 3 \times (2+h)^3 = 3 \times (2+h)^2(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(2^2 + 2 \times 2 \times h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(4 + 4h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(8 + 4h + 8h + 4h^2 + 2h^2 + h^3)$$

$$f(2+h) =$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

$$f(2+h) = 3 \times (2+h)^3 = 3 \times (2+h)^2(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(2^2 + 2 \times 2 \times h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(4 + 4h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(8 + 4h + 8h + 4h^2 + 2h^2 + h^3)$$

$$f(2+h) = 3(h^3 + 6h^2 + 12h + 8)$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

$$f(2+h) = 3 \times (2+h)^3 = 3 \times (2+h)^2(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(2^2 + 2 \times 2 \times h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(4 + 4h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(8 + 4h + 8h + 4h^2 + 2h^2 + h^3)$$

$$f(2+h) = 3(h^3 + 6h^2 + 12h + 8)$$

$$f(2+h) = 3h^3 + 18h^2 + 36h + 24$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

$$f(2+h) = 3 \times (2+h)^3 = 3 \times (2+h)^2(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(2^2 + 2 \times 2 \times h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(4 + 4h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(8 + 4h + 8h + 4h^2 + 2h^2 + h^3)$$

$$f(2+h) = 3(h^3 + 6h^2 + 12h + 8)$$

$$f(2+h) = 3h^3 + 18h^2 + 36h + 24$$

Ce qui nous donne :

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

$$f(2+h) = 3 \times (2+h)^3 = 3 \times (2+h)^2(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(2^2 + 2 \times 2 \times h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(4 + 4h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(8 + 4h + 8h + 4h^2 + 2h^2 + h^3)$$

$$f(2+h) = 3(h^3 + 6h^2 + 12h + 8)$$

$$f(2+h) = 3h^3 + 18h^2 + 36h + 24$$

Ce qui nous donne :

$$f(2+h) - f(2) =$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

$$f(2+h) = 3 \times (2+h)^3 = 3 \times (2+h)^2(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(2^2 + 2 \times 2 \times h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(4 + 4h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(8 + 4h + 8h + 4h^2 + 2h^2 + h^3)$$

$$f(2+h) = 3(h^3 + 6h^2 + 12h + 8)$$

$$f(2+h) = 3h^3 + 18h^2 + 36h + 24$$

Ce qui nous donne :

$$f(2+h) - f(2) = 3h^3 + 18h^2 + 36h + 24$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

$$f(2+h) = 3 \times (2+h)^3 = 3 \times (2+h)^2(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(2^2 + 2 \times 2 \times h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(4 + 4h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(8 + 4h + 8h + 4h^2 + 2h^2 + h^3)$$

$$f(2+h) = 3(h^3 + 6h^2 + 12h + 8)$$

$$f(2+h) = 3h^3 + 18h^2 + 36h + 24$$

Ce qui nous donne :

$$f(2+h) - f(2) = 3h^3 + 18h^2 + 36h + 24 - 24$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

$$f(2+h) = 3 \times (2+h)^3 = 3 \times (2+h)^2(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(2^2 + 2 \times 2 \times h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(4 + 4h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(8 + 4h + 8h + 4h^2 + 2h^2 + h^3)$$

$$f(2+h) = 3(h^3 + 6h^2 + 12h + 8)$$

$$f(2+h) = 3h^3 + 18h^2 + 36h + 24$$

Ce qui nous donne :

$$f(2+h) - f(2) = 3h^3 + 18h^2 + 36h + 24 - 24$$

$$f(2+h) - f(2) =$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

$$f(2+h) = 3 \times (2+h)^3 = 3 \times (2+h)^2(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(2^2 + 2 \times 2 \times h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(4 + 4h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(8 + 4h + 8h + 4h^2 + 2h^2 + h^3)$$

$$f(2+h) = 3(h^3 + 6h^2 + 12h + 8)$$

$$f(2+h) = 3h^3 + 18h^2 + 36h + 24$$

Ce qui nous donne :

$$f(2+h) - f(2) = 3h^3 + 18h^2 + 36h + 24 - 24$$

$$f(2+h) - f(2) = 3h^3 + 18h^2 + 36h$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

$$f(2+h) = 3 \times (2+h)^3 = 3 \times (2+h)^2(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(2^2 + 2 \times 2 \times h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(4 + 4h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(8 + 4h + 8h + 4h^2 + 2h^2 + h^3)$$

$$f(2+h) = 3(h^3 + 6h^2 + 12h + 8)$$

$$f(2+h) = 3h^3 + 18h^2 + 36h + 24$$

Ce qui nous donne :

$$f(2+h) - f(2) = 3h^3 + 18h^2 + 36h + 24 - 24$$

$$f(2+h) - f(2) = 3h^3 + 18h^2 + 36h$$

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} =$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

$$f(2+h) = 3 \times (2+h)^3 = 3 \times (2+h)^2(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(2^2 + 2 \times 2 \times h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(4 + 4h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(8 + 4h + 8h + 4h^2 + 2h^2 + h^3)$$

$$f(2+h) = 3(h^3 + 6h^2 + 12h + 8)$$

$$f(2+h) = 3h^3 + 18h^2 + 36h + 24$$

Ce qui nous donne :

$$f(2+h) - f(2) = 3h^3 + 18h^2 + 36h + 24 - 24$$

$$f(2+h) - f(2) = 3h^3 + 18h^2 + 36h$$

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{3h^3 + 18h^2 + 36h}{h} =$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

$$f(2+h) = 3 \times (2+h)^3 = 3 \times (2+h)^2(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(2^2 + 2 \times 2 \times h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(4 + 4h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(8 + 4h + 8h + 4h^2 + 2h^2 + h^3)$$

$$f(2+h) = 3(h^3 + 6h^2 + 12h + 8)$$

$$f(2+h) = 3h^3 + 18h^2 + 36h + 24$$

Ce qui nous donne :

$$f(2+h) - f(2) = 3h^3 + 18h^2 + 36h + 24 - 24$$

$$f(2+h) - f(2) = 3h^3 + 18h^2 + 36h$$

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{3h^3 + 18h^2 + 36h}{h} = \frac{h(3h^2 + 18h + 36)}{h}$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

$$f(2) = 3 \times 2^3 = 24$$

$$f(2+h) = 3 \times (2+h)^3 = 3 \times (2+h)^2(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(2^2 + 2 \times 2 \times h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(4 + 4h + h^2)(2+h)$$

$$f(2+h) = 3(8 + 4h + 8h + 4h^2 + 2h^2 + h^3)$$

$$f(2+h) = 3(h^3 + 6h^2 + 12h + 8)$$

$$f(2+h) = 3h^3 + 18h^2 + 36h + 24$$

Ce qui nous donne :

$$f(2+h) - f(2) = 3h^3 + 18h^2 + 36h + 24 - 24$$

$$f(2+h) - f(2) = 3h^3 + 18h^2 + 36h$$

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{3h^3 + 18h^2 + 36h}{h} = \frac{h(3h^2 + 18h + 36)}{h}$$

$$= 3h^2 + 18h + 36$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Le taux d'accroissement de la fonction f entre 2 et $2+h$ est égal à

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Le taux d'accroissement de la fonction f entre 2 et $2+h$ est égal à $3h^2 + 18h + 36$.

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Le taux d'accroissement de la fonction f entre 2 et $2+h$ est égal à $3h^2 + 18h + 36$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de f

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Le taux d'accroissement de la fonction f entre 2 et $2+h$ est égal à $3h^2 + 18h + 36$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de f en 2 : $f'(2)$.

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Le taux d'accroissement de la fonction f entre 2 et $2+h$ est égal à $3h^2 + 18h + 36$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de f en 2 : $f'(2)$.

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Le taux d'accroissement de la fonction f entre 2 et $2+h$ est égal à $3h^2 + 18h + 36$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de f en 2 : $f'(2)$.

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Le taux d'accroissement de la fonction f entre 2 et $2+h$ est égal à $3h^2 + 18h + 36$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de f en 2 : $f'(2)$.

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} (3h^2 + 18h + 36)$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Le taux d'accroissement de la fonction f entre 2 et $2+h$ est égal à $3h^2 + 18h + 36$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de f en 2 : $f'(2)$.

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} (3h^2 + 18h + 36)$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Le taux d'accroissement de la fonction f entre 2 et $2+h$ est égal à $3h^2 + 18h + 36$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de f en 2 : $f'(2)$.

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} (3h^2 + 18h + 36) = 36$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Le taux d'accroissement de la fonction f entre 2 et $2+h$ est égal à $3h^2 + 18h + 36$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de f en 2 : $f'(2)$.

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} (3h^2 + 18h + 36) = 36$$

Equation de la tangente T en a :

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Le taux d'accroissement de la fonction f entre 2 et $2+h$ est égal à $3h^2 + 18h + 36$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de f en 2 : $f'(2)$.

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} (3h^2 + 18h + 36) = 36$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Le taux d'accroissement de la fonction f entre 2 et $2+h$ est égal à $3h^2 + 18h + 36$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de f en 2 : $f'(2)$.

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} (3h^2 + 18h + 36) = 36$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$y =$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Le taux d'accroissement de la fonction f entre 2 et $2+h$ est égal à $3h^2 + 18h + 36$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de f en 2 : $f'(2)$.

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} (3h^2 + 18h + 36) = 36$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$y = f'(2)$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Le taux d'accroissement de la fonction f entre 2 et $2+h$ est égal à $3h^2 + 18h + 36$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de f en 2 : $f'(2)$.

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} (3h^2 + 18h + 36) = 36$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$y = f'(2)(x - 2) +$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Le taux d'accroissement de la fonction f entre 2 et $2+h$ est égal à $3h^2 + 18h + 36$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de f en 2 : $f'(2)$.

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} (3h^2 + 18h + 36) = 36$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$y = f'(2)(x - 2) + f(2) =$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Le taux d'accroissement de la fonction f entre 2 et $2+h$ est égal à $3h^2 + 18h + 36$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de f en 2 : $f'(2)$.

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} (3h^2 + 18h + 36) = 36$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$y = f'(2)(x - 2) + f(2) = 36(x - 2) + 24 =$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Le taux d'accroissement de la fonction f entre 2 et $2+h$ est égal à $3h^2 + 18h + 36$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de f en 2 : $f'(2)$.

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} (3h^2 + 18h + 36) = 36$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$y = f'(2)(x - 2) + f(2) = 36(x - 2) + 24 = 36x - 48$$

a) $f(x) = 3x^3$ au point d'abscisse 2

Le taux d'accroissement de la fonction f entre 2 et $2+h$ est égal à $3h^2 + 18h + 36$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de f en 2 : $f'(2)$.

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} (3h^2 + 18h + 36) = 36$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$y = f'(2)(x - 2) + f(2) = 36(x - 2) + 24 = 36x - 48$$

$$y = 36x - 48$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$.

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=4$.

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=4$. On cherche à calculer $\frac{g(4+h) - g(4)}{h}$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=4$. On cherche à calculer $\frac{g(4+h) - g(4)}{h}$

$$g(4) =$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=4$. On cherche à calculer $\frac{g(4+h) - g(4)}{h}$

$$g(4) = \sqrt{4+1} =$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=4$. On cherche à calculer $\frac{g(4+h) - g(4)}{h}$

$$g(4) = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=4$. On cherche à calculer $\frac{g(4+h) - g(4)}{h}$

$$g(4) = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$$

$$g(4+h) =$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=4$. On cherche à calculer $\frac{g(4+h) - g(4)}{h}$

$$g(4) = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$$

$$g(4+h) = \sqrt{4+h+1} =$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=4$. On cherche à calculer $\frac{g(4+h) - g(4)}{h}$

$$g(4) = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$$

$$g(4+h) = \sqrt{4+h+1} = \sqrt{5+h}$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=4$. On cherche à calculer $\frac{g(4+h) - g(4)}{h}$

$$g(4) = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$$

$$g(4+h) = \sqrt{4+h+1} = \sqrt{5+h}$$

$$g(4+h) - g(4) =$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=4$. On cherche à calculer $\frac{g(4+h) - g(4)}{h}$

$$g(4) = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$$

$$g(4+h) = \sqrt{4+h+1} = \sqrt{5+h}$$

$$g(4+h) - g(4) = \sqrt{5+h} - \sqrt{5}$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=4$. On cherche à calculer $\frac{g(4+h) - g(4)}{h}$

$$g(4) = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$$

$$g(4+h) = \sqrt{4+h+1} = \sqrt{5+h}$$

$$g(4+h) - g(4) = \sqrt{5+h} - \sqrt{5}$$

$$\frac{g(4+h) - g(4)}{h} =$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=4$. On cherche à calculer $\frac{g(4+h) - g(4)}{h}$

$$g(4) = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$$

$$g(4+h) = \sqrt{4+h+1} = \sqrt{5+h}$$

$$g(4+h) - g(4) = \sqrt{5+h} - \sqrt{5}$$

$$\frac{g(4+h) - g(4)}{h} = \frac{\sqrt{5+h} - \sqrt{5}}{h}$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=4$. On cherche à calculer $\frac{g(4+h) - g(4)}{h}$

$$g(4) = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$$

$$g(4+h) = \sqrt{4+h+1} = \sqrt{5+h}$$

$$g(4+h) - g(4) = \sqrt{5+h} - \sqrt{5}$$

$$\frac{g(4+h) - g(4)}{h} = \frac{\sqrt{5+h} - \sqrt{5}}{h}$$

L'astuce ici consiste à multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=4$. On cherche à calculer $\frac{g(4+h) - g(4)}{h}$

$$g(4) = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$$

$$g(4+h) = \sqrt{4+h+1} = \sqrt{5+h}$$

$$g(4+h) - g(4) = \sqrt{5+h} - \sqrt{5}$$

$$\frac{g(4+h) - g(4)}{h} = \frac{\sqrt{5+h} - \sqrt{5}}{h}$$

L'astuce ici consiste à multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée

L'expression conjuguée de $a+b$ est

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=4$. On cherche à calculer $\frac{g(4+h) - g(4)}{h}$

$$g(4) = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$$

$$g(4+h) = \sqrt{4+h+1} = \sqrt{5+h}$$

$$g(4+h) - g(4) = \sqrt{5+h} - \sqrt{5}$$

$$\frac{g(4+h) - g(4)}{h} = \frac{\sqrt{5+h} - \sqrt{5}}{h}$$

L'astuce ici consiste à multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée

L'expression conjuguée de $a+b$ est $a-b$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=4$. On cherche à calculer $\frac{g(4+h) - g(4)}{h}$

$$g(4) = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$$

$$g(4+h) = \sqrt{4+h+1} = \sqrt{5+h}$$

$$g(4+h) - g(4) = \sqrt{5+h} - \sqrt{5}$$

$$\frac{g(4+h) - g(4)}{h} = \frac{\sqrt{5+h} - \sqrt{5}}{h}$$

L'astuce ici consiste à multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée

L'expression conjuguée de $a+b$ est $a-b$

Donc l'expression conjuguée de $\sqrt{5+h} - \sqrt{5}$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=4$. On cherche à calculer $\frac{g(4+h) - g(4)}{h}$

$$g(4) = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$$

$$g(4+h) = \sqrt{4+h+1} = \sqrt{5+h}$$

$$g(4+h) - g(4) = \sqrt{5+h} - \sqrt{5}$$

$$\frac{g(4+h) - g(4)}{h} = \frac{\sqrt{5+h} - \sqrt{5}}{h}$$

L'astuce ici consiste à multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée

L'expression conjuguée de $a+b$ est $a-b$

Donc l'expression conjuguée de $\sqrt{5+h} - \sqrt{5}$ est $\sqrt{5+h} + \sqrt{5}$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=4$. On cherche à calculer $\frac{g(4+h) - g(4)}{h}$

$$g(4) = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$$

$$g(4+h) = \sqrt{4+h+1} = \sqrt{5+h}$$

$$g(4+h) - g(4) = \sqrt{5+h} - \sqrt{5}$$

$$\frac{g(4+h) - g(4)}{h} = \frac{\sqrt{5+h} - \sqrt{5}}{h}$$

L'astuce ici consiste à multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée

L'expression conjuguée de $a+b$ est $a-b$

Donc l'expression conjuguée de $\sqrt{5+h} - \sqrt{5}$ est $\sqrt{5+h} + \sqrt{5}$

$$\frac{(\sqrt{5+h} - \sqrt{5})(\sqrt{5+h} + \sqrt{5})}{h(\sqrt{5+h} + \sqrt{5})}$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

$$\frac{(\sqrt{5+h} - \sqrt{5}) \times (\sqrt{5+h} + \sqrt{5})}{h(\sqrt{5+h} + \sqrt{5})}$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

$$\frac{(\sqrt{5+h} - \sqrt{5}) \times (\sqrt{5+h} + \sqrt{5})}{h(\sqrt{5+h} + \sqrt{5})}$$

$$\frac{(5+h) + \sqrt{5+h}\sqrt{5} - \sqrt{5}\sqrt{5+h} - 5}{h(\sqrt{5+h} + \sqrt{5})}$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

$$\frac{(\sqrt{5+h} - \sqrt{5}) \times (\sqrt{5+h} + \sqrt{5})}{h(\sqrt{5+h} + \sqrt{5})}$$

$$\frac{(5+h) + \sqrt{5+h}\sqrt{5} - \sqrt{5}\sqrt{5+h} - 5}{h(\sqrt{5+h} + \sqrt{5})}$$

$$\frac{5+h-5}{h(\sqrt{5+h} + \sqrt{5})}$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

$$\frac{(\sqrt{5+h} - \sqrt{5}) \times (\sqrt{5+h} + \sqrt{5})}{h(\sqrt{5+h} + \sqrt{5})}$$

$$\frac{(5+h) + \sqrt{5+h}\sqrt{5} - \sqrt{5}\sqrt{5+h} - 5}{h(\sqrt{5+h} + \sqrt{5})}$$

$$\frac{5+h-5}{h(\sqrt{5+h} + \sqrt{5})}$$

$$\frac{h}{h(\sqrt{5+h} + \sqrt{5})}$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

$$\frac{(\sqrt{5+h}-\sqrt{5}) \times (\sqrt{5+h}+\sqrt{5})}{h(\sqrt{5+h}+\sqrt{5})}$$

$$\frac{(5+h) + \sqrt{5+h}\sqrt{5} - \sqrt{5}\sqrt{5+h} - 5}{h(\sqrt{5+h}+\sqrt{5})}$$

$$\frac{5+h-5}{h(\sqrt{5+h}+\sqrt{5})}$$

$$\frac{h}{h(\sqrt{5+h}+\sqrt{5})}$$

$$\frac{1}{\sqrt{5+h}+\sqrt{5}}$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Le taux d'accroissement de la fonction g entre 4 et $4+h$ est égal à

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Le taux d'accroissement de la fonction g entre 4 et $4+h$ est égal à

$$\frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}}.$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Le taux d'accroissement de la fonction g entre 4 et $4+h$ est égal à $\frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}}$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de g en 4 : $g'(4)$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Le taux d'accroissement de la fonction g entre 4 et $4+h$ est égal à $\frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}}$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de g en 4 : $g'(4)$

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Le taux d'accroissement de la fonction g entre 4 et $4+h$ est égal à $\frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}}$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de g en 4 : $g'(4)$

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

$$g'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h}$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Le taux d'accroissement de la fonction g entre 4 et $4+h$ est égal à $\frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}}$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de g en 4 : $g'(4)$

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

$$g'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h}$$

$$g'(4) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}} =$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Le taux d'accroissement de la fonction g entre 4 et $4+h$ est égal à $\frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}}$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de g en 4 : $g'(4)$

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

$$g'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h}$$

$$g'(4) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}} =$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Le taux d'accroissement de la fonction g entre 4 et $4+h$ est égal à $\frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}}$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de g en 4 : $g'(4)$

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

$$g'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h}$$

$$g'(4) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{5}} =$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Le taux d'accroissement de la fonction g entre 4 et $4+h$ est égal à $\frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}}$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de g en 4 : $g'(4)$

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

$$g'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h}$$

$$g'(4) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{5}} = \frac{1}{2\sqrt{5}}$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Le taux d'accroissement de la fonction g entre 4 et $4+h$ est égal à $\frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}}$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de g en 4 : $g'(4)$

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

$$g'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h}$$

$$g'(4) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{5}} = \frac{1}{2\sqrt{5}}$$

Equation de la tangente T en a :

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Le taux d'accroissement de la fonction g entre 4 et $4+h$ est égal à $\frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}}$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de g en 4 : $g'(4)$

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

$$g'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h}$$

$$g'(4) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{5}} = \frac{1}{2\sqrt{5}}$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Le taux d'accroissement de la fonction g entre 4 et $4+h$ est égal à $\frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}}$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de g en 4 : $g'(4)$

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

$$g'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h}$$

$$g'(4) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{5}} = \frac{1}{2\sqrt{5}}$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$y = g'(4)(x - 4) + g(4) =$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Le taux d'accroissement de la fonction g entre 4 et $4+h$ est égal à $\frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}}$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de g en 4 : $g'(4)$

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

$$g'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h}$$

$$g'(4) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{5}} = \frac{1}{2\sqrt{5}}$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$y = g'(4)(x - 4) + g(4) =$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Le taux d'accroissement de la fonction g entre 4 et $4+h$ est égal à $\frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}}$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de g en 4 : $g'(4)$

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

$$g'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h}$$

$$g'(4) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{5}} = \frac{1}{2\sqrt{5}}$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$y = g'(4)(x - 4) + g(4) = \frac{1}{2\sqrt{5}}(x - 4) + \sqrt{5} =$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Le taux d'accroissement de la fonction g entre 4 et $4+h$ est égal à $\frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}}$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de g en 4 : $g'(4)$

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

$$g'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h}$$

$$g'(4) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{5}} = \frac{1}{2\sqrt{5}}$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$y = g'(4)(x - 4) + g(4) = \frac{1}{2\sqrt{5}}(x - 4) + \sqrt{5} = \frac{1}{2\sqrt{5}}x + \frac{-4}{2\sqrt{5}} + \sqrt{5}$$

b) $g(x) = \sqrt{x+1}$ au point d'abscisse 4

Le taux d'accroissement de la fonction g entre 4 et $4+h$ est égal à $\frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}}$. On peut facilement en déduire le nombre dérivé de g en 4 : $g'(4)$

Rappel de la formule de la dérivée d'une fonction en a :

$$g'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h}$$

$$g'(4) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{5}} = \frac{1}{2\sqrt{5}}$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$y = g'(4)(x - 4) + g(4) = \frac{1}{2\sqrt{5}}(x - 4) + \sqrt{5} = \frac{1}{2\sqrt{5}}x + \frac{-4}{2\sqrt{5}} + \sqrt{5}$$

$$y = \frac{1}{2\sqrt{5}}x + \frac{6}{2\sqrt{5}} = \frac{1}{2\sqrt{5}}(x + 6)$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$.

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=3$.

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=3$. On cherche à calculer $\frac{i(3+h) - i(3)}{h}$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=3$. On cherche à calculer $\frac{i(3+h) - i(3)}{h}$

$$i(3) = \frac{1}{3}.$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=3$. On cherche à calculer $\frac{i(3+h) - i(3)}{h}$

$$i(3) = \frac{1}{3}.$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=3$. On cherche à calculer $\frac{i(3+h) - i(3)}{h}$

$$i(3) = \frac{1}{3} \cdot i(3+h) = \frac{1}{3+h}$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=3$. On cherche à calculer $\frac{i(3+h) - i(3)}{h}$

$$i(3) = \frac{1}{3} \cdot i(3+h) = \frac{1}{3+h}$$

$$\frac{i(3+h) - i(3)}{h} =$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=3$. On cherche à calculer $\frac{i(3+h) - i(3)}{h}$

$$i(3) = \frac{1}{3} \cdot i(3+h) = \frac{1}{3+h}$$

$$\frac{i(3+h) - i(3)}{h} =$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=3$. On cherche à calculer $\frac{i(3+h) - i(3)}{h}$

$$i(3) = \frac{1}{3} \cdot i(3+h) = \frac{1}{3+h}$$

$$\frac{i(3+h) - i(3)}{h} = \frac{\frac{1}{3+h} - \frac{1}{3}}{h} =$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et a+h. Où a=3. On cherche à calculer $\frac{i(3+h) - i(3)}{h}$

$$i(3) = \frac{1}{3} \cdot i(3+h) = \frac{1}{3+h}$$

$$\frac{i(3+h) - i(3)}{h} = \frac{\frac{1}{3+h} - \frac{1}{3}}{h} = \frac{\frac{1}{3+h} - \frac{1(1 + \frac{h}{3})}{3(1 + \frac{h}{3})}}{h}$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et a+h. Où a=3. On cherche à calculer $\frac{i(3+h) - i(3)}{h}$

$$i(3) = \frac{1}{3} \cdot i(3+h) = \frac{1}{3+h}$$

$$\frac{i(3+h) - i(3)}{h} = \frac{\frac{1}{3+h} - \frac{1}{3}}{h} = \frac{\frac{1}{3+h} - \frac{1(1 + \frac{h}{3})}{3(1 + \frac{h}{3})}}{h}$$

$$= \frac{\frac{1}{3+h} - \frac{1 + \frac{h}{3}}{3+h}}{h} =$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et a+h. Où a=3. On cherche à calculer $\frac{i(3+h) - i(3)}{h}$

$$i(3) = \frac{1}{3} \cdot i(3+h) = \frac{1}{3+h}$$

$$\frac{i(3+h) - i(3)}{h} = \frac{\frac{1}{3+h} - \frac{1}{3}}{h} = \frac{\frac{1}{3+h} - \frac{1(1 + \frac{h}{3})}{3(1 + \frac{h}{3})}}{h}$$

$$= \frac{\frac{1}{3+h} - \frac{1 + \frac{h}{3}}{3+h}}{h} =$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et a+h. Où a=3. On cherche à calculer $\frac{i(3+h) - i(3)}{h}$

$$i(3) = \frac{1}{3} \cdot i(3+h) = \frac{1}{3+h}$$

$$\frac{i(3+h) - i(3)}{h} = \frac{\frac{1}{3+h} - \frac{1}{3}}{h} = \frac{\frac{1}{3+h} - \frac{1(1 + \frac{h}{3})}{3(1 + \frac{h}{3})}}{h}$$

$$= \frac{\frac{1}{3+h} - \frac{1 + \frac{h}{3}}{3+h}}{h} = \frac{1 - 1 - \frac{h}{3}}{3+h} = \frac{-\frac{h}{3}}{3+h}$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

$$= \frac{1 - 1 - \frac{h}{3}}{\frac{3+h}{h}}$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

$$= \frac{1 - 1 - \frac{h}{3}}{\frac{3 + h}{h}}$$

$$= \frac{-\left(\frac{h}{3}\right)}{\frac{3+h}{h}}$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

$$= \frac{1 - 1 - \frac{h}{3}}{\frac{3+h}{h}}$$

$$= \frac{-\left(\frac{h}{3}\right)}{\frac{3+h}{h}}$$

$$= \frac{\left(\frac{-1}{3}\right)h}{3+h} \times$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

$$= \frac{1 - 1 - \frac{h}{3}}{\frac{3+h}{h}}$$

$$= \frac{-\left(\frac{h}{3}\right)}{\frac{3+h}{h}}$$

$$= \frac{\left(\frac{-1}{3}\right)h}{3+h} \times$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

$$= \frac{1 - 1 - \frac{h}{3}}{\frac{3+h}{h}}$$

$$= \frac{-\left(\frac{h}{3}\right)}{\frac{3+h}{h}}$$

$$= \frac{\left(-\frac{1}{3}\right)h}{3+h} \times \frac{1}{h}$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

$$= \frac{1 - 1 - \frac{h}{3}}{\frac{3+h}{h}}$$

$$= \frac{-\left(\frac{h}{3}\right)}{\frac{3+h}{h}}$$

$$= \frac{\left(-\frac{1}{3}\right)h}{3+h} \times \frac{1}{h}$$

$$= \frac{-1}{3+h}$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Le taux d'accroissement de la fonction i entre 3 et $3+h$ est égal à

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Le taux d'accroissement de la fonction i entre 3 et $3+h$ est égal à

$$\frac{-1}{3(3+h)}$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Le taux d'accroissement de la fonction i entre 3 et $3+h$ est égal à $\frac{-1}{3+h}$. On peut facilement en déduire la valeur de $i'(3)$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Le taux d'accroissement de la fonction i entre 3 et $3+h$ est égal à $\frac{-1}{3+h}$. On peut facilement en déduire la valeur de $i'(3)$

$$i'(3) =$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Le taux d'accroissement de la fonction i entre 3 et $3+h$ est égal à $\frac{-1}{3+h}$. On peut facilement en déduire la valeur de $i'(3)$

$$i'(3) =$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Le taux d'accroissement de la fonction i entre 3 et $3+h$ est égal à

$\frac{-1}{3+h}$. On peut facilement en déduire la valeur de $i'(3)$

$$i'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{3+h} =$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Le taux d'accroissement de la fonction i entre 3 et $3+h$ est égal à $\frac{-1}{3+h}$. On peut facilement en déduire la valeur de $i'(3)$

$$i'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{-1}{3+h}}{\frac{-1}{3}} = \frac{-1}{3} =$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Le taux d'accroissement de la fonction i entre 3 et $3+h$ est égal à

$\frac{-1}{3+h}$. On peut facilement en déduire la valeur de $i'(3)$

$$i'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{-1}{3+h}}{\frac{3}{3+h}} = \frac{-1}{3} = \frac{-1}{3} = \frac{-1}{3} =$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Le taux d'accroissement de la fonction i entre 3 et $3+h$ est égal à $\frac{-1}{3+h}$. On peut facilement en déduire la valeur de $i'(3)$

$$i'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{-1}{3+h}}{\frac{3}{3+h}} = \frac{-1}{3} = \frac{-1}{\frac{3}{1}} = \frac{-1}{3} \times \frac{1}{3} =$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Le taux d'accroissement de la fonction i entre 3 et $3+h$ est égal à

$\frac{-1}{3+h}$. On peut facilement en déduire la valeur de $i'(3)$

$$i'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{-1}{3+h}}{\frac{3}{3+h}} = \frac{-1}{3} = \frac{-1}{\frac{3}{1}} = \frac{-1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{-1}{9}$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Le taux d'accroissement de la fonction i entre 3 et $3+h$ est égal à

$\frac{-1}{3+h}$. On peut facilement en déduire la valeur de $i'(3)$

$$i'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{-1}{3+h} - \frac{-1}{3}}{h} = \frac{-1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{-1}{9}$$

Equation de la tangente T en a :

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Le taux d'accroissement de la fonction i entre 3 et $3+h$ est égal à

$\frac{-1}{3+h}$. On peut facilement en déduire la valeur de $i'(3)$

$$i'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{-1}{3+h} - \frac{-1}{3}}{h} = \frac{-1}{3} = \frac{-1}{3} \times \frac{1}{1} = \frac{-1}{3}$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Le taux d'accroissement de la fonction i entre 3 et $3+h$ est égal à

$$\frac{-1}{3+h}$$

. On peut facilement en déduire la valeur de $i'(3)$

$$i'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{-1}{3+h} - \frac{-1}{3}}{h} = \frac{-1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{-1}{9}$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$y = i'(3)(x-3) + i(3) =$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Le taux d'accroissement de la fonction i entre 3 et $3+h$ est égal à

$$\frac{-1}{3+h}$$

. On peut facilement en déduire la valeur de $i'(3)$

$$i'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{-1}{3+h} - \frac{-1}{3}}{h} = \frac{-1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{-1}{9}$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$y = i'(3)(x-3) + i(3) =$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Le taux d'accroissement de la fonction i entre 3 et $3+h$ est égal à

$\frac{-1}{3+h}$. On peut facilement en déduire la valeur de $i'(3)$

$$i'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{-1}{3+h} - \frac{-1}{3}}{h} = \frac{-1}{3} = \frac{-1}{\frac{1}{1}} = \frac{-1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{-1}{9}$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$y = i'(3)(x-3) + i(3) = \frac{-1}{9}(x-3) + \frac{1}{3} =$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Le taux d'accroissement de la fonction i entre 3 et $3+h$ est égal à

$\frac{-1}{3+h}$. On peut facilement en déduire la valeur de $i'(3)$

$$i'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{-1}{3+h} - \frac{-1}{3}}{h} = \frac{-1}{3} = \frac{-1}{3} \times \frac{1}{1} = \frac{-1}{3}$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$y = i'(3)(x-3) + i(3) = \frac{-1}{3}(x-3) + \frac{1}{3} = \frac{-1}{3}x + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} =$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Le taux d'accroissement de la fonction i entre 3 et $3+h$ est égal à $\frac{-1}{3+h}$. On peut facilement en déduire la valeur de $i'(3)$

$$i'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{-1}{3+h} - \frac{-1}{3}}{h} = \frac{-1}{3} = \frac{-1}{3} \times \frac{1}{1} = \frac{-1}{3}$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$y = i'(3)(x-3) + i(3) = \frac{-1}{3}(x-3) + \frac{1}{3} = \frac{-1}{3}x + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{-1}{3}x + \frac{2}{3}$$

c) $i(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 3

Le taux d'accroissement de la fonction i entre 3 et $3+h$ est égal à

$\frac{-1}{3}$
 $\frac{3}{3+h}$. On peut facilement en déduire la valeur de $i'(3)$

$$i'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{-1}{3+h} - \frac{-1}{3}}{h} = \frac{-1}{3} = \frac{-1}{\frac{3}{1}} = \frac{-1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{-1}{9}$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$y = i'(3)(x-3) + i(3) = \frac{-1}{9}(x-3) + \frac{1}{3} = \frac{-1}{9}x + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{-1}{9}x + \frac{2}{3}$$

$$y = \frac{-1}{9}x + \frac{2}{3}$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$.

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=-2$.

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=-2$. On cherche à calculer $\frac{j(-2+h) - j(-2)}{h}$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=-2$. On cherche à calculer $\frac{j(-2+h) - j(-2)}{h}$

$$j(-2) =$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=-2$. On cherche à calculer $\frac{j(-2+h) - j(-2)}{h}$

$$j(-2) = (-2)^2 - 5 \times (-2) + 7 =$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et $a+h$. Où $a=-2$. On cherche à calculer $\frac{j(-2+h) - j(-2)}{h}$

$$j(-2) = (-2)^2 - 5 \times (-2) + 7 = 4 + 10 + 7 = 21$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et a+h. Où a=-2. On cherche à calculer $\frac{j(-2+h) - j(-2)}{h}$

$$j(-2) = (-2)^2 - 5 \times (-2) + 7 = 4 + 10 + 7 = 21$$

$$j(-2+h) =$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et a+h. Où a=-2. On cherche à calculer $\frac{j(-2+h) - j(-2)}{h}$

$$j(-2) = (-2)^2 - 5 \times (-2) + 7 = 4 + 10 + 7 = 21$$

$$j(-2+h) = (-2+h)^2 - 5(-2+h) + 7$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et a+h. Où a=-2. On cherche à calculer $\frac{j(-2+h) - j(-2)}{h}$

$$j(-2) = (-2)^2 - 5 \times (-2) + 7 = 4 + 10 + 7 = 21$$

$$j(-2+h) = (-2+h)^2 - 5(-2+h) + 7$$

$$j(-2+h) =$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et a+h. Où a=-2. On cherche à calculer $\frac{j(-2+h) - j(-2)}{h}$

$$j(-2) = (-2)^2 - 5 \times (-2) + 7 = 4 + 10 + 7 = 21$$

$$j(-2+h) = (-2+h)^2 - 5(-2+h) + 7$$

$$j(-2+h) = ((-2)^2 + 2 \times (-2) \times h + h^2) +$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et a+h. Où a=-2. On cherche à calculer $\frac{j(-2+h) - j(-2)}{h}$

$$j(-2) = (-2)^2 - 5 \times (-2) + 7 = 4 + 10 + 7 = 21$$

$$j(-2+h) = (-2+h)^2 - 5(-2+h) + 7$$

$$j(-2+h) = ((-2)^2 + 2 \times (-2) \times h + h^2) + 10 - 5h + 7$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et a+h. Où a=-2. On cherche à calculer $\frac{j(-2+h) - j(-2)}{h}$

$$j(-2) = (-2)^2 - 5 \times (-2) + 7 = 4 + 10 + 7 = 21$$

$$j(-2+h) = (-2+h)^2 - 5(-2+h) + 7$$

$$j(-2+h) = ((-2)^2 + 2 \times (-2) \times h + h^2) + 10 - 5h + 7$$

$$j(-2+h) =$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et a+h. Où a=-2. On cherche à calculer $\frac{j(-2+h) - j(-2)}{h}$

$$j(-2) = (-2)^2 - 5 \times (-2) + 7 = 4 + 10 + 7 = 21$$

$$j(-2+h) = (-2+h)^2 - 5(-2+h) + 7$$

$$j(-2+h) = ((-2)^2 + 2 \times (-2) \times h + h^2) + 10 - 5h + 7$$

$$j(-2+h) = 4 - 4h + h^2 + 10 - 5h + 7$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et a+h. Où a=-2. On cherche à calculer $\frac{j(-2+h) - j(-2)}{h}$

$$j(-2) = (-2)^2 - 5 \times (-2) + 7 = 4 + 10 + 7 = 21$$

$$j(-2+h) = (-2+h)^2 - 5(-2+h) + 7$$

$$j(-2+h) = ((-2)^2 + 2 \times (-2) \times h + h^2) + 10 - 5h + 7$$

$$j(-2+h) = 4 - 4h + h^2 + 10 - 5h + 7$$

$$j(-2+h) =$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et a+h. Où a=-2. On cherche à calculer $\frac{j(-2+h) - j(-2)}{h}$

$$j(-2) = (-2)^2 - 5 \times (-2) + 7 = 4 + 10 + 7 = 21$$

$$j(-2+h) = (-2+h)^2 - 5(-2+h) + 7$$

$$j(-2+h) = ((-2)^2 + 2 \times (-2) \times h + h^2) + 10 - 5h + 7$$

$$j(-2+h) = 4 - 4h + h^2 + 10 - 5h + 7$$

$$j(-2+h) = h^2 - 9h + 21$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et a+h. Où a=-2. On cherche à calculer $\frac{j(-2+h) - j(-2)}{h}$

$$j(-2) = (-2)^2 - 5 \times (-2) + 7 = 4 + 10 + 7 = 21$$

$$j(-2+h) = (-2+h)^2 - 5(-2+h) + 7$$

$$j(-2+h) = ((-2)^2 + 2 \times (-2) \times h + h^2) + 10 - 5h + 7$$

$$j(-2+h) = 4 - 4h + h^2 + 10 - 5h + 7$$

$$j(-2+h) = h^2 - 9h + 21$$

$$\frac{j(-2+h) - j(-2)}{h}$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et a+h. Où a=-2. On cherche à calculer $\frac{j(-2+h) - j(-2)}{h}$

$$j(-2) = (-2)^2 - 5 \times (-2) + 7 = 4 + 10 + 7 = 21$$

$$j(-2+h) = (-2+h)^2 - 5(-2+h) + 7$$

$$j(-2+h) = ((-2)^2 + 2 \times (-2) \times h + h^2) + 10 - 5h + 7$$

$$j(-2+h) = 4 - 4h + h^2 + 10 - 5h + 7$$

$$j(-2+h) = h^2 - 9h + 21$$

$$\frac{j(-2+h) - j(-2)}{h}$$

$$= \frac{h^2 - 9h + 21 - 21}{h}$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et a+h. Où a=-2. On cherche à calculer $\frac{j(-2+h) - j(-2)}{h}$

$$j(-2) = (-2)^2 - 5 \times (-2) + 7 = 4 + 10 + 7 = 21$$

$$j(-2+h) = (-2+h)^2 - 5(-2+h) + 7$$

$$j(-2+h) = ((-2)^2 + 2 \times (-2) \times h + h^2) + 10 - 5h + 7$$

$$j(-2+h) = 4 - 4h + h^2 + 10 - 5h + 7$$

$$j(-2+h) = h^2 - 9h + 21$$

$$\frac{j(-2+h) - j(-2)}{h}$$

$$= \frac{h^2 - 9h + 21 - 21}{h}$$

$$= \frac{h^2 - 9h}{h} =$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et a+h. Où a=-2. On cherche à calculer $\frac{j(-2+h) - j(-2)}{h}$

$$j(-2) = (-2)^2 - 5 \times (-2) + 7 = 4 + 10 + 7 = 21$$

$$j(-2+h) = (-2+h)^2 - 5(-2+h) + 7$$

$$j(-2+h) = ((-2)^2 + 2 \times (-2) \times h + h^2) + 10 - 5h + 7$$

$$j(-2+h) = 4 - 4h + h^2 + 10 - 5h + 7$$

$$j(-2+h) = h^2 - 9h + 21$$

$$\frac{j(-2+h) - j(-2)}{h}$$

$$= \frac{h^2 - 9h + 21 - 21}{h}$$

$$= \frac{h^2 - 9h}{h} = \frac{h(h - 9)}{h} =$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et a+h. Où a=-2. On cherche à calculer $\frac{j(-2+h) - j(-2)}{h}$

$$j(-2) = (-2)^2 - 5 \times (-2) + 7 = 4 + 10 + 7 = 21$$

$$j(-2+h) = (-2+h)^2 - 5(-2+h) + 7$$

$$j(-2+h) = ((-2)^2 + 2 \times (-2) \times h + h^2) + 10 - 5h + 7$$

$$j(-2+h) = 4 - 4h + h^2 + 10 - 5h + 7$$

$$j(-2+h) = h^2 - 9h + 21$$

$$\frac{j(-2+h) - j(-2)}{h}$$

$$= \frac{h^2 - 9h + 21 - 21}{h}$$

$$= \frac{h^2 - 9h}{h} = \frac{h(h - 9)}{h} = h - 9$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et a+h. Où a=-2. On cherche à calculer $\frac{j(-2+h) - j(-2)}{h}$

$$j(-2) = (-2)^2 - 5 \times (-2) + 7 = 4 + 10 + 7 = 21$$

$$j(-2+h) = (-2+h)^2 - 5(-2+h) + 7$$

$$j(-2+h) = ((-2)^2 + 2 \times (-2) \times h + h^2) + 10 - 5h + 7$$

$$j(-2+h) = 4 - 4h + h^2 + 10 - 5h + 7$$

$$j(-2+h) = h^2 - 9h + 21$$

$$\frac{j(-2+h) - j(-2)}{h}$$

$$= \frac{h^2 - 9h + 21 - 21}{h}$$

$$= \frac{h^2 - 9h}{h} = \frac{h(h - 9)}{h} = h - 9$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Le taux d'accroissement de la fonction j entre -2 et -2+h est égal à

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Le taux d'accroissement de la fonction j entre -2 et -2+h est égal à $h - 9$.

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Le taux d'accroissement de la fonction j entre -2 et $-2+h$ est égal à $h - 9$. On peut facilement en déduire la valeur de $j'(-2)$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Le taux d'accroissement de la fonction j entre -2 et -2+h est égal à $h - 9$. On peut facilement en déduire la valeur de $j'(-2)$

$$j'(-2) = \lim_{h \rightarrow 0} (h - 9) =$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Le taux d'accroissement de la fonction j entre -2 et -2+h est égal à $h - 9$. On peut facilement en déduire la valeur de $j'(-2)$

$$j'(-2) = \lim_{h \rightarrow 0} (h - 9) =$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Le taux d'accroissement de la fonction j entre -2 et -2+h est égal à $h - 9$. On peut facilement en déduire la valeur de $j'(-2)$

$$j'(-2) = \lim_{h \rightarrow 0} (h - 9) = -9$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Le taux d'accroissement de la fonction j entre -2 et -2+h est égal à $h - 9$. On peut facilement en déduire la valeur de $j'(-2)$

$$j'(-2) = \lim_{h \rightarrow 0} (h - 9) = -9$$

Equation de la tangente T en a :

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Le taux d'accroissement de la fonction j entre -2 et -2+h est égal à $h - 9$. On peut facilement en déduire la valeur de $j'(-2)$

$$j'(-2) = \lim_{h \rightarrow 0} (h - 9) = -9$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Le taux d'accroissement de la fonction j entre -2 et -2+h est égal à $h - 9$. On peut facilement en déduire la valeur de $j'(-2)$

$$j'(-2) = \lim_{h \rightarrow 0} (h - 9) = -9$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$y = j'(-2)(x - (-2)) + j(-2)$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Le taux d'accroissement de la fonction j entre -2 et -2+h est égal à $h - 9$. On peut facilement en déduire la valeur de $j'(-2)$

$$j'(-2) = \lim_{h \rightarrow 0} (h - 9) = -9$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$y = j'(-2)(x - (-2)) + j(-2)$$

$$y = -9(x + 2) + 21$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Le taux d'accroissement de la fonction j entre -2 et -2+h est égal à $h - 9$. On peut facilement en déduire la valeur de $j'(-2)$

$$j'(-2) = \lim_{h \rightarrow 0} (h - 9) = -9$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$y = j'(-2)(x - (-2)) + j(-2)$$

$$y = -9(x + 2) + 21$$

$$y = -9x - 18 + 21$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Le taux d'accroissement de la fonction j entre -2 et -2+h est égal à $h - 9$. On peut facilement en déduire la valeur de $j'(-2)$

$$j'(-2) = \lim_{h \rightarrow 0} (h - 9) = -9$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$y = j'(-2)(x - (-2)) + j(-2)$$

$$y = -9(x + 2) + 21$$

$$y = -9x - 18 + 21$$

$$y = -9x + 3$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Le taux d'accroissement de la fonction j entre -2 et -2+h est égal à $h - 9$. On peut facilement en déduire la valeur de $j'(-2)$

$$j'(-2) = \lim_{h \rightarrow 0} (h - 9) = -9$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$y = j'(-2)(x - (-2)) + j(-2)$$

$$y = -9(x + 2) + 21$$

$$y = -9x - 18 + 21$$

$$y = -9x + 3$$

d) $j(x) = x^2 - 5x + 7$ au point d'abscisse -2

Le taux d'accroissement de la fonction j entre -2 et -2+h est égal à $h - 9$. On peut facilement en déduire la valeur de $j'(-2)$

$$j'(-2) = \lim_{h \rightarrow 0} (h - 9) = -9$$

Equation de la tangente T en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$y = j'(-2)(x - (-2)) + j(-2)$$

$$y = -9(x + 2) + 21$$

$$y = -9x - 18 + 21$$

$$y = -9x + 3$$

$$y = -9x + 3$$