

1 Lezione del 27-11-24

1.1 Antitrasformata con soluzioni complesse

Esistono eccezioni al processo visto di antitrasformazione visto finora. Prendiamo ad esempio la forma rapporto di polinomi:

$$I(s) = \frac{s+2}{s^2+9}$$

Notiamo come i poli saranno numeri complessi.

Si avrà quindi:

$$= \frac{s+2}{(s+3j)(s-3j)} = \frac{A_1}{s+3j} + \frac{A_2}{s-3j}$$

Applicando il teorema dei residui per trovare A_1 e A_2 si ottiene:

$$A_1 = \lim_{s \rightarrow -3j} (s+3j) \frac{s+2}{(s+3j)(s-3j)} = \frac{2-3j}{-6j} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}j$$

$$A_2 = \lim_{s \rightarrow 3j} (s-3j) \frac{s+2}{(s+3j)(s-3j)} = \frac{2+3j}{6j} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}j$$

da cui l'espressione in funzione di t :

$$i(t) = \left(\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}j \right) e^{-3jt} + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}j \right) e^{3jt} \right) u(t)$$

dove notiamo che anche i coefficienti, oltre che gli esponenti, risultano numeri complessi. Prese le radici complesse nell'ordine $+$, $-$, si ha che il primo esponenziale ha argomento ω negativo.

Abbiamo quindi che incontreremo generalmente soluzioni in forma:

$$i(t) = (M + jN) e^{-(\sigma+j\omega)t} + (M - jN) e^{-(\sigma-j\omega)t}$$

da cui:

$$\begin{aligned} &= M e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} + jN e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} + M e^{-\sigma t} e^{j\omega t} - jN e^{-\sigma t} e^{j\omega t} \\ &= M \left(e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} + e^{-\sigma t} e^{j\omega t} \right) + jN \left(e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} - e^{-\sigma t} e^{j\omega t} \right) \\ &= M e^{-\sigma t} \left(e^{-j\omega t} + e^{j\omega t} \right) + jN e^{-\sigma t} \left(e^{-j\omega t} - e^{j\omega t} \right) \end{aligned}$$

visto che:

$$\begin{cases} e^{j\omega t} = \cos(\omega t) + i \sin(\omega t) \\ e^{-j\omega t} = \cos(\omega t) - i \sin(\omega t) \end{cases}$$

si ha:

$$\begin{aligned} i(t) &= M e^{-\sigma t} (\cos(\omega t) + i \sin(\omega t) + \cos(\omega t) - i \sin(\omega t)) \\ &\quad + jN e^{-\sigma t} (\cos(\omega t) - i \sin(\omega t) - \cos(\omega t) - i \sin(\omega t)) \\ &= 2M e^{-\sigma t} \cos \omega t + 2N e^{-\sigma t} \sin(\omega t) \end{aligned}$$

Vogliamo riportare questa forma nella più concisa $ke^{-\sigma t} \sin(\omega t + \alpha)$. Usiamo allora le formule di traduzione in forma sinusoidale, di cui una dimostrazione nel caso cosinusoidale si trova a <https://github.com/seggiani-luca/appunti-fis/blob/main/master/master.pdf>:

$$c_1 \sin \omega t + c_2 \cos \omega t \Leftrightarrow k \sin(\omega t + \alpha)$$

con:

$$\begin{cases} k = \sqrt{c_1^2 + c_2^2} \\ \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{c_1}{c_2}\right) \end{cases}$$

da cui diciamo:

$$\begin{aligned} i(t) &= 2Me^{-\sigma t} \cos \omega t + 2Ne^{-\sigma t} \sin(\omega t) \\ &= 2e^{-\sigma t} (M \cos \omega t + N \sin \omega t) = ke^{-\sigma t} \sin(\omega t + \alpha) \end{aligned}$$

con:

$$\begin{cases} k = 2\sqrt{M^2 + N^2} \\ \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{M}{N}\right) \end{cases}$$

Possiamo quindi riportare l'esempio precedente in questa forma. Si avrà:

$$\begin{aligned} i(t) &= \left(\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}j \right) e^{-3jt} + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}j \right) e^{3jt} \right) u(t) \\ &= (2M \cos(\omega t) + 2N \sin(\omega t)) \Big|_{M=\frac{1}{2}, N=\frac{1}{3}} = \cos(3t) + \frac{2}{3} \sin(3t) \end{aligned}$$

o la forma più compatta $k \sin(\omega t + \alpha)$, con:

$$\begin{cases} k = 2\sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2} \approx 1.201 \\ \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{M}{N}\right) \approx 0.983 \end{cases}$$