

Porody císařským řezem

Datová sada

Původ dat pochází z NZIP. Data byla zcela anonymizována.

Cíl projektu

Projekt si kladl za úkol informovat rodičky o trendech a okolnostech týkajících se císařských řezů v České republice.

Která věková skupina matek nejčastěji podstupuje císařský řez?

Jaký je trend vývoje císařských řezů za sledované období?

Je pravděpodobnost ukončení současného těhotenství císařským řezem vyšší, pokud žena již v minulosti císařský řez podstoupila?

Který typ anestezie je nejméně aplikován?

Transformace a agregace dat

Data byla shrnuta podle různých let a kategorií.

Periodicita

Roční

Obecná logika

Data prošla procesem transformace na základě oficiálních dokumentů, z nichž byly vyvozeny konečné závěry.

Přehled výsledných atributů

Anestezie

- data typ: string

Format pocítadla

- data typ: int

Hodnoty

- data typ: int

Parita

- data typ: string

Poskytovatel zs

- data typ: string

Předchozí císařský řez

- data typ: string

Rok porodu

- data typ: int

Ukončení císařským řezem

- data typ: string

Věk matky

- data typ: string

Odpovědi na výzkumné otázky

• Výzkumná otázka číslo 1

Věková skupina **30 až 34** let patří mezi ty, které nejčastěji podstupují porod císařským řezem.

• Výzkumná otázka číslo 2

I přes mírný pokles v posledních letech. Je trend porodů císařským řezem **progresivní**.

• Výzkumná otázka číslo 3

Přestože se může zdát, že předchozí císařský řez by mohl ovlivnit rozhodnutí o císařském řezu v současném těhotenství, 74 % matek **nemělo předchozí císařský řez.**

- **Výzkumná otázka číslo 4**

Nejběžnější typ anestezie je : celkový.

Vytvořil: Ondřej Seidl