

TOMATE BHN



MILAN

Planta indeterminada con alta carga de frutos por planta (3–7 por racimo).
Excelente vida larga de anaquel y amplia resistencia a enfermedades.
Destacada productividad en condiciones tropicales.


CARACTERÍSTICAS

Altura aprox.:	1.8 metros
Racimos/planta:	8 – 10
Frutos/racimo:	3 – 7
Peso promedio:	250 – 300 g



RESISTENCIAS

TMV	Tomato Mosaic Virus	F3	Fusarium oxysporum raza 3
F1	Fusarium oxysporum raza 1	V	Verticillium dahliae
F2	Fusarium oxysporum raza 2	LSL	Long Shelf Life



Glosario de Resistencias

Los códigos de resistencia se clasifican en dos niveles: HR (High Resistance / Resistencia Alta) e IR (Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia). Se organizan por grupo de patógeno: Virus → Bacterias → Hongos → Nemátodos.

HR
High Resistance / Resistencia Alta

La planta controla eficazmente el patógeno bajo presión normal de la enfermedad.

IR
Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia

La planta reduce el impacto pero puede mostrar síntomas leves bajo alta presión.

VIRUS

TMV
Tomato Mosaic Virus

Virus del mosaico del tomate. Causa moteado y deformación foliar.

TSWV
Tomato Spotted Wilt Virus

Virus de la marchitez manchada. Transmitido por trips.

TYLCV
Tomato Yellow Leaf Curl Virus

Virus del enrollamiento amarillo. Transmitido por mosca blanca.

BACTERIAS

Bacteria
Clavibacter michiganensis

Bacteria del cancro bacterial. Manchas en hojas y frutos.

NEMÁTODOS

N
Meloidogyne spp. (Mi)

Nemátodos del nudo de raíz. Reducen absorción de nutrientes.

HONGOS

F1
Fusarium oxysporum raza 1

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 1.

F2
Fusarium oxysporum raza 2

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 2.

F3
Fusarium oxysporum raza 3

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 3.

FORL
Fusarium radicis-lycopersici

Pudrición de raíz y corona por Fusarium.

V
Verticillium dahliae

Marchitamiento vascular por Verticillium.

CARACTERÍSTICA

LSL
Long Shelf Life

Larga vida de anaquel. Mayor firmeza y durabilidad postcosecha.