

PORTAINJERTO

# PATRÓN



Excelente alternativa para cultivar en suelos con problemas de hongos patógenos y nemátodos. Sistema radicular eficiente con alta capacidad de absorción de nutrientes y tolerancia a estreses abióticos: pH, salinidad y bajas temperaturas.

### CARACTERÍSTICAS

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Uso recomendado: | Suelos con hongos y nemátodos |
| Beneficio clave: | Sistema radicular eficiente   |
| Tolerancias:     | pH, salinidad, frío           |



### RESISTENCIAS

|    |                           |    |                           |
|----|---------------------------|----|---------------------------|
| F1 | Fusarium oxysporum raza 1 | F3 | Fusarium oxysporum raza 3 |
| F2 | Fusarium oxysporum raza 2 | V  | Verticillium dahliae      |



Distribuido por: SEMILLAS DGR S.A.

Milton Castillo H. | semillasdgrsa@gmail.com  
+506 8820-4170 | +506 2102-0910 | +506 7053-6966

semillasdgrsa@gmail.com  
semillasdgrsa.github.io/semillasdgr  
@semillasdgr

# Glosario de Resistencias

Los códigos de resistencia se clasifican en dos niveles: HR (High Resistance / Resistencia Alta) e IR (Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia). Se organizan por grupo de patógeno: Virus → Bacterias → Hongos → Nemátodos.

**HR**  
High Resistance / Resistencia Alta

La planta controla eficazmente el patógeno bajo presión normal de la enfermedad.

**IR**  
Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia

La planta reduce el impacto pero puede mostrar síntomas leves bajo alta presión.

VIRUS

**TMV**  
Tomato Mosaic Virus

Virus del mosaico del tomate. Causa moteado y deformación foliar.

**TSWV**  
Tomato Spotted Wilt Virus

Virus de la marchitez manchada. Transmitido por trips.

**TYLCV**  
Tomato Yellow Leaf Curl Virus

Virus del enrollamiento amarillo. Transmitido por mosca blanca.

BACTERIAS

**Bacteria**  
Clavibacter michiganensis

Bacteria del cancro bacterial. Manchas en hojas y frutos.

NEMÁTODOS

**N**  
Meloidogyne spp. (Mi)

Nemátodos del nudo de raíz. Reducen absorción de nutrientes.

HONGOS

**F1**  
Fusarium oxysporum raza 1

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 1.

**F2**  
Fusarium oxysporum raza 2

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 2.

**F3**  
Fusarium oxysporum raza 3

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 3.

**FORL**  
Fusarium radicis-lycopersici

Pudrición de raíz y corona por Fusarium.

**V**  
Verticillium dahliae

Marchitamiento vascular por Verticillium.

CARACTERÍSTICA

**LSL**  
Long Shelf Life

Larga vida de anaquel. Mayor firmeza y durabilidad postcosecha.