

CHILE DULCE

BRS-0152


Variedad de chile dulce de alto rendimiento con excelente adaptación al trópico centroamericano. Fruto de gran calibre, paredes gruesas y destacada vida poscosecha. Resistente a oídio interno (L1) y nemátodos (N). Semilla certificada BHN Seed, origen China.

CARACTERÍSTICAS





Germinación:	90%
Pureza:	99%
Origen:	China
Casa semillera:	BHN Seed

RESISTENCIAS

L1	Leveillula taurica (oídio interno)
----	------------------------------------



N	Meloidogyne spp. (Mi)
---	-----------------------



Distribuido por: SEMILLAS DGR S.A.

Edificio Ribleh, San Antonio de Belén, Heredia — Local 5
Milton Castillo H. | semillasdgrsa@gmail.com
CR: +506 7053-6966 | PTY: +507 6447-1230

semillasdgrsa@gmail.com
semillas-dgr.com
@semillasdgr

Glosario de Resistencias

Los códigos de resistencia se clasifican en dos niveles: HR (High Resistance / Resistencia Alta) e IR (Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia). Se organizan por grupo de patógeno: Virus → Bacterias → Hongos → Nemátodos.

HR High Resistance / Resistencia Alta

La planta controla eficazmente el patógeno bajo presión normal de la enfermedad.

IR Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia

La planta reduce el impacto pero puede mostrar síntomas leves bajo alta presión.

VIRUS

TMV

Tomato Mosaic Virus

Virus del mosaico del tomate. Causa moteado y deformación foliar.

TSWV

Tomato Spotted Wilt Virus

Virus de la marchitez manchada. Transmitido por trips.

TYLCV

Tomato Yellow Leaf Curl Virus

Virus del enrollamiento amarillo. Transmitido por mosca blanca.

BACTERIAS

Bacteria

Clavibacter michiganensis

Bacteria del cancro bacterial. Manchas en hojas y frutos.

CARACTERÍSTICA

LSL

Long Shelf Life

Larga vida de anaquel. Mayor firmeza y durabilidad postcosecha.

HONGOS

F1

Fusarium oxysporum raza 1

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 1.

F2

Fusarium oxysporum raza 2

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 2.

F3

Fusarium oxysporum raza 3

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 3.

FORL

Fusarium radicis-lycopersici

Pudrición de raíz y corona por Fusarium.

V

Verticillium dahliae

Marchitamiento vascular por Verticillium.

Phytophthora

Phytophthora capsici

Pudrición de raíz y corona por Phytophthora.