

TOMATE BHN

CACIQUE

Variedad indeterminada con alta carga de frutos por planta. Excelente adaptación a condiciones tropicales con producción uniforme y consistente. Fruto firme con buena vida poscosecha.

CARACTERÍSTICAS

Porte: Indeterminado

Vida poscosecha: Larga



RESISTENCIAS

TMV Tomato Mosaic Virus

TSWV Tomato Spotted Wilt Virus

TYLCV Tomato Yellow Leaf Curl Virus

F1 Fusarium oxysporum raza 1

F2 Fusarium oxysporum raza 2

F3 Fusarium oxysporum raza 3

V Verticillium dahliae

N Meloidogyne spp. (Mi)



Distribuido por: SEMILLAS DGR S.A.

Edificio Ribleh, San Antonio de Belén, Heredia — Local 5
Milton Castillo H. | semillasdgrsa@gmail.com
+506 8820-4170 | +506 2102-0910 | +506 7053-6966

semillasdgrsa@gmail.com
semillasdgr-cr.com
@semillasdgr

Glosario de Resistencias

Los códigos de resistencia se clasifican en dos niveles: HR (High Resistance / Resistencia Alta) e IR (Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia). Se organizan por grupo de patógeno: Virus → Bacterias → Hongos → Nemátodos.

HR High Resistance / Resistencia Alta La planta controla eficazmente el patógeno bajo presión normal de la enfermedad.	IR Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia La planta reduce el impacto pero puede mostrar síntomas leves bajo alta presión.
VIRUS TMV Tomato Mosaic Virus Virus del mosaico del tomate. Causa moteado y deformación foliar. TSWV Tomato Spotted Wilt Virus Virus de la marchitez manchada. Transmitido por trips. TYLCV Tomato Yellow Leaf Curl Virus Virus del enrollamiento amarillo. Transmitido por mosca blanca.	HONGOS F1 Fusarium oxysporum raza 1 Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 1. F2 Fusarium oxysporum raza 2 Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 2. F3 Fusarium oxysporum raza 3 Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 3. FORL Fusarium radicis-lycopersici Pudrición de raíz y corona por Fusarium. V Verticillium dahliae Marchitamiento vascular por Verticillium. Phytophthora Phytophthora capsici Pudrición de raíz y corona por Phytophthora.
BACTERIAS Bacteria Clavibacter michiganensis Bacteria del cancro bacterial. Manchas en hojas y frutos.	
CARACTERÍSTICA LSL Long Shelf Life Larga vida de anaquel. Mayor firmeza y durabilidad postcosecha.	
	NEMÁTODOS N Meloidogyne spp. (Mi) Nemátodos del nudo de raíz. Reducen absorción de nutrientes.