

PORTAINJERTO

PATRÓN


Excelente alternativa para cultivar en suelos con problemas de hongos patógenos y nemátodos. Sistema radicular eficiente con alta capacidad de absorción de nutrientes y tolerancia a estreses abióticos: pH, salinidad y bajas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS

Uso recomendado:	Suelos con hongos y nemátodos
Beneficio clave:	Sistema radicular eficiente
Tolerancias:	pH, salinidad, frío

RESISTENCIAS

TMV	Tomato Mosaic Virus	F3	Fusarium oxysporum raza 3
Bacteria	Clavibacter michiganensis	FORL	Fusarium radicis-lycopersici
F1	Fusarium oxysporum raza 1	V	Verticillium dahliae
F2	Fusarium oxysporum raza 2	N	Meloidogyne spp. (Mi)



Distribuido por: SEMILLAS DGR S.A.

Edificio Ribleh, San Antonio de Belén, Heredia — Local 5
Milton Castillo H. | semillasdgrsa@gmail.com
+506 8820-4170 | +506 2102-0910 | +506 7053-6966

semillasdgrsa@gmail.com
semillasdgr-cr.com
@semillasdgr

Glosario de Resistencias

Los códigos de resistencia se clasifican en dos niveles: HR (High Resistance / Resistencia Alta) e IR (Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia). Se organizan por grupo de patógeno: Virus → Bacterias → Hongos → Nemátodos.

HR High Resistance / Resistencia Alta La planta controla eficazmente el patógeno bajo presión normal de la enfermedad.	IR Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia La planta reduce el impacto pero puede mostrar síntomas leves bajo alta presión.
VIRUS TMV Tomato Mosaic Virus Virus del mosaico del tomate. Causa moteado y deformación foliar. TSWV Tomato Spotted Wilt Virus Virus de la marchitez manchada. Transmitido por trips. TYLCV Tomato Yellow Leaf Curl Virus Virus del enrollamiento amarillo. Transmitido por mosca blanca.	HONGOS F1 Fusarium oxysporum raza 1 Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 1. F2 Fusarium oxysporum raza 2 Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 2. F3 Fusarium oxysporum raza 3 Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 3. FORL Fusarium radicis-lycopersici Pudrición de raíz y corona por Fusarium. V Verticillium dahliae Marchitamiento vascular por Verticillium. Phytophthora Phytophthora capsici Pudrición de raíz y corona por Phytophthora.
BACTERIAS Bacteria Clavibacter michiganensis Bacteria del cancro bacterial. Manchas en hojas y frutos.	NEMÁTODOS N Meloidogyne spp. (Mi) Nemátodos del nudo de raíz. Reducen absorción de nutrientes.
CARACTERÍSTICA LSL Long Shelf Life Larga vida de anaquel. Mayor firmeza y durabilidad postcosecha.	