



TOMATE BHN

# JR SPECIAL

Excelente vida poscosecha y alto valor comercial. Planta robusta con buen amarre de frutos y producción consistente por racimo. Ideal para mercados que exigen calidad y durabilidad.



## CARACTERÍSTICAS

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Altura aprox.:  | 1.8 metros  |
| Racimos/planta: | 8 – 10      |
| Peso promedio:  | 250 – 300 g |



## RESISTENCIAS

|     |                           |    |                           |
|-----|---------------------------|----|---------------------------|
| TMV | Tomato Mosaic Virus       | F3 | Fusarium oxysporum raza 3 |
| F1  | Fusarium oxysporum raza 1 | V  | Verticillium dahliae      |
| F2  | Fusarium oxysporum raza 2 |    |                           |



Distribuido por: SEMILLAS DGR S.A.

Edificio Ribleh, San Antonio de Belén, Heredia — Local 5  
Milton Castillo H. | semillasdgrsa@gmail.com  
+506 8820-4170 | +506 2102-0910 | +506 7053-6966

semillasdgrsa@gmail.com  
semillasdgr-cr.com  
@semillasdgr



# Glosario de Resistencias

Los códigos de resistencia se clasifican en dos niveles: HR (High Resistance / Resistencia Alta) e IR (Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia). Se organizan por grupo de patógeno: Virus → Bacterias → Hongos → Nemátodos.

## HR High Resistance / Resistencia Alta

La planta controla eficazmente el patógeno bajo presión normal de la enfermedad.

## IR Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia

La planta reduce el impacto pero puede mostrar síntomas leves bajo alta presión.

### VIRUS

#### TMV

##### Tomato Mosaic Virus

Virus del mosaico del tomate. Causa moteado y deformación foliar.

#### TSWV

##### Tomato Spotted Wilt Virus

Virus de la marchitez manchada. Transmitido por trips.

#### TYLCV

##### Tomato Yellow Leaf Curl Virus

Virus del enrollamiento amarillo. Transmitido por mosca blanca.

### HONGOS

#### F1

##### Fusarium oxysporum raza 1

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 1.

#### F2

##### Fusarium oxysporum raza 2

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 2.

#### F3

##### Fusarium oxysporum raza 3

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 3.

#### FORL

##### Fusarium radicis-lycopersici

Pudrición de raíz y corona por Fusarium.

#### V

##### Verticillium dahliae

Marchitamiento vascular por Verticillium.

#### Phytophthora

##### Phytophthora capsici

Pudrición de raíz y corona por Phytophthora.

### BACTERIAS

#### Bacteria

##### Clavibacter michiganensis

Bacteria del cancro bacterial. Manchas en hojas y frutos.

### CARACTERÍSTICA

#### LSL

##### Long Shelf Life

Larga vida de anaquel. Mayor firmeza y durabilidad postcosecha.

### NEMÁTODOS

#### N

##### Meloidogyne spp. (Mi)

Nemátodos del nudo de raíz. Reducen absorción de nutrientes.