

TOMATE BHN

# IL-1908

Planta indeterminada de porte alto con frutos de excelente calibre y larga vida poscosecha. Alta productividad con 3–5 frutos por racimo. Ideal para producción de invierno y verano.


## CARACTERÍSTICAS

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Altura aprox.:  | 1.8 metros  |
| Racimos/planta: | 8 – 10      |
| Frutos/racimo:  | 3 – 5       |
| Peso promedio:  | 240 – 280 g |



## RESISTENCIAS

|       |                               |     |                           |
|-------|-------------------------------|-----|---------------------------|
| TMV   | Tomato Mosaic Virus           | F3  | Fusarium oxysporum raza 3 |
| TSWV  | Tomato Spotted Wilt Virus     | V   | Verticillium dahliae      |
| TYLCV | Tomato Yellow Leaf Curl Virus | N   | Meloidogyne spp. (Mi)     |
| F1    | Fusarium oxysporum raza 1     | LSL | Long Shelf Life           |
| F2    | Fusarium oxysporum raza 2     |     |                           |



Distribuido por: SEMILLAS DGR S.A.

Edificio Ribleh, San Antonio de Belén, Heredia — Local 5  
Milton Castillo H. | semillasdgrsa@gmail.com  
+506 8820-4170 | +506 2102-0910 | +506 7053-6966

semillasdgrsa@gmail.com  
semillasdgr-cr.com  
@semillasdgr

# Glosario de Resistencias

Los códigos de resistencia se clasifican en dos niveles: HR (High Resistance / Resistencia Alta) e IR (Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia). Se organizan por grupo de patógeno: Virus → Bacterias → Hongos → Nemátodos.

**HR**      High Resistance / Resistencia Alta

La planta controla eficazmente el patógeno bajo presión normal de la enfermedad.

**IR**      Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia

La planta reduce el impacto pero puede mostrar síntomas leves bajo alta presión.

VIRUS

**TMV**

Tomato Mosaic Virus

Virus del mosaico del tomate. Causa moteado y deformación foliar.

**TSWV**

Tomato Spotted Wilt Virus

Virus de la marchitez manchada. Transmitido por trips.

**TYLCV**

Tomato Yellow Leaf Curl Virus

Virus del enrollamiento amarillo. Transmitido por mosca blanca.

HONGOS

**F1**

Fusarium oxysporum raza 1

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 1.

**F2**

Fusarium oxysporum raza 2

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 2.

**F3**

Fusarium oxysporum raza 3

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 3.

**FORL**

Fusarium radicis-lycopersici

Pudrición de raíz y corona por Fusarium.

**V**

Verticillium dahliae

Marchitamiento vascular por Verticillium.

**Phytophthora**

Phytophthora capsici

Pudrición de raíz y corona por Phytophthora.

BACTERIAS

**Bacteria**

Clavibacter michiganensis

Bacteria del cancro bacterial. Manchas en hojas y frutos.

CARACTERÍSTICA

**LSL**

Long Shelf Life

Larga vida de anaquel. Mayor firmeza y durabilidad postcosecha.

NEMÁTODOS

**N**

Meloidogyne spp. (Mi)

Nemátodos del nudo de raíz. Reducen absorción de nutrientes.