

TOMATE BHN

# VULCANO

Planta indeterminada de porte alto adaptada a invierno y verano.  
Fruto tipo bola con hombros medios y cierre excelente. Larga vida de anaquel y alta resistencia a enfermedades foliares y del suelo.

## CARACTERÍSTICAS

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Altura aprox.:  | 1.8 metros  |
| Racimos/planta: | 8 – 10      |
| Frutos/racimo:  | 3 – 5       |
| Peso promedio:  | 250 – 300 g |
| Forma:          | Tipo bola   |



## RESISTENCIAS

|              |                               |             |                              |
|--------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>TMV</b>   | Tomato Mosaic Virus           | <b>F3</b>   | Fusarium oxysporum raza 3    |
| <b>TSWV</b>  | Tomato Spotted Wilt Virus     | <b>FORL</b> | Fusarium radicis-lycopersici |
| <b>TYLCV</b> | Tomato Yellow Leaf Curl Virus | <b>V</b>    | Verticillium dahliae         |
| <b>F1</b>    | Fusarium oxysporum raza 1     | <b>N</b>    | Meloidogyne spp. (Mi)        |
| <b>F2</b>    | Fusarium oxysporum raza 2     |             |                              |



# Glosario de Resistencias

Los códigos de resistencia se clasifican en dos niveles: HR (High Resistance / Resistencia Alta) e IR (Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia). Se organizan por grupo de patógeno: Virus → Bacterias → Hongos → Nemátodos.

**HR**      High Resistance / Resistencia Alta

La planta controla eficazmente el patógeno bajo presión normal de la enfermedad.

**IR**      Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia

La planta reduce el impacto pero puede mostrar síntomas leves bajo alta presión.

VIRUS

**TMV**

Tomato Mosaic Virus

Virus del mosaico del tomate. Causa moteado y deformación foliar.

**TSWV**

Tomato Spotted Wilt Virus

Virus de la marchitez manchada. Transmitido por trips.

**TYLCV**

Tomato Yellow Leaf Curl Virus

Virus del enrollamiento amarillo. Transmitido por mosca blanca.

HONGOS

**F1**

Fusarium oxysporum raza 1

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 1.

**F2**

Fusarium oxysporum raza 2

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 2.

**F3**

Fusarium oxysporum raza 3

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 3.

**FORL**

Fusarium radicis-lycopersici

Pudrición de raíz y corona por Fusarium.

**V**

Verticillium dahliae

Marchitamiento vascular por Verticillium.

**Phytophthora**

Phytophthora capsici

Pudrición de raíz y corona por Phytophthora.

BACTERIAS

**Bacteria**

Clavibacter michiganensis

Bacteria del cancro bacterial. Manchas en hojas y frutos.

CARACTERÍSTICA

**LSL**

Long Shelf Life

Larga vida de anaquel. Mayor firmeza y durabilidad postcosecha.

NEMÁTODOS

**N**

Meloidogyne spp. (Mi)

Nemátodos del nudo de raíz. Reducen absorción de nutrientes.