



TOMATE DGR

# SDGR 21

Tomate tipo Beef indeterminado con planta robusta. Frutos globosos, firmes y de excelente calidad. Variedad insignia de Semillas DGR, desarrollada para las condiciones del trópico centroamericano.


## CARACTERÍSTICAS

|              |               |
|--------------|---------------|
| Porte:       | Indeterminado |
| Tipo:        | Beef          |
| Forma:       | Globosa       |
| Peso aprox.: | 300 g         |



## RESISTENCIAS

|       |                               |     |                           |
|-------|-------------------------------|-----|---------------------------|
| TMV   | Tomato Mosaic Virus           | F3  | Fusarium oxysporum raza 3 |
| TYLCV | Tomato Yellow Leaf Curl Virus | V   | Verticillium dahliae      |
| F1    | Fusarium oxysporum raza 1     | LSL | Long Shelf Life           |
| F2    | Fusarium oxysporum raza 2     |     |                           |





# Glosario de Resistencias

Los códigos de resistencia se clasifican en dos niveles: HR (High Resistance / Resistencia Alta) e IR (Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia). Se organizan por grupo de patógeno: Virus → Bacterias → Hongos → Nemátodos.

## HR High Resistance / Resistencia Alta

La planta controla eficazmente el patógeno bajo presión normal de la enfermedad.

## IR Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia

La planta reduce el impacto pero puede mostrar síntomas leves bajo alta presión.

### VIRUS

#### TMV Tomato Mosaic Virus

Virus del mosaico del tomate. Causa moteado y deformación foliar.

#### TSWV Tomato Spotted Wilt Virus

Virus de la marchitez manchada. Transmitido por trips.

#### TYLCV Tomato Yellow Leaf Curl Virus

Virus del enrollamiento amarillo. Transmitido por mosca blanca.

### BACTERIAS

#### Bacteria Clavibacter michiganensis

Bacteria del cancro bacterial. Manchas en hojas y frutos.

### NEMÁTODOS

#### N Meloidogyne spp. (Mi)

Nemátodos del nudo de raíz. Reducen absorción de nutrientes.

### HONGOS

#### F1 Fusarium oxysporum raza 1

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 1.

#### F2 Fusarium oxysporum raza 2

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 2.

#### F3 Fusarium oxysporum raza 3

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 3.

#### FORL Fusarium radicis-lycopersici

Pudrición de raíz y corona por Fusarium.

#### V Verticillium dahliae

Marchitamiento vascular por Verticillium.

### CARACTERÍSTICA

#### LSL Long Shelf Life

Larga vida de anaquel. Mayor firmeza y durabilidad postcosecha.